

a) Egyenletünk bal oldalának nincs (valós) értelme, ha bármelyik négyzetgyök jel alatt negatív szám áll. Ez akkor és csak akkor következik be, ha akár az  $x - 1$ ,  $x - 2$ , akár az  $x - 3$ ,  $x - 4$  tényezőpár ellentett előjelű, vagyis ha  $x$  akár 1 és 2 közé, akár 3 és 4 közé esik:  $1 < x < 2$ , vagy  $3 < x < 4$ . – Első egyenletünk második tagját a jobb oldalra átvéve, majd az egyenlet mindkét oldalát négyzetre emelve


$$x^2 - 3x + 2 = 2 - 2\sqrt{2(x-3)(x-4)} + x^2 - 7x + 12.$$

A jobb oldalon csak a négyzetgyökös kifejezést hagyva, majd ismét négyzetre emelve és rendezve

$$\begin{aligned} 2(x-3) &= -\sqrt{2(x-3)(x-4)}, \\ 2(x-3)^2 &= (x-3)(x-4), \\ (x-3)(x-2) &= 0. \end{aligned}$$

Innen látjuk, hogy – mivel átalakításaink során gyök nem veszhetett el – egyenletünket  $x = 3$ -on és  $x = 2$ -n kívül más szám nem elégítheti ki. Ezek nem kizárt értékek, és a behelyettesítés mutatja, hogy mindkettő gyöke az egyenletnek. Ezzel megkaptuk a megoldást.

b) Második egyenletünkben hosszas vizsgálatra vezetne az a kérdés, hogy  $p$ ,  $r$ ,  $q$ , mely értékrendszerei mellett van az egyenletnek valós értelme. Ezt az  $x$ -et tartalmazó bal oldali tagok esetére majd a szóba jövő gyökök helyén vizsgáljuk. A jobb oldali állandó számról azonban máris feltesszük, hogy valós, vagyis  $(p-r)(p-r+2q) \geq 0$ .



Vegyük észre, hogy  $q = 0$  mellett egyenletünk  $|x-p| + |x-r| = |p-r|$ -re egyszerűsödik, és ennek  $p \neq r$  esetén minden  $p$  és  $r$  közé eső szám megoldása, beleértve  $p$ -t és  $r$ -et is (lásd az ábrát),  $p = r$  esetén pedig  $x = p$  az egyetlen gyök; másrészt, hogy  $p = r$  esetén a bal oldal két tagja egyenlő, és a jobb oldalon 0 áll, így a gyökök  $x_1 = p+q$ ,  $x_2 = p-q$ , hacsaknem  $q = 0$ , amely esetet már láttunk. Feltehetjük most már, hogy  $p \neq r$  és  $q \neq 0$ .

A fentihez hasonlóan rendezés, első négyzetreemelés és átrendezés után

$$(p-r)(x-r+q) = \sqrt{(p-r)(p-r+2q)(x-r-q)(x-r+q)},$$

újabb négyzetreemeléssel és átrendezéssel

$$\begin{aligned} (p-r)(x-r+q)^2 &= (p-r+2q)(x-r-q)(x-r+q), \\ (x-r+q)[(p-r)(x-r+q) - (p-r+2q)(x-r-q)] &= \\ = (x-r+q)(-2qx + 2pq + 2q^2) &= -2q(x-r+q)(x-p-q) = 0. \end{aligned}$$

Eszerint gyökként csak  $x_1 = r-q$  és  $x_2 = p+q$  jöhetnek szóba. Mindkettő kielégíti az egyenletet, mert behelyettesítve a bal oldal egyik tagja 0, másik tagja pedig egyenlő a jobb oldali (valós) számmal.

Első egyenletünk a másodiknak speciális esete  $p = 3/2$ ,  $q = 1/2$ ,  $r = 7/2$  értékekkel.

Hegyi László (Pécs, Zipernovszky K. gépip. t. III. o. t.)