


*Előzetes megjegyzés.* Sem a háromszög  $a$ ,  $b$ ,  $c$  oldalegyenesein, sem a kérdéses  $e$  egyenesen nincs szó irányításról. Így két egyenes szögén mindig azt a kisebb forgást érthetjük, amely egyiküket a közös pontja körül a másikba, ill. kitérő egyenesek esetében egy tetszés szerinti pontja körül a másikkal párhuzamos helyzetbe átviszi. Ez a forgás általában hegyes szög, legfeljebb derékszög.


**I. megoldás:** Az  $e$  egyenes nem fekehet a háromszög  $S$  síkjában és azzal párhuzamos sem lehet. Ha ugyanis  $e$  az  $S$ -ben feküdnék, akkor  $a$  és  $b$ -vel alkotott egyenlő  $\alpha$  szögei alapján vagy azonos, vagy párhuzamos lenne az  $a$  és  $b$  egyenesek szögfelezőinek egyikével,  $f$ -fel (1. ábra,  $\alpha$  hegyes szög, mert fele az  $a$ ,  $b$  oldalegyenesek valamelyik szögének).



1. ábra

Így  $c$  is  $\alpha$  szöget alkotna  $f$ -fel. Ámde egy egyenessel a síkban csak két irány alkot egy adott hegyesszöget, esetünkben  $f$ -fel  $a$  és  $b$  irányai. Eszerint  $c$  párhuzamos lenne  $a$  és  $b$  egyikével, tehát nem alkotna velük háromszöget. – Ha pedig  $e$  párhuzamos volna az  $S$  síkkal, akkor  $S$ -nek bármely az  $e$ -vel párhuzamos  $e_1$  egyenese is egyenlő szöget alkotna  $a$ ,  $b$ ,  $c$ -vel, amiről már láttuk, hogy lehetetlen.

Ezek szerint  $e$  metszi  $S$ -et egy  $E$  pontban. Toljuk el  $a$ ,  $b$ ,  $c$ -t ( $S$ -ben) úgy, hogy új  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  helyzetükben menjenek át  $E$ -n (2. ábra).



2. ábra

Így  $e$  az  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ -gyel is  $\alpha$  szöget alkot. –  $c_1$ -et átmenetileg mellőzve megmutatjuk, hogy  $e$  benne van azon két síknak egyikében, amelyek merőlegesek  $S$ -re és azt  $a_1$ , és  $b_1$  egy-egy szögfelezőjében metszik. Bocsássunk merőlegest  $e$ -nek egy  $E$ -től különböző  $F$  pontjából  $a_1$ -re,  $b_1$ -re és  $S$ -re, legyenek talppontjaik  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $F_1$ . Ha  $e$  három talppont és  $E$  közül bármelyik kettő egybeesik, akkor  $e$  merőleges  $S$ -re és segédvételünkre nincs szükség. Amennyiben ugyanis  $F_1$  azonos  $E$ -vel, akkor  $e$  azonos az  $S$ -re merőleges  $FF_1$ -gyel; az  $A_1 \equiv E$  (és hasonlóan a  $B_1 \equiv E$ ) feltevés azt jelenti, hogy  $e$  azonos az  $a_1$ -re merőleges  $FA_1$ -gyel, így  $\alpha$  derékszög, tehát a feltevésnél fogva  $e$  merőleges  $S$ -nek  $a_1$  és  $b_1$  (egymástól különböző) egyenesekre; erre vezet az  $A_1 \equiv B_1$  feltevés is, mert így  $A_1$  és  $B_1$  azonos  $a_1$  és  $b_1$  egyetlen közös pontjával  $E$ -vel; végül az  $F_1 \equiv A_1$ , (vagy  $F_1 \equiv B_1$ ) egybeesés feltevése – ha feltesszük, hogy  $A_1$ ,  $B_1$  és  $E$  különbözők – ellentmondásra vezet, ugyanis így  $S$ -nek  $F$ -től való távolsága  $FA_1$ , és  $S$ -nek minden az  $A_1$ -től különböző pontja  $F$ -től nagyobb távolságra van  $FA_1$ -nél, viszont a közös átfogójú  $FEA_1$ , és  $FEB_1$ , derékszögű háromszögek egybevágók, mert  $E$ -nél levő szögek egyenlők, és ezért  $FB_1 = FA_1$ . – Ha az  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $F_1$  talppontok különbözők, akkor  $F_1$  rajta van  $a_1$  és  $b_1$  egyik szögfelezőjén. Ugyanis az  $FEA_1$  és  $FEB_1$  háromszögekből ismét  $FB_1 = FA_1$ , így a közös befogójú  $FF_1A_1$  és  $FF_1B_1$  derékszögű háromszögek egybevágók, így  $F_1A_1 = F_1B_1$ , ez pedig igazolja állításunkat, mert szerkesztésnél fogva  $F_1A_1$  merőleges  $a_1$ -re és  $F_1B_1$  merőleges  $b_1$ -re. Ezek szerint  $e$ -nek  $S$ -en való vetülete az  $EF_1 = f$  szögfelező, és fordítva:  $e$  valóban az  $f$ -en át  $S$ -re merőlegesen álló  $S_1$  síkban van.

Eredményünk szerint  $e$  az  $a_1$ ,  $c_1$ , egyenespár egyik  $g$  szögfelezőjén át  $S$ -re merőlegesen álló  $S_2$  síkban is benne van. Ámde az  $a_1$ ,  $c_1$ , egyenespár mindkét szögfelezője különbözik az  $a_1$ ,  $b_1$  pár mindkét szögfelezőjétől, mert  $e$  felezők

párhuzamosak az eredeti háromszög egy-egy belső, ill. külső szögfelezőjével, azok pedig páronként metszik egymást. Ezért  $S_1$  és  $S_2$ , különbözők, tehát  $e$  csak  $S_1$  és  $S_2$  metszésvonala lehet, ez pedig az  $S$ -re  $E$ -ben emelt merőleges. Ezt kellett bebizonyítanunk.

Gagyai Pálffy András (Budapest, Széchenyi I. g. III. o. t.)

*Megjegyzés.* Az  $a_1, b_1$ , metsző egyenesekhez képezett  $S_1$  síkot  $a_1$  és  $b_1$  (egyik) szögfelező síkjának szokás nevezni. Könnyű belátni, hogy ennek minden pontja egyenlő távolságra van  $a_1$  és  $b_1$ -től.

**II. megoldás:** Az I. megoldás jelölésével vegyünk  $e$ -n egy  $E$ -től különböző  $F$  pontot és mérjük fel  $E$ -től  $a_1, b_1, c_1$ -re tetszés szerinti  $EA_2 = EB_2 = EC_2 = r$  szakaszt, az irányokat úgy választva, hogy a  $FEA_2, FEB_2, FEC_2$  háromszögek  $E$ -nél levő szöge egyenlő legyen. Így e háromszögek egybevágók (két-két oldal és a közbezárt szög egyenlősége folytán), tehát  $FA_2 = FB_2 = FC_2$ . Ennélfogva  $A_2B_2C_2$  egy az  $F$  körül írt gömbön vannak, másrészt  $S$ -en, tehát  $F$  és  $S$  metszésvonalán, amely egy kör, és középpontja  $F$ -nek  $S$ -en levő  $F_1$  vetülete. Ámde másrészt  $A, B, C$  az  $E$  körül  $r$  sugárral írt körön is rajta vannak. És mivel 3 pont a kört egyértelműen meghatározza, azért  $F_1$  azonos  $E$ -vel, tehát  $e$  merőleges  $S$ -re.

Máté Zsolt (Szeged, Radnóti M. g. IV. o. t.)

**III. megoldás:** Az előbbi jelöléseket használva tegyük fel, hogy  $e$  nem merőleges  $S$ -re, tehát  $a_1, b_1, c_1$ -gyel egyenlő hegyesszögeket alkot. Állítsunk  $e$ -re egy az  $E$ -től különböző  $H$  pontján át merőleges  $S^*$  síkot. Ez metszi  $S$ -et egy  $h$  egyenesben (amely eszerint merőleges  $e$ -re),  $h$  pedig  $a_1, b_1, c_1$  közül legalább kettőt metsz, mert ezek között nincsenek párhuzamosak. Nem lehet azonban, hogy  $h$  pl.  $a_1$ -et ne messe, mert akkor  $h$  és  $a_1$  párhuzamosak volnának, és  $e$  a  $h$ -val együtt az  $a_1$ -re is merőleges lenne, feltevésünkkel ellentétben.

Legyen  $h$  metszéspontja  $a_1, b_1, c_1$ -en  $A^*, B^*, C^*$ .<sup>1</sup> A  $HEA^*, HEB^*, HEC^*$  derékszögű háromszögek  $HE$  befogója közös,  $E$ -nél levő szögek egyenlők, így egybevágók, tehát  $EA^* = EB^* = EC^*$ , vagyis  $A^*, B^*, C^*$  egy az  $E$  körüli  $k$  körön vannak. Ez azonban lehetetlen, mert így  $k$ -nak a  $h$  egyenessel három különböző közös pontja lenne. Feltevésünk ellentmondásra vezetett, tehát nem állhat, így  $e$  merőleges  $S$ -re.

Bollobás Béla (Budapest, Apáczai Csere J. gyak. g. III. o. t.)

*Megjegyzés.* Végző soron a következő megfontolás is arra vezet, hogy ha  $e$  nem volna merőleges  $S$ -re, vagyis  $a_1, b_1, c_1$ -re, hanem velük bezárt  $\alpha$  szöge hegyesszög volna, akkor egy körnek és egy egyenesnek három közös pontja volna. Az  $e$ -t  $E$ -ben metsző és vele egyenlő  $\alpha$  szögeket alkotó egyenesek mértani helye (ha az  $\alpha = 90^\circ$  esetet kizárjuk), az  $E$  csúcsú,  $e$  tengelyű és  $\alpha$  nyílásszögű forgáskúpfelület alkotóinak összessége. Ha  $\alpha$  hegyesszög, akkor az említett kúpfelületnek (legalább) három alkotója volna  $S$ -ben:  $a_1, b_1, c_1$ . Ez pedig lehetetlen, mert így a fenti  $S^*$  által az  $S$ -ből kimetszett  $h$ -nak három közös pontja volna az  $S^*$  által a kúpfelületből kimetszett  $k'$  körrel.

Góth László (Budapest, Könyves Kálmán g. II. o. t.)

**IV. megoldás:** Az állítást a vektoralgebra módszereivel is bebizonyíthatjuk.<sup>2</sup> Legyenek a háromszög oldalainak vektorai (valamelyik körüljárás mentén haladva)  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ , eszerint

$$(1) \quad \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = 0$$

továbbá az oldalakkal egyenlő  $\alpha$  szögeket bezáró egyenes egységvektora  $\mathbf{e}$ , eszerint  $|\mathbf{e}| = 1$ . Így

$$(2) \quad \cos \alpha = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}}{|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{e}|} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}}{|\mathbf{a}|} = \frac{\mathbf{b} \cdot \mathbf{e}}{|\mathbf{b}|} = \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{e}}{|\mathbf{c}|}.$$

Szorozzuk meg (1)-et skalárisan  $\mathbf{e}$ -vel és fejezzük ki a tagokat (2) alapján:

$$(3) \quad \begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{e} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{e} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{e} &= |\mathbf{a}| \cos \alpha + |\mathbf{b}| \cos \alpha + |\mathbf{c}| \cos \alpha = \\ &= (|\mathbf{a}| + |\mathbf{b}| + |\mathbf{c}|) \cos \alpha = 0. \end{aligned}$$

Itt az abszolút értékek pozitívok, ezért az egyenlőség csak  $\cos \alpha = 0$ -val vagyis  $\alpha = 90^\circ$ -kal teljesülhet. Ezt akartuk bizonyítani.

Gálfi László (Budapest, Fazekas M. gyak. g. II. o. t.)

<sup>1</sup> Az ábrán  $H$  úgy van véve, hogy  $A^* \equiv A_2$ , és  $B^* \equiv B_2$ .

<sup>2</sup> A felhasznált fogalmakat lásd pl. *Hajós-Neukomm-Surányi: Matematikai Versenytelemek II.* (Középiskola Szakköri Füzetek), Tankönyvkiadó, 1957. 26–30. oldal.