


Tekintsük először az  $L$  pont mértani helyét, ha  $A'$  befutja az  $\varepsilon$  síkot. Legyen  $A$  vetülete  $\varepsilon$ -ra  $A_1$ , és az  $AA_1$  szakasz hossza  $a (\neq 0)$ . Ha  $A'$  egybeesik  $A_1$ -gyel, akkor  $L$  az  $AA_1$  szakasz  $A_0$  felezőpontjában van.  $A'$  minden más helyzetében az  $LA_0$  egyenes felezi az  $AA_1A'$  háromszög  $AA_1$  és  $AA'$  oldalait, tehát e háromszögnek középvonala. Ezért  $LA_0$  párhuzamos  $A_1A'$ -vel, tehát  $\varepsilon$ -nal is. Így  $L$  mindig benne van az  $A_0$ -on átmenő,  $\varepsilon$ -nal párhuzamos  $\alpha$  síkban. Ez a sík egyszerűsített  $L$  mértani helye is, mert ha  $\alpha$ -nak egy tetszős szerinti pontja  $L$ , akkor az  $AL$  egyenes metszi  $\varepsilon$ -t egy  $A'$  pontban, és az  $AA'$  szakasz felezőpontja  $L$ .



1. ábra

Hasonlóan  $M$  és  $N$  mértani helye az  $\varepsilon$ -nal párhuzamos  $\beta$ , ill.  $\gamma$  sík, amely  $\varepsilon$ -nak azon az oldalán van, mint  $A$ ,  $B$  és  $C$ , és  $\varepsilon$ -tól való távolsága  $b/2$ , ill.  $c/2$ , ahol  $b$  a  $B$ -nek,  $c$  a  $C$ -nek  $\varepsilon$ -tól mért távolsága.

Legyen most  $A', B', C'$  az  $\varepsilon$  sík olyan ponthármasa, hogy a képezett  $L, M, N$  pontok háromszöget alkotnak.  $G$ -t megadja az  $LM$  szakasz  $N_0$  felezőpontját  $N$ -nel összekötő szakasznak  $N_0$ -tól számított első harmadoló pontja, vagyis amelyre  $N_0G = N_0N/3$ . Feltehetjük, hogy  $A, B, C$ -nek  $\varepsilon$ -tól mért távolságaira fennáll  $a \leq b \leq c$  (egyenlőség csak az egyik helyen állhat, különben az  $ABC$  sík párhuzamos lenne  $\varepsilon$ -nal). Ekkor a  $\beta$  sík  $(b-a)/2$ -vel távolabb fekszik  $\varepsilon$ -tól, mint az  $a$  sík. A fentiekhez hasonlóan adódik, hogy  $N_0$  rajta fekszik azon az  $\varepsilon$ -nal párhuzamos  $\nu$  síkon, amely  $\varepsilon$ -nak azon az oldalán van, mint  $A, B, C$  és  $\varepsilon$ -tól mért távolsága

$$\frac{a}{2} + \frac{1}{2} \left( \frac{b-a}{2} \right) = \frac{a+b}{4}.$$


(Ezt először rögzített  $A'$  mellett kapjuk – vagyis rögzített  $L$  mellett –, majd belátjuk, hogy tetszős szerinti  $A'$ -vel ugyanerre a mértani helyre jutunk.)

Rögzített  $A'$  és  $B'$  mellett (azaz állandó  $L, M$  és  $N_0$  mellett) hasonlóan adódik, hogy  $G$  azon az  $\varepsilon$ -nal párhuzamos  $\sigma$  síkon fekszik, amely  $\varepsilon$ -nak  $A, B, C$ -vel egyező oldalán van és  $\varepsilon$ -tól mért távolsága

$$\frac{a+b}{4} + \frac{1}{3} \left( \frac{c}{2} - \frac{a+b}{4} \right) = \frac{1}{6}(a+b+c).$$

Nyilvánvaló ugyanis, hogy  $G$ -nek  $\varepsilon$ -tól mért távolsága annyival több  $N_0$ -nak  $\varepsilon$ -tól mért távolságánál, mint a  $\nu$  és  $\gamma$  síkok távolságának  $1/3$  része. Ugyanezt kapjuk bármely  $A'$ -vel és  $B'$ -vel.

Megmutatjuk, hogy a  $\sigma$  sík bármely  $G$  pontjához lehet megadni  $\varepsilon$ -ban olyan  $A', B', C'$  ponthármas, amelyekből képezett  $L, M, N$  pontok nincsenek egy egyenesen, és az  $LMN$  háromszög súlypontja éppen  $G$ . Ez az előzőkkel együtt azt jelenti, hogy  $G$  mértani helye a  $\sigma$  sík.



2. ábra

Legyen  $B, C, G$  vetülete  $\varepsilon$ -ra  $B_1, C_1, G_1$ . Vegyünk  $\varepsilon$ -ban egy  $G_1$  től különböző tetszés szerinti  $N_1$  pontot, mérjük fel az  $N_1G_1$  szakasz  $G_1$ -en túli meghosszabbítására e szakasz felét, legyen a végpont  $N_{01}$ , és mérjük fel egy az  $N_{01}$ -en átmenő,  $N_{01}G_1$ -től különböző tetszés szerinti egyenesre  $N_{01}$ -től mindkét irányban egy tetszés szerinti szakaszt, legyenek a végpontok  $L_1$  és  $M_1$ . Végül vegyük  $A', B', C'$  gyanánt  $A_1$ -nek  $L_1$ -re, ill.  $B_1$ -nek  $M_1$ -re, ill.  $C_1$ -nek  $N_1$ -re vett tükörképét. – Ekkor az  $A', B', C'$ -ből képezett  $L, M, N$  pontok  $\varepsilon$ -ra való vetülete nyilván  $L_1, M_1, N_1$ , továbbá az  $LMN$  háromszög  $G$  súlypontjának  $\varepsilon$ -ra való vetülete  $G_1$ . Ugyanis – párhuzamos vetítés mellett – az egy egyenesen levő szakaszok aránya nem változik meg, egy szakasz felező (ill. harmadoló) pontjának vetülete felezi (harmadolja) a szakasz vetületét.  $L_1, M_1, N_1$  szerkesztésnél fogva háromszöget alkotnak, ezért  $N$  nincs benne az  $\varepsilon$ -ra  $L_1M_1$ -en át merőlegesen álló, az  $L$  és  $M$ -et magában foglaló síkban, tehát  $L, M, N$  is háromszöget alkotnak. – Ezzel az állítás bizonyítását befejeztük.

*Aleva György* (Budapest, Radnóti M. gyak. g. IV. o. t.)