


I. megoldás. Legyen a kérdéses négyzet $ABCD$, a többiétől elválasztott csúcs A , a csúcsok és az O középpont e -től mért távolsága rendre a, b, c, d, x . A feladat feltevése szerint $ac = bd$. Föltehetjük, hogy $b \leq d$, mert ezt, ha kell, a B, D betűk fölcserélésével elérhetjük. Így e a DB átlónak B -n túli meghosszabbítását metszi, $b = d$ esetén pedig párhuzamos vele.



1. ábra

2. ábra

Húzzuk meg O -n át az e -vel párhuzamos e' egyenest, és legyen ezen a csúcsok vetülete rendre A', B', C', D' . $b < d$ esetén B az e' -nek azon a partján van, mint A , az OAA', OBB', OCC', ODD' derékszögű háromszögek egybevágók, mert átfogójuk $1/\sqrt{2}$ és hegyesszögeik egyenlők. Legyenek a befogók m és n , ahol $m > n$. Ezekkel

$$a + x = AA' = CC' = c - x = m,$$

$$x - b = BB' = DD' = d - x = n,$$

így $a = m - x, c = m + x, b = x - n, d = x + n,$

Ezeket a föltevésbe helyettesítve

$$m^2 - x^2 = x^2 - n^2, \quad x^2 = \frac{1}{2}(m^2 + n^2) = \frac{1}{4}, \quad x = \frac{1}{2}.$$

Ha pedig $b = d$, akkor e' azonos a BD egyenessel, tehát $x = b = d, a + x = c - x = 1/\sqrt{2}$, innen $a = 1/\sqrt{2} - x, c = 1/\sqrt{2} + x$, és a föltevésből ismét $x = 1/2$.

Hegedűs András (Budapest, Apáczai Csere J. gyak. g. III. o. t.)

II. megoldás. Forgassuk el az ábrát a négyzet O középpontja körül 90° -kal úgy, hogy A a B -be jusson. Legyen B és D vetülete e -n B_1 , ill. D_1 , e elforgatottjának, e^* -nak a metszéspontja e -vel A_2 . Ekkor $A_2B_1 = a$, mert egyenlő A elforgatottjának, B -nek e^* -től való távolságával. Hasonlóan $A_2D_1 = c$. A feltétel szerint $ac = bd$, így az A_2BB_1 és DA_2D_1 derékszögű háromszögek befogóinak aránya

$$\frac{A_2B_1}{B_1B} = \frac{a}{b} = \frac{d}{c} = \frac{DD_1}{D_1A_2}.$$

Így a két háromszög hasonló. Mivel továbbá a megfelelő csúcsokon végighaladva a két háromszöget egyező irányban járjuk körül és megfelelő befogók merőlegesek, így átfogóik is: $DA_2B \sphericalangle = 90^\circ$. A DA_2B derékszögű háromszög OA_2 súlyvonala az átfogó felével, vagyis a négyzet átlójának a felével egyenlő.

Továbbforgatva az ábrát $90^\circ - 90^\circ$ -kal, az e egyenes elforgatottjai egy O középpontú négyzetet zárnak be, melynek átlója a bizonyítottak szerint egyenlő hosszú az $ABCD$ négyzet átlójával, így a két négyzet egybevágó. És mivel középpontjuk közös, azért beírt körük is, vagyis e távolsága O -tól a négyzet oldalának fele.

III. megoldás. Helyezzünk koordináta-rendszert ábránkra, legyenek a csúcsok koordinátái $A(0, 0), B(1, 0), C(1, 1), D(0, 1)$ és e egyenlete $y = mx + b$, ahol $0 < b < 1$, mert e elválasztja A -t D -től. A csúcsok e -től mért előjeles távolsága az ismert képlet felhasználásával rendre

$$\frac{-b}{\sqrt{1+m^2}}, \quad \frac{-m-b}{\sqrt{1+m^2}}, \quad \frac{1-m-b}{\sqrt{1+m^2}}, \quad \frac{1-b}{\sqrt{1+m^2}}.$$

Feltevésünk a távolságok abszolút értékére vonatkozik, ezért A távolságának -1 -szeresét véve, a föltevés szerint, a közös nevezővel mindjárt szorozva

$$b(1-m-b) = (m+b)(b-1), \quad \text{amiből}$$

$$b = \frac{1}{2}(1-m) \pm \frac{1}{2}\sqrt{m^2+1}.$$

Ezt helyettesítjük e egyenletébe és a távolság-képletet az $(1/2, 1/2)$ középpontra alkalmazzuk. A kívánt távolság:

$$x = \frac{\left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2}m - \frac{1}{2}(1-m) \mp \frac{1}{2}\sqrt{m^2+1} \right|}{\sqrt{m^2+1}} = \frac{1}{2}.$$

Rácz Éva (Makó, József A. g. III. o. t.)

Munk Sándor (Budapest, II. Rákóczi F. g. III. o. t.)