


Folyóiratunk előző számában pozitív súlyú fókuszokkal rendelkező Tschirnhaus-féle görbékkel foglalkoztunk, vagyis olyan görbékkel, melyeken egy P pontnak az F_1, F_2, \dots, F_n rögzített pontoktól való távolságait adott pozitív q_1, q_2, \dots, q_n állandókkal szorozva állandó k összeget kapunk.


$$q_1PF_1 + q_2PF_2 + \dots + q_nPF_n = k.$$

A hiperbolában olyan görbét ismertünk meg, amelyet szintén hasonló egyenlet jellemez, de vegyes előjelű (+1, -1) súlyokkal. A hiperbolára első cikkünkben ismertetett fonalas szerkesztést hasznosítani lehet általánosabb vegyes előjelű súlyokkal rendelkező Tschirnhaus-féle görbék fonalas szerkesztésére is.




1. ábra.

Könnyen leolvasható az 1. ábráról pl. hogy a feltüntetett fonalmenet segítségével olyan görbét rajzolhatunk, melynek F_1, F_2, F_3 a fókuszai és melyre nézve a $PF_1 + PF_2 - PF_3$ kifejezés értéke állandó, vagyis egy $q_1 = q_2 = 1, q_3 = -1$ súlyokkal rendelkező Tschirnhaus-féle görbét kapunk. A két fonalat más Q és R pontban fogva össze, az előbbivel azonos fókuszokkal rendelkező görbét kapunk, de az állandó értéke már más lesz. Az alábbi két ábra ilyen, ú. n. konfokális görbéket ábrázol. Az állandó igen nagy értékei esetén a görbe csaknem kör alakú. Kisebb állandókkal a görbe nemcsak köralakját veszítheti el, hanem konvexitását is. Az első görbeseregen látni, hogy ha az állandót úgy választjuk, hogy $PF_1 + PF_2 - PF_3 = F_1F_3 + F_2F_3$ legyen, akkor a görbének F_3 -ban szögpontja van. Azt is látni, hogy a görbe két különálló menetből is tevődhet össze. Az egyik menet egyetlen ponttá is zsugorodhat.



2. ábra.




3. ábra.

A második görbeseregen a negatív F_3 fókuszhoz az F_1F_2 szakasz felezési pontját választottuk. Itt látunk olyan görbét is, mely önmagát átmetszi, meg olyant is, melynek két menete közül az egyik a másik belsejében van. A belső menet itt is összezsugorodhat egy ponttá.

Ha a fókuszokat változtatjuk és F_3 az F_2 -be kerül, akkor a görbe F_1 középső körré változik; ugyanis mivel $PF_2 = PF_3$, következik, hogy ekkor $PF_1 + PF_2 - PF_3 = PF_1$ marad állandó. Ha azonban F_1 az F_2 -vel esik össze, akkor – az állandót k -val jelölve – $-2PF_2 - PF_3 = k$ egyenlettel rendelkező Descartes-féle görbét kapunk.

Hasonlóan rajzolhatunk több fókusszal is vegyes előjelű súlyokkal rendelkező Tschirnhaus-féle görbéket.




4. ábra.

A 4. ábra egy negatív és három pozitív fókusszal rendelkező konfokális görbesereget ábrázol. Az F_1, F_2, F_3 pozitív fókuszok az F_4 negatív fókusz körül szabályosan helyezkednek el. A görbék alakja itt is a három szimmetrikus fókusznál látottakhoz hasonló lehetőségeket mutat.

A fókuszokat változtatva, egy pozitív és egy negatív fókusz összeesésekor itt a görbe ellipszissé változik, három pozitív fókusz összeesésekor pedig Descartes-féle görbét kapunk.


A következő két ábra két pozitív és két negatív fókusszal rendelkező görbét mutat. Az elsőnél egy rombusz szemközti csúcaiban, a másodiknál egy téglalap két szomszédos csúcsában helyezkednek el az egyenlő előjelű súlyokhoz tartozó fókuszok. Az első esetben kapunk zárt és nyílt görbéket is, a második azonban már csupán nyílt görbét szolgáltat.



5. ábra.

6. ábra.

Gondoljunk vissza még egyszer a hiperbolára. Ott a fonalas szerkesztés a két ág közül – amit pl. koordinátákkal tárgyalva egy összetartozó görbének ismertünk meg – csak az egyiket szolgáltatja. A másikat akkor kapjuk, ha a súlyok előjelét ellenkezőre változtatjuk. A hiperbolához hasonlóan annak is van bizonyos alapja, hogy az olyan görbét, melyek fókuszai és állandója egyenlő és a súlyok is csak előjelben különböznek egy görbe különböző meneteinek vagy ágainak tekintsük. Ezt különösen hihetővé teszi a következő két ábra.



7. ábra.

8. ábra.

A 7. ábra a $PF_1 + 2PF_2 = 2F_1F_2$ és $2PF_2 - PF_1 = 2F_1F_2$ egyenlettel jellemzett görbéből tevődik össze. Az F_1 pontban nemcsak találkozik a két görbe, hanem olyan szépen összesimul, hogy nehéz is két görbének látni. Pascal-féle csigavonal néven is ismeretes ez a görbe. Ez alkalmazást nyer különböző geometriai és fizikai problémákkal kapcsolatban.

Utolsó ábránkon négy görbe kapcsolódik egybe. Mindegyik fókuszai a szabályos háromszög kitűző F_1, F_2, F_3 pontok, az állandó értéke e háromszög oldalának kétszerese, s azok a görbék vannak megrajzolva, melyek csupa +1 súlyhoz és melyek egy -1, és két +1 súlyhoz tartoznak.