


**1. feladat.** Legyen adva a síkban 6 pont, amelyek közül semelyik 3 sincs egy egyenesen. Bizonyítandó, hogy ezek közül kiválaszthatók egy olyan háromszög csúcsai, amelyek egy szöge legalább  $120^\circ$ -os.

A feladat állítása a következővel egyértelmű: van olyan 3 pont, amelyek valamelyikéből a másik kettőn át húzott félegyenesek hajlásszöge legalább  $120^\circ$ -os. Ebben a formában fogjuk bizonyítani az állítást.


**I. megoldás.** A következő segédteletből indulunk ki. Ha egy háromszög belsejében adva van egy  $P$  pont, akkor a  $P$ -ből a csúcsokhoz húzott egyenesek hajlásszögének valamelyike legalább  $120^\circ$ -os. Valóban, véve a három szög legnagyobbikát (illetőleg az ilyenek egyikét), ennek a háromszorosa legalább akkora, mint a három szög összege, vagyis legalább  $360^\circ$ , ez a szög tehát legalább  $120^\circ$ -os.

Ebből következik, hogy a feladat állítása teljesül minden olyan esetben, amelyben kiválaszthatók az adott pontok közül egy háromszög csúcsai úgy, hogy ez a háromszög tartalmazza adott pontot.



1. ábra

Válasszunk ki most már az adott 6 pont közül hármat. Ha abban a háromszögben amelynek ezek a csúcsai, van még adott pont, akkor, mint láttuk, teljesül a feladat állítása; de teljesül akkor is, ha a háromszög két oldalának a közös csúcsukon túli meghosszabbításai közt levő szögtartományba esik adott pont (1. ábra), mert akkor a kérdéses csúcsot tartalmazza az a háromszög, amelyet a másik két csúcs és a negyedik pont határoz meg. A síkot a háromszög oldalegyenesével felosztva feltehetjük tehát, hogy a további adott pontok a háromszög oldalaihoz csatlakozó síkrészekben helyezkednek el. Hozzávéve közülük egyet a már kiválasztottakhoz, a tekintetbe vett pontok egy konvex négyszög csúcsai (2. ábra).



2. ábra

Meghúzva a négyszög még hiányzó két oldalának egyenesét, ismét feltehetjük, hogy sem a keletkező új háromszögbe, sem pedig az oldalmeghosszabbítások közti szögtartományokba nem esik adott pont. Így véve egy ötödik pontot az az előzőkkel konvex ötszöget alkot, és a gondolatmenetet még egyszer megismételve nyerjük, hogy elég azt az esetet megvizsgálni, amelyben az adott pontok egy konvex hatszög csúcsai. Ebben az esetben a hatszög legnagyobb szögének, vagy a legnagyobbak egyikének a hatszorosa legalább akkora, mint a hat szög összege, tehát legalább  $720^\circ$ , s így a szög legalább  $120^\circ$ -os. Ezzel igazoltuk a feladat állítását.

**II. megoldás.** Az adott pontok vagy egy konvex hatszög csúcsai, vagy közülük 3, 4 vagy 5 egy olyan konvex sokszög csúcsait alkotja, amely tartalmazza a többi adott pontot. Az így kapott hat-, ill. három-, négy- vagy ötszöget az adott pontok *konvex burkának* nevezzük.<sup>1</sup>

Ha a konvex burok hatszög, akkor, mint az előző megoldás végén láttuk, egyik szöge legalább  $120^\circ$ -os.


<sup>1</sup>Képzeljünk a pontokban a síkra merőlegesen gombostűket betűzve és vegyük körül ezeket cérnával, majd húzzuk össze a cérnát a legrövidebbre, ekkor a cérna megadja a konvex burkot.

Ha a konvex burok négy-, vagy ötszög, akkor egyik átlójával, ill. egyik csúcsából induló átlóival háromszögekre bontjuk. A keletkező háromszögek valamelyike tartalmaz adott pontot. A hátralevő esetek mindegyikében találunk tehát olyan háromszöget, amelynek a csúcsai adott pontok és amely tartalmaz ezeken kívül is adott pontot. Az előző megoldás elején láttuk, hogy ekkor a csúcsokat a további adott ponttal összekötő szakaszok közti szögek valamelyike legalább  $120^\circ$ -os. Ezzel igazoltuk a feladat állítását.

*Megjegyzések.* a) Nem lényeges annak kikötése, hogy semelyik 3 pont sincs egy egyenesen, ha ugyanis 3 pont egy egyenesen van, akkor a középsőből a két szélsőhöz húzott félegyenesek  $180^\circ$ -os (tehát  $120^\circ$ -nál nagyobb) szöget zárnak be.

b) Vizsgáljuk meg, előfordulhat-e, hogy az adott pontok mindegyikét minden lehető módon összekötve két-két másikkal, a keletkező forgásszögek legnagyobbika sem nagyobb  $120^\circ$ -nál, és ha igen, milyen esetekben következik ez be. A bizonyításból azonnal adódik, hogyha a 6 pont konvex burka hatszög, akkor a kérdéses legnagyobb szög akkor  $120^\circ$ -os, ha a hatszög minden szöge egyenlő, vagyis, ha az oldalai rendre párhuzamosak egy szabályos hatszög oldalaival (nem kell azonban szabályosnak lennie a hatszögnek, mint azt több versenyző állította).

Ha az adott pontok konvex burka nem hatszög, akkor láttuk, hogy kiválaszthatók a pontok közül egy olyan háromszög csúcsai, amely tartalmaz legalább még egy adott  $P$  pontot. A bizonyításból világos az is, hogy  $P$ -ből a háromszög oldalainak  $120^\circ$ -os szögben kell látszaniuk, mert különben valamelyik biztosan  $120^\circ$ -nál nagyobb szög alatt látszik.




3. ábra

Ha teljesül is ez a feltétel, akkor is fellép  $120^\circ$ -nál nagyobb szög, amint legalább még egy  $Q$  pont van adva (3. ábra). Ha ugyanis  $Q$  a  $P$ -ből a csúcsokhoz mutató félegyenesek valamelyikén van, akkor arra 3 pont esik, és így van  $180^\circ$ -os szög is. Ha pedig  $Q$  az említett félegyenesek közti  $120^\circ$ -os szögtartományok belsejében van, akkor a  $P$ -ből  $Q$ -n át húzott félegyenes a szögtéren kívül levő félegyenessel  $120^\circ$ -nál nagyobb szöget zár be. Ezzel bebizonyítottuk a következőt: *hat adott pont mindegyikéből minden két-két ponthoz húzott félegyenes-párok közötti szögek legnagyobbika legalább akkora, mint a szabályos hatszög egy szöge, és csak abban az esetben pontosan akkora, ha az adott pontok egy olyan konvex hatszög csúcsai, amelynek az oldalai párhuzamosak egy szabályos hatszög oldalaival.*

c) A most kimondott állítás 6 helyett 3, 4 vagy 5 pont esetére is igaz. Ha ugyanis mindegyik pont csúcsa a pontrendszer konvex burkának, akkor a sokszög legnagyobb szöge legalább akkora, mint a szabályos három-, négy-, ill. ötszög egy szöge, és pontosan ekkora csak úgy lehet, ha a sokszög minden szöge ekkora, vagyis ha oldalai párhuzamosak egy ugyanennyi oldalú szabályos sokszög oldalaival. Ha pedig (4 vagy 5 adott pont esetén) van olyan pont, amelyik nem csúcsa a konvex buroknak, akkor egy ilyen pont körül, mint már láttuk, fellép legalább  $120^\circ$ -os szög, viszont a szabályos négy- és ötszög egy szöge kisebb  $120^\circ$ -nál.

Megmutatjuk, hogy a most belátott szabályosság 7 adott pont esetén már nem áll fenn: *a síkban 7 pont közül valamelyiket össze tudjuk kötni két másikkal úgy, hogy  $120^\circ$ -nál nagyobb szög keletkezzék, viszont bárhogy adunk meg egy  $120^\circ$ -nál nagyobb szöget, mindig megadható 7 pont úgy, hogy a köztük fellépő összes szögek kisebbek legyenek az adott szögnél.* Hozzáteszük, hogy az utoljára említett pontrendszerek már nem lesznek általában konvex 7-szög csúcsai.



4. ábra

Ha a 7 pont konvex burka 7-nél kevesebb oldalú, akkor az állítás első része következik a b) pontban bizonyított állításból. Ha pedig az adott pontok egy konvex 7-szög csúcsai, akkor ennek legnagyobb szöge legalább akkora, mint

a szabályos 7-szög egy szöge, ez pedig nagyobb mint  $120^\circ$ . Az állítás második felének igazolására vágjuk le egy szabályos háromszög csúcsait a csúcsokhoz közel a szemközti oldallal párhuzamos egyenessel, és az így keletkező hatszög csúcsaihoz vegyük hozzá a háromszög középpontját (4. ábra). Ekkor könnyen beláthatjuk, hogy a fellépő legnagyobb szög is tetszés szerint közel lesz  $120^\circ$ -hoz.

d) Az elmondott eredmények **L. M. BLUMENTHAL** amerikai matematikustól származnak.<sup>2</sup> Ő vetette fel általában a kérdést, hogy milyen alsó korlátot lehet megadni tetszés szerinti  $n$  pont esetén a fellépő legnagyobb szögre. **SZEKERES GYÖRGY** megmutatta,<sup>3</sup> hogy ha a pontok egy síkban vannak és számuk  $2^k$  ( $k$  természetes szám), akkor az  $\left(1 - \frac{1}{k}\right) 180^\circ$ -os szög játszik hasonló szerepet, mint 7 pont esetén a  $120^\circ$ , és térben is nyert hasonló eredményeket. Még síkban sincs azonban minden  $n$ -re megoldva a probléma.

**2. feladat.** *Bizonyítsuk be, hogyha  $u$  és  $v$  olyan egész számok, amelyekre*

$$u^2 + uv + v^2$$

*osztható 9-cel, akkor  $u$  is,  $v$  is osztható 3-mal.*

Számba véve  $u$  és  $v$  lehetséges maradékait 3-mal való osztásnál, véges sok esetet kapunk, és ezek végigpróbálásával nyerhető a feladat egy megoldása. A versenyzők nagy része ezt az utat választotta, többen még a kifejezés szimmetriáját sem használva ki. Könnyen célhoz érhetünk azonban egy algebrai átalakítás segítségével:

**Megoldás.** Alakítsuk át a kifejezést a következőképpen:

$$u^2 + uv + v^2 = (u - v)^2 + 3uv.$$

A kifejezés osztható 9-cel, tehát 3-mal is, és mivel a jobb oldal második tagja is osztható vele, tehát az első:  $(u - v)^2$  is osztható 3-mal.


Egy négyzetszám csak úgy lehet 3-mal osztható, ha az alap – esetünkben  $u - v$  – osztható 3-mal, és ekkor a négyzete 9-cel is osztható.

Mivel az egész kifejezés is osztható 9-cel, így a második tag,  $3uv$  is osztható 9-cel, tehát  $uv$  osztható 3-mal. Ez csak úgy lehet, ha valamelyik tényező is osztható 3-mal. Beláttuk azonban, hogy a különbségük is osztható 3-mal, ez pedig csak úgy lehet, ha mind a kettő:  $u$  is,  $v$  is osztható 3-mal, és ezt kellett bizonyítanunk. (Világos megfordítva, hogyha ez teljesül, akkor a kifejezés valóban osztható 9-cel.)

**3. feladat.** *Az  $ABCDEF$  konvex hatszögben az  $AB$  és  $DE$ , a  $BC$  és  $EF$ , továbbá a  $CD$  és  $FA$  oldalak párhuzamosak. Bizonyítsuk be, hogy az  $ACE$  és  $BDF$  háromszögek területe egyenlő.*

**I. megoldás.** Húzzuk meg az  $AD$ ,  $BE$  és  $CF$  átlókat, metszéspontjaik legyenek  $R$ ,  $P$ ,  $Q$  (ezek egybe is eshetnek). Ezekkel az  $ACE$ , illetve a  $BDF$  háromszöget a következő háromszögekre bontottuk szét (5. ábra):

$$(1) \quad \begin{array}{cccc} ACQ, & CEP, & EAR, & PQR, \\ DFQ, & FBP, & BDR, & PQR. \end{array}$$



5. ábra

A feladat állításának bizonyításához elegendő azt megmutatni, hogy itt az egymás alatt álló háromszögek területe egyenlő. Ez az utolsó párra nyilvánvaló. Az első párra ez abból következik, hogy az  $ACF$  és  $ADF$  háromszögek egyenlő területűek, mert  $AF$  oldaluk közös és a rá merőleges magasság  $AF$  és  $CD$  párhuzamossága folytán egyenlő. Ezekből elhagyva közös részüket, az  $AQF$  háromszöget, a maradék  $ACQ$  és  $DFQ$  háromszögek is egyenlő területűek. Ugyanígy látható be a további két-két háromszög területének egyenlősége is. Ezzel a feladat állítását igazoltuk.


<sup>2</sup> Journal of the American Mathematical Society, **61**, (1939), 912–922. o.

<sup>3</sup> Ugyanott, **63**, (1941), 208–210. o.

*Megjegyzés.* A megoldás épít arra a szemléletes tényre, hogy az (1) alatti háromszögek az  $ACE$ , ill.  $BDF$  háromszöget töltik ki hézagtalanul és egyrétűen. Ez azonban a szemléletre való hivatkozás nélkül is belátható.

A meghúzott  $AD$ ,  $BE$  és  $CF$  átlók egyenese átmetszi az  $ACE$  és  $BDF$  háromszögeket, mert a hatszög konvex volta miatt az  $AD$  egyenesnek pl. a  $B$  és  $C$  csúcsok az egyik oldalán, az  $E$  és  $F$  csúcsok az ellenkező oldalán vannak, s így metszi az egyenes a  $CE$  és  $FB$  szakaszt, tehát az említett háromszögeket is. Ezeknek az átlóknak a metszéspontjai is az említett háromszögekben vannak, mert véve valamelyik átlón az egyik háromszögnek az átlóra eső csúcsát és a szemközti oldallal való metszéspontot, ezeket is elválasztja a másik két átló.


Ha a három átló egy ponton megy keresztül, akkor nincs mit bizonyítanunk tovább. Ellenkező esetben pl. az  $A$ ,  $C$ ,  $E$  csúcsok a  $PQR$  háromszög  $QR$ ,  $PQ$ ,  $RP$  oldalainak meghosszabbításain vannak. Nem lehet pl. az  $A$  csúcs az  $RQ$  oldal  $Q$ -n túli és ugyanakkor az  $E$  csúcs az  $RP$  oldal  $P$ -n túli meghosszabbításán, mert akkor a  $PQR$  háromszög a  $PQ$  oldal ellenkező oldalán lenne, mint az  $ACE$  háromszög, nem lehetne tehát az előbbi háromszög az utóbbiban. Így  $A$ ,  $C$ ,  $E$   $QR$ -nek az  $R$ -en túli,  $PQ$ -nak  $Q$ -n, ill.  $RP$ -nek  $P$ -n túli meghosszabbításán van, vagy mindegyik a megfelelő oldal ellenkező irányú meghosszabbításán (5. ábra). Ebből pedig következik bizonyítandó állításunk. Hasonló megfontolás érvényes a  $BDF$  háromszögre is.



6. ábra

A bizonyított állítást így fogalmazhatjuk: *Egy háromszög csúcsain át húzzunk a háromszöget metsző egyeneseket és tekintsük az ezek közti háromszöget, – ha a három egyenes nem megy át egy ponton. Ekkor az első háromszög csúcsai az utóbbi három oldalának három különböző csúcsból induló meghosszabbításain vannak (6. ábra, az első háromszög csúcsai üres, az utóbbiéi tele köröcskéekkel vannak jelölve).*

**II. megoldás.** Egészítsük ki paralelogrammává egyrészt a hatszög  $AB$  és  $BC$ ,  $CD$  és  $DE$ , továbbá  $EF$  és  $FA$  oldalát, másrészt a  $BC$  és  $CD$ ,  $DE$  és  $EF$ ,  $FA$  és  $AB$  oldalpárokat. A paralelogrammák negyedik csúcsait jelöljük  $R$ ,  $P$ ,  $Q$ -val, ill.  $U$ ,  $S$ ,  $T$ -vel. (A három-három pont egybe is eshet.) A paralelogrammáknak két-két hatszögcsúcsot összekötő átlói az  $ACE$ , ill. a  $BDF$  háromszög oldalai (7. ábra).



7. ábra


Mind a két paralelogramma-rendszerben két-két paralelogrammának a közös csúcsból induló oldalegyenese egybeesik, mivel párhuzamosak a hatszögnek azok az oldalai, amelyekkel a szóban forgó paralelogrammaoldalok párhuzamosak. Így a  $PQR$  és az  $STU$  háromszögek oldalai (ha a három pont nem esik egybe) két-két hatszögoldalal párhuzamosak, és hosszuk a párhuzamos hatszögoldalak hosszának a különbsége. A két háromszög tehát egybevágó. Ebből következik, hogy a három-három paralelogramma területösszege egyenlő. Ennek folytán az  $ACE$  háromszög területe is, a  $BDF$ -é is a megfelelő három paralelogramma fél területének és a köztük levő háromszög területének az összege, s így a kettő egyenlő.

*Megjegyzések.* a) A bizonyítás ismét szigorúbbá tehető azzal, ha megmutatjuk, hogy a három-három félparalelogramma és az ezek oldalai között keletkező háromszög hézagtalanul és egyrétűen töltik ki az  $ACE$ , ill.  $BDF$  háromszöget. Itt pl. az  $ACE$  háromszöget az  $AQ$ ,  $CR$ ,  $EP$  egyenesekkel osztottuk részekre. Ezek az egyenesek átmetszik a háromszögeket, mert pl.  $AQ$  párhuzamos  $BC$ -vel és  $EF$ -fel, és az utóbbi két egyenes  $AQ$  ellenkező oldalára esik a hatszög konvex volta miatt. Hasonlóan okoskodhatunk a többi egyenesekre, továbbá a  $BDF$  háromszögre. Ekkor

azonban a keletkezett ábrákra is érvényes az előző megoldáshoz fűzött megjegyzés utolsó megállapítása, abból pedig következik a bizonyítandó állítás.


b) A bizonyítás azt adja, hogy a feladatban szereplő háromszögek területe a hatszög és a  $PQR$  (ill. a vele egybevágó  $STU$ ) háromszög területének számtani közepe, hogy tehát az  $ACE$  és  $BDF$  háromszögek területe legalább akkora, mint a hatszög területének a fele. Ebből egyszersmind következik, hogy a szomszédos oldalpárok alkotta háromszögek közül legalább az egyik területe nem nagyobb a hatszög területének hatodrésznél. (Sőt ez az  $ABC$ ,  $CDE$ ,  $EFA$ , továbbá a  $BCD$ ,  $DEF$ ,  $FAB$  háromszögek közül legalább egy-egyre teljesül.) Felvetődik az a kérdés, hogy nem érvényes-e a második állítás minden konvex hatszögre. A kérdésre egyelőre nem ismeretes a válasz.

**III. megoldás.** Ha pl. az  $AB$  és  $DE$  oldalak egyenlők, akkor az  $ABDE$  négyszög paralelogramma és így az  $AEF$  és  $DBC$  háromszögek megfelelő oldalai párhuzamosak, továbbá  $AE$  és  $DB$  egyenlősége folytán egyenlők is, tehát a hatszög párhuzamos oldalai egyenlők is (8. ábra). Ebből az  $AE$  és  $DB$  oldalak egyenlőségéhez hasonlóan következik, hogy az  $ACE$  és  $DFB$  háromszög megfelelő oldalai egyenlők, tehát a két háromszög egybevágó.




8. ábra

Ha a szemközti oldalak különböző hosszúságúak, akkor vizsgáljuk meg, hogyan változik a feladatban szereplő háromszögek területe, ha pl. az  $AB$  oldalt eltoljuk, irányát megtartva, a hatszöggel ellenkező oldalra, de úgy, hogy ne érje el az  $AF$  és  $BC$  egyenesek metszéspontját. Az eltoló oldal legyen  $A_1B_1$ . Az  $ACE$  háromszög ugyanannyival változik, mint a változatlanul maradó  $CDE$  háromszög hozzácsatolásával keletkező  $ACDE$  négyszög (9. ábra). Ezt az  $AD$  átlóval kettévágva az  $ACD$  és  $ADE$  háromszögek területének változását vizsgáljuk. Az  $ACD$  és  $A_1CD$  háromszög területe egyenlő, mert  $AA_1 \parallel CD$ . Jelöljük másrészt  $AB$  és  $A_1E$  metszéspontját  $A_2$ -vel, akkor az  $ADE$  és az  $A_2DE$  háromszög területe egyenlő, mert  $AA_2 \parallel DE$ . Így az  $ACDE$  négyszög – és vele együtt az  $ACE$  háromszög – területe az  $A_1DE$  és  $A_2DE$  háromszög területének különbségével, vagyis az  $A_1DA_2$  háromszög területével nő. Ugyanígy látható –  $AB$  és  $B_1D$  metszéspontját  $B_2$ -vel jelölve –, hogy a  $BDF$  háromszög területe a  $B_1EB_2$  háromszög területével nő.




9. ábra

Az  $A_1DA_2$  és  $B_1EB_2$  háromszögek azonban egyenlő területűek (10. ábra), mert úgy származtathatók, hogy az  $A_1DE$  háromszögből  $A_2DE$ -t, ill.  $B_1DE$ -ből  $B_2DE$ -t elhagyjuk, és itt a kisebbítendő  $A_1B_1 \parallel DE$  folytán, a kivonandók pedig  $A_2B_2 \parallel DE$  folytán egyenlők. Az  $ACE$  és  $BDF$  háromszög területe tehát ugyanannyival változik.



Tegyük most fel, hogy  $AB > DE$  (ellenkező esetben  $AB$  és  $DE$  szerepét felcseréljük). Úgy mozdítsuk el  $AB$ -t, hogy  $A_1B_1 = DE$  legyen. Ekkor tudjuk, hogy  $A_1CE$  és  $B_1DF$  egyenlő területű,  $ACE$  és  $BDF$  pedig ezektől egyenlő területekkel különböznek, tehát szintén egyenlő területűek. Ezt kellett bizonyítanunk.

**IV. megoldás.** Egészítsük ki a hatszöget az  $AB$ ,  $CD$ ,  $EF$  oldalak meghosszabbításával egy  $PQR$  háromszöggé (11. ábra). Ezt a háromszöget és a területét is jelöljük  $T$ -vel. A hatszöget  $T$ -ből a hozzá hasonló  $PED$ ,  $FQA$  és  $CBR$  háromszögek levágásával kapjuk. Ezekben az oldalak legyenek  $T$  oldalainak;  $\lambda$ -szorosai,  $\mu$ -szőrösei, ill.  $\nu$ -szőrösei.



11. ábra

Az  $ACE$  háromszöget  $T$ -ből az  $ARC$ ,  $CPE$  és  $EQA$  háromszögek lemetszésével kapjuk. Az elsőnek  $AR$  oldala a  $QR$  oldal  $1 - \mu$ -szőröse, magassága pedig – mint a  $CBR$  háromszög  $C$ -ből húzott magassága – a  $T$  háromszög  $P$ -ből  $QR$ -re bocsátott magasságának  $\nu$ -szőröse. Így a háromszög területe  $(1 - \mu)\nu T$ . Hasonlóan számítva a másik két háromszög területét is a következő területegyenlőséget kapjuk:

$$\begin{aligned} ACE &= T - (1 - \mu)\nu T - (1 - \nu)\lambda T - (1 - \lambda)\mu T = \\ &= T(1 - \lambda - \mu - \nu + \lambda\mu + \mu\nu + \nu\lambda). \end{aligned}$$

A  $BDF$  háromszögre hasonlóan számolva azt nyerjük, hogy

$$\begin{aligned} BDF &= T - (1 - \lambda)\nu T - (1 - \mu)\lambda T - (1 - \nu)\mu T = \\ &= T(1 - \lambda - \mu - \nu + \lambda\mu + \mu\nu + \nu\lambda), \end{aligned}$$

tehát

$$ACE = BDF.$$

**V. megoldás.** A feladat megoldása nem igényel különösebb ötletet, ha koordinátageometriát alkalmazunk. Válasszuk meg a koordinátatengelyeket úgy, hogy az  $y$ -tengely ne legyen párhuzamos a hatszög egyik oldalával sem. Ekkor az oldalak iránytangense létezik. Az  $A, B, C, D, E, F$  pontok koordinátáit jelöljük sorra  $(x_1, y_1), \dots, (x_6, y_6)$ -tal.


Azt tudjuk, a szemközti oldalpárok párhuzamosak, tehát iránytangenseik különbsége 0:

$$\frac{y_1 - y_6}{x_1 - x_6} - \frac{y_4 - y_3}{x_4 - x_3} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \frac{y_6 - y_5}{x_6 - x_5} = \frac{y_5 - y_4}{x_5 - x_4} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = 0.$$

Ez csak úgy lehet, ha közös nevezőre hozás után a számlálók értéke, és így ezek összege is 0. Rendezzük ezt az összeget az  $x$ -ek szerint:

$$\begin{aligned} 0 &= (x_4 - x_3)(y_1 - y_6) - (x_1 - x_6)(y_4 - y_3) + (x_6 - x_5)(y_3 - y_2) - \\ &\quad - (x_3 - x_2)(y_6 - y_5) + (x_2 - x_1)(y_5 - y_4) - (x_5 - x_4)(y_2 - y_1) = \\ &= x_1(y_3 - y_5) + x_2(y_6 - y_4) + x_3(-y_1 + y_5) + x_4(-y_6 + y_2) + \\ &\quad + x_5(-y_3 + y_1) + x_6(y_4 - y_2). \end{aligned}$$


A maradó első, harmadik és ötödik tag összege az  $ACE$  háromszög kétszeres területét adja, a második, negyedik és hatodik pedig negatív előjellel a  $BDF$  háromszög kétszeres területét. A két háromszög területe tehát egyenlő, és ezt kellett bizonyítanunk.



12. ábra

*Megjegyzés.* Figyeljük meg, hogy a bizonyítás egyedül a szemközti oldalak párhuzamosságát használja fel, tehát a hatszög konvex voltát nem, sőt még akkor is helyes marad, ha az oldalak egymást (a csúcsoktól különböző pontokban) átmetszik. (Néhány ilyen hatszöget mutat a 12. ábra.) Másrészt a háromszögek területét a használt képlet előjellel adja, tehát a bizonyítás azt is adja, hogy az  $ACE$  és  $BDF$  háromszögek körüljárása is mindig megegyezik. Erre az általánosabb állításra adunk most egy koordinátákat nem használó bizonyítást is.

**VI. megoldás.** Egy  $ABC$  háromszög területét tekintjük pozitívnak vagy negatívnak aszerint, amint a háromszöget a csúcsok megadott sorrendje szerint körüljárva az óra járásával ellentétes vagy azzal egyező irányban haladunk.



13. ábra

Könnyen látható, hogy az  $ABC$  háromszög síkjának egy tetszés szerinti  $O$  pontjára (13. ábra) – háromszögek előjeles területét ugyanúgy jelölve, mint magát a háromszöget – fennáll a következő összefüggés:

$$(2) \quad ABC = OAB + OBC + OCA.$$

Ha valamelyik három pont egy egyenesre esik, akkor a keletkező egyenesszakasszá fajult „háromszög” területén természetesen 0-t értünk. Ezt felhasználva választunk az adott hatszög síkjában egy  $O$  pontot, és minden háromszöget olyan háromszögekből teszünk össze, amelyeknek egyik csúcsa  $O$ .

Előjeles területekre is igaz, hogy ha az  $ABC$  és  $ABD$  háromszögek  $C$  és  $D$  csúcsát összekötő egyenes párhuzamos az  $AB$  oldallal, akkor a két háromszög területe egyenlő, mert az abszolút értékekről tudjuk ezt, de a körüljárás sem változhat meg, ha egy csúcsot a szemközti oldallal párhuzamosan mozdítunk el.

Ha tehát  $ABCDEF$  egy olyan hatszög, amelyben  $AB \parallel DE$ ,  $BC \parallel EF$  és  $CD \parallel FA$ , akkor az  $ABE$  és  $ABD$ , a  $CDA$  és  $CDF$  és az  $EFC$  és  $EFB$  háromszögek területe egyenlő, tehát (2)-t alkalmazva

$$\begin{aligned} OAB + OBE + OEA &= OAB + OBD + ODA, \\ OCD + ODA + OAC &= OCD + ODF + OFC, \\ OEF + OFC + OCE &= OEF + OFB + OBE. \end{aligned}$$

Itt az első oszlopban a jobb és bal oldalon ugyanazok a háromszögek állnak, a bal második oszlopban pedig azok, mint a jobb harmadik oszlopban, csak más sorrendben. Így a három egyenlőséget összeadva és az egyenlő tagokat a két oldalon elhagyva azt kapjuk, hogy

$$OEA + OAC + OCE = OBD + ODF + OFB,$$

amiből (2) alapján

$$EAC = BDF,$$

és ezt akartuk bizonyítani.

**VII. megoldás.** Megoldható a feladat vektorok segítségével is. Ehhez a vektorok vektoriális szorzatát fogjuk felhasználni és annak következő tulajdonságait.<sup>4</sup>

Az  $\mathbf{r}$  és  $\mathbf{s}$  vektorok vektoriális szorzatán – amit  $\mathbf{r} \times \mathbf{s}$ -sel jelölünk – azt a vektort értjük, amelynek hossza az  $\mathbf{r}$  és  $\mathbf{s}$  vektorokból alkotható paralelogramma területének a mérőszámával egyenlő, amely merőleges az  $\mathbf{r}$  és  $\mathbf{s}$  síkjára és annak arra az oldalára mutat, amelyikről nézve  $\mathbf{r}$ -t pozitív (az óramutató járásával ellentétes) irányban lehet  $180^\circ$ -nál kisebb szöggel  $\mathbf{s}$ -re ráforgatni.

Párhuzamos vektorok vektoriális szorzata 0-vektort ad.


Egy vektoriális szorzat két tényezőjét felcserélve a szorzat előjelet vált.

A vektoriális szorzatra érvényes a disztributív tulajdonság, vagyis bármely három  $\mathbf{r}, \mathbf{s}, \mathbf{t}$  vektorra fennállnak az

$$\mathbf{r} \times (\mathbf{s} + \mathbf{t}) = \mathbf{r} \times \mathbf{s} + \mathbf{r} \times \mathbf{t} \quad \text{és} \quad (\mathbf{s} + \mathbf{t}) \times \mathbf{r} = \mathbf{s} \times \mathbf{r} + \mathbf{t} \times \mathbf{r}$$

azonosságok.

<sup>4</sup>Lásd pl. Feldmann L., Vektoralgebra (Középiskolai szakköri füzet) 20–27. o.



14. ábra

Ezeket felhasználva azt fogjuk bebizonyítani, hogy a hatszögből az  $ACE$  háromszög oldalai által lemetezett háromszögek területösszege és a  $BDF$  háromszög oldalai által lemetezetté egyenlő. A 14. ábrán feltüntetett jelöléseket használva az előbbi összeg kétszeresét az

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b}_1 + \mathbf{b} \times \mathbf{c}_1 + \mathbf{c} \times \mathbf{a}_1$$

vektor képviseli, az utóbbi kétszeresét pedig a

$$\mathbf{c}_1 \times \mathbf{a} + \mathbf{a}_1 \times \mathbf{b} + \mathbf{b}_1 \times \mathbf{c}$$

összeg. Ha a hatszög konvex, akkor mind a hat vektor a síkjának ugyanarra az oldalára mutat. Ezek különbségéről kell belátnunk, hogy az 0.

A különbséget úgy fogjuk képezni, hogy a második sor összeadandóinak a tényezőit felcseréljük. Ha még ehhez az összeghez  $\mathbf{a} \times \mathbf{a}_1 + \mathbf{b} \times \mathbf{b}_1 + \mathbf{c} \times \mathbf{c}_1$ -et adunk, ezzel az összeg értékét nem változtattuk meg, mert párhuzamos vektorok szorzatait adtuk hozzá. Elegendő tehát a következő kifejezésről megmutatni, hogy a 0-vektorral egyenlő:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b}_1 + \mathbf{b} \times \mathbf{c}_1 + \mathbf{c} \times \mathbf{a}_1 + \mathbf{a} \times \mathbf{c}_1 + \mathbf{b} \times \mathbf{a}_1 + \mathbf{c} \times \mathbf{b}_1 + \mathbf{a} \times \mathbf{a}_1 + \\ + \mathbf{b} \times \mathbf{b}_1 + \mathbf{c} \times \mathbf{c}_1 = (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) \times (\mathbf{a}_1 + \mathbf{b}_1 + \mathbf{c}_1). \end{aligned}$$

Azonban zárt hatszögről lévén szó

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} + \mathbf{a}_1 + \mathbf{b}_1 + \mathbf{c}_1 = \mathbf{0},$$

vagyis az első három vektor összege a második hároménak negatívja, azzal tehát párhuzamos, és így vektori szorzatuk 0. Ezt kellett bizonyítanunk.

*Megjegyzés.* Ennél a megoldásnál látszólag ismét kihasználtuk a hatszög konvex voltát. Belátható azonban, hogy előjeles területtel számolva minden hatszögnek (és minden zárt sokszögnek) tulajdoníthatunk területet, az  $ABCDEF$  hatszögnek pl. az  $ABC + ACD + ADE + AEF$  területösszeget. Ez nem változik meg azáltal, ha  $A$  helyett egy másik csúcsból kiinduló átlóival bontjuk háromszögekre a hatszöget. Az  $ACE$  háromszöget az  $ABC$ ,  $CDE$ ,  $EFA$  háromszögek (előjeles) területei a hatszög így értelmezett területére „egészítik ki”, és hasonlóan  $BDF$ -et a  $BCD$ ,  $DEF$ ,  $FAB$  háromszögek. Végül a felírt vektori szorzatok tetszőleges hatszög esetén a megfelelő háromszögek előjeles területeit képviselik. Ezek végiggondolásával adódik, hogy az utolsó bizonyítás is kiadja az állítást bármilyen hatszögre, amelynek a szemközti oldalai párhuzamosak.