

**1. feladat.** Bizonyítsuk be, hogy ha  $x, y, z$  különböző egész számok,  $n$  pedig nem negatív egész szám, akkor

$$(1) \quad \frac{x^n}{(x-y)(x-z)} + \frac{y^n}{(y-x)(y-z)} + \frac{z^n}{(z-x)(z-y)}$$

értéke egész szám.

**I. megoldás.** Azt fogjuk megmutatni, hogy a kifejezést közös nevezőre hozva a számláló osztható a nevezővel, közelebből azt, hogy a nevező tényezői kiemelhetők a számlálóból, a visszamaradó tényező  $x, y, z$ -nek egész együtthatós polinomja. Így ha  $x, y, z$  egész, akkor a kifejezés értéke is egész szám.

A közös nevezőre hozott alak

$$(2) \quad \frac{x^n(y-z) + y^n(z-x) + z^n(x-y)}{(x-y)(x-z)(y-z)}.$$

Itt  $n = 0$ -ra a számláló

$$(y-z) + (z-x) + (x-y) = 0,$$

s így 0 a kifejezés értéke. Másrészt ebből

$$x-y = -(y-z) - (z-x).$$

Ezt felhasználva a számláló tetszés szerinti  $n$ -re a következőképpen alakítható:

$$(x^n - z^n)(y-z) + (y^n - z^n)(z-x).$$

Ez  $n = 1$ -re 0-t ad, ha pedig  $n \geq 2$ , akkor  $(x-z)(y-z)$ -t, kiemelve a következőt kapjuk:

$$\begin{aligned} & (x-z)(y-z)[x^{n-1} + x^{n-2}z + \dots + xz^{n-2} + z^{n-1} - \\ & \quad - y^{n-1} - y^{n-2}z - \dots - yz^{n-2} - z^{n-1}] = \\ & = (x-y)(x-z)(y-z)[(x^{n-2} + x^{n-3}y + \dots + xy^{n-3} + y^{n-2}) + \\ & \quad + z(x^{n-3} + \dots + y^{n-3}) + \dots + z^{n-2}]. \end{aligned}$$

Itt a szögletes zárójelben  $x, y, z$ -nek egész együtthatós polinomja áll állításunknak megfelelően. (Az  $n = 2$  esetben a szögletes zárójelben csak az utolsó tag, az  $n = 3$  esetben pedig csak az első kifejezés és az utolsó tag lép fel.)

*Megjegyzés.* 1. Ha  $n \geq 2$ , a szögletes zárójelben egyszerű felépítésű polinom keletkezett: azoknak az  $x, y, z$  hatványait tartalmazó szorzatoknak az összege, amelyekben a hatványkitevők összege  $n - 2$ .

2. Sok versenyző a feladat állítását bizonyítottan vélte annyit mutatva meg, hogy a (2) alatti kifejezés számlálóját osztható külön-külön az  $x - y, x - z, y - z$  egészekkel. Ebből azonban csak akkor következtethetnénk arra, hogy ezek szorzatával is osztható a számláló, ha a három különbség semelyik kettőjének nem volna 1-nél nagyobb közös osztója; ez azonban általában nem teljesül.

Helyessé tehető ez az okoskodás, ha a számlálót és nevezőt az  $x, y, z$  változók polinomjának tekintjük. Ekkor az  $x - y, x - z, y - z$  polinomoknak nincs változót tartalmazó közös osztója, és mindegyik kiemelhető a számlálóban szereplő polinomból. Ebből az egész együtthatós polinomok körében is következik, hogy a három kifejezés szorzata is kiemelhető a számlálóból. Néhány versenyző ezen az úton helyes bizonyítást adott a feladat állítására, ezzel azonban lényegesen mélyebb tételt használt fel bizonyítatlanul, mint a bizonyítandó állítás.

Helyessé tehető azonban ez a gondolatmenet a gyöktényezők kiemelésére vonatkozó tételt a következő alakban használva fel: *Ha egy  $f(x)$  polinomnak gyöke a  $t$  szám, akkor  $f(x)$  felbontható  $x - t$ -nek és egy polinomnak a szorzatára. Ha  $f(x)$  egész együtthatós, és  $t$  is egész szám, akkor  $x - t$  szorzója is egész együtthatós polinom.* Ez könnyen leolvasható a gyöktényező kiemelésére vonatkozó szokásos bizonyításokból például a következő módon: Legyen

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n \quad \text{és} \quad f(t) = 0.$$

Ekkor

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x) - f(t) = a_0(x^n - t^n) + a_1(x^{n-1} - t^{n-1}) + \dots + a_{n-1}(x - t) = \\ &= (x-t)[a_0(x^{n-1} + x^{n-2}t + \dots + t^{n-1}) + a_1(x^{n-2} + \dots + t^{n-2}) + \dots + a_{n-1}] = \\ &= (x-t)[a_0x^{n-1} + (a_0t + a_1)x^{n-2} + (a_0t^2 + a_1t + a_2)x^{n-3} + \dots + \\ & \quad + (a_0t^{n-1} + a_1t^{n-2} + \dots + a_{n-1})]. \end{aligned}$$

Ha itt az  $a_i$  együtthatók és  $t$  egész szám, akkor nyilvánvalóan egész együtthatós a szögletes zárójelben levő kifejezés is.

Ennek alapján a feladat állítása így látható be:

**II. megoldás.** A (2) kifejezés számlálója 0, ha  $n$  értéke 0 vagy 1. Ha  $n \geq 2$ , akkor rendezzük a kifejezés számlálóját  $x$  hatványai szerint, és végezzük el a kínálkozó kiemelést:

$$(3) \quad \begin{aligned} & x^n(y-z) - x(y^n - z^n) + yz(y^{n-1} - z^{n-1}) = \\ & = (y-z)[x^n - x(y^{n-1} + y^{n-2}z + \dots + z^{n-1}) + yz(y^{n-2} + \dots + z^{n-2})]. \end{aligned}$$

(Itt  $n = 2$  esetén a szögletes zárójelben az utolsó tag utolsó tényezőjén az 1 számot kell érteni.) Tekintsük ezt most az  $x$  változó polinomjának,  $y$  és  $z$  pedig jelentsenek adott különböző egész számokat. Ekkor (3) bal oldala eltűnik az  $x = y$  helyen, így a jobb oldal második tényezője is, mert  $y$  és  $z$  különböző. Ez a tényező egész együtthatós és  $y$  is egész, így kiemelhető az  $x - y$  tényező és kiemelése után egy egész együtthatós polinom marad vissza.

Ez a polinom eltűnik az  $x = z$  helyen, mert (3) bal oldala eltűnik, viszont a jobb oldalon az előző kiemelés után keletkezett  $(y-z)(x-y)$  szorzat nem tűnik el, mivel  $y$  és  $z$  különböző. Így kiemelhető még az  $x - z$  tényező is és ismét  $x$  egész együtthatós polinomja marad vissza. Ha az így átalakított számlálóban  $x$  helyébe is az adott egész értéket helyettesítjük, azt kapjuk, hogy a számláló az  $(y-z)(x-y)(x-z)$  szorzatnak egy egész többszöröse, tehát a (2) kifejezés egész szám.

**III. megoldás.** Jelöljük az (1) kifejezést  $P_n(x, y, z)$ -vel. Teljes indukcióval fogjuk bizonyítani, hogy ez az  $x, y, z$  változók egész együtthatós polinomja.

Az állítás  $n = 0$ -ra igaz, mert  $P_0(x, y, z)$  azonosan 0.

Tegyük fel, hogy valamilyen  $n = k$  értékre  $P_k(x, y, z)$  egész együtthatós polinom. Kiküszöbölve  $P_{k+1}(x, y, z)$ -ből és  $P_k(x, y, z)$ -ből a harmadik tagot a következő azonossághoz jutunk:

$$P_{k+1}(x, y, z) - zP_k(x, y, z) = \frac{x^{k+1} - zx^k}{(x-y)(x-z)} + \frac{y^{k+1} - zy^k}{(y-x)(y-z)} = \frac{x^k - y^k}{x-y},$$

azaz

$$(4) \quad P_{k+1}(x, y, z) = zP_k(x, y, z) + (x^{k-1} + x^{k-2}y + \dots + y^{k-1}),$$

ahol  $k = 0$ -ra a zárójelben álló összeg 0-val helyettesítendő. Ebből azonnal következik, hogy  $P_k(x, y, z)$ -vel együtt  $P_{k+1}(x, y, z)$  is  $x, y, z$  egész együtthatós polinomja. Állításunk tehát minden nem negatív egész  $n$ -re érvényes.

*Megjegyzés.* A (4) azonosság mindjárt módot is ad a  $P_n(x, y, z)$  polinomok lépésről lépésre történő – úgynevezett rekurzív – meghatározására. Megkaphatjuk ebből  $P_n(x, y, z)$  explicit előállítását is, teljes indukcióval bebizonyíthatjuk az I. megoldáshoz fűzött 1. megjegyzés állítását.

**IV. megoldás.** Az (1) kifejezést tekinthetjük a

$$\begin{aligned} P_n^{(k)}(x_1, x_2, \dots, x_k) &= \frac{x_1^n}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3) \dots (x_1 - x_k)} + \\ &+ \frac{x_2^n}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3) \dots (x_2 - x_k)} + \dots + \frac{x_k^n}{(x_k - x_1)(x_k - x_2) \dots (x_k - x_{k-1})} \end{aligned}$$

kifejezések speciális esetének, ha  $k = 3$ . Értelem szerint  $P_n(x_1)$ -en  $x_1^n$ -t értjük. Az alábbi megfontolások erre az esetre is érvényesek. Megmutatjuk, hogy ezek a kifejezések minden  $k$ -ra és tetszés szerinti nem negatív egész  $n$ -re a változók egész együtthatós polinomjai.

A bizonyítás történhetik a változók számára vonatkozó teljes indukcióval. A  $k = 1$  értékre

$$P_n^{(1)}(x_1) = x_1^n$$

az  $x_1$  változó egész együtthatós polinomja.

Tegyük fel, hogy ha  $k$  valamilyen  $l - 1$  értékkel egyenlő (ahol  $l - 1 \geq 1$ ), akkor  $P_n^{(l-1)}(x_1, \dots, x_{l-1})$  a változónak egész együtthatós polinomja. Ekkor képezzük a

$$P_n^{(l-1)}(x_1, \dots, x_{l-2}, x_{l-1}) - P_n^{(l-1)}(x_1, \dots, x_{l-2}, x_l)$$

kifejezést. Itt az  $x_i^n$  számlálójú tag mindkét kifejezésben fellép, ha  $l > 2$  és  $i \leq l - 2$ , a nevezők pedig egyenlővé válnak, ha az első törtet  $x_i - x_l$ -lel, a másodikat  $x_i - x_{l-1}$ -gyel bővítjük. Ekkor a számlálóban

$$x_i^n(x_i - x_l) - x_i^n(x_i - x_{l-1}) = x_i^n(x_{l-1} - x_l)$$

lesz, tehát a két tört összevonásával az

$$\frac{x_i^n(x_{l-1} - x_l)}{(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_{l-1})(x_i - x_l)}$$

tag keletkezik. Az első, ill. második kifejezés utolsó tagját  $x_{l-1} - x_l$ -lel bővítve így alakítjuk át:

$$\frac{x_{l-1}^n}{(x_{l-1} - x_1) \dots (x_{l-1} - x_{l-2})} = \frac{x_{l-1}^n (x_{l-1} - x_l)}{(x_{l-1} - x_1) \dots (x_{l-1} - x_{l-2})(x_{l-1} - x_l)},$$

ill.

$$-\frac{x_l^n}{(x_l - x_1) \dots (x_l - x_{l-2})} = \frac{x_l^n (x_{l-1} - x_l)}{(x_l - x_1) \dots (x_l - x_{l-2})(x_l - x_{l-1})}.$$

Így a következő azonosságra jutunk, kiemelve a minden tagban közös  $(x_{l-1} - x_l)$  tényezőt:

$$(5) \quad P_n^{(l-1)}(x_1, \dots, x_{l-2}, x_{l-1}) - P_n^{(l-1)}(x_1, \dots, x_{l-2}, x_l) = (x_{l-1} - x_l) P_n^{(l)}(x_1, \dots, x_l).$$

Itt a bal oldalon  $P_n^{(l-1)}(x_1, \dots, x_{l-2}, x_{l-1})$  és  $P_n^{(l-1)}(x_1, \dots, x_{l-2}, x_l)$  az indukciós feltevés szerint a változók egész együtthatós polinomja; az utóbbi úgy nyerhető az előbbiből, hogy  $x_{l-1}$  helyébe  $x_l$ -et írunk. Így az egyiket  $x_{l-1}$ , a másikat  $x_l$  hatványai szerint rendezve a két kifejezésben  $x_{l-1}$ , ill.  $x_l$  egyenlő hatványainak megegyezik az együtthatója. A különbségben ezeket a közös együtthatókat kiemelve  $x_{l-1}^r - x_l^r$  alakú különbségek lépnek fel. Ezek mindegyikéből, s így (5) bal oldalából is kiemelhető az  $x_{l-1} - x_l$  tényező. A visszamaradó tényező, ami (5) szerint  $P_n^{(l)}(x_1, \dots, x_l)$ -et adja, az  $x_1, \dots, x_l$  változók egész együtthatós polinomja. Ezzel indukciós bizonyításunkat befejeztük.

*Megjegyzések.* 1. A bizonyítást lépésről lépésre követve az is könnyen bizonyítható teljes indukcióval, hogy  $P_n^{(k)}(x_1, \dots, x_k)$  az  $x_1, \dots, x_k$  változók hatványaiból képezett összes olyan szorzatok összege, amelyekben a kitevők összege  $n - k + 1$ , ha  $n \geq k$ ;  $P_n^{(k)}$  azonosan egyenlő 1-gyel, ha  $n = k - 1$ , ha pedig  $n \leq k - 1$ , akkor 0-val.

2. Az eddigi bizonyítások mindegyike felhasználta az

$$a^k - b^k = (a - b)(a^{k-1} + a^{k-2}b + \dots + ab^{k-2} + b^{k-1})$$

azonosságot. A következő – lényegében ARATÓ PÉTER dolgozatából származó – megoldásban erre sincs szükség.

## V. megoldás. A

$$(t - x)(t - y)(t - z) = t^3 - (x + y + z)t^2 + (xy + xz + yz)t - xyz$$

kifejezés, mint  $t$  polinomja nyilván eltűnik a  $t = x$ ,  $t = y$ ,  $t = z$  helyeken és ugyanez áll a kifejezés  $t^n$ -szeresére is. Így ha  $t$  az  $x$ ,  $y$ ,  $z$  akármelyikét jelenti, azonosan teljesül, hogy

$$(6) \quad t^{n+3} = t^{n+2}(x + y + z) - t^{n+1}(xy + xz + yz) + t^n xyz, \\ (t = x, \quad \text{vagy} \quad t = y, \quad \text{vagy} \quad t = z)$$

(ami különben közvetlenül is könnyen belátható).

Jelöljük a feladatban szereplő kifejezést  $P_n(x, y, z)$ -vel, amint a III. megoldásban is tettük, akkor  $P_{n+3}(x, y, z)$  tagjainak számlálójában felhasználva a (6) azonosságokat, a következő azonossághoz jutunk:

$$P_{n+3}(x, y, z) = (x + y + z)P_{n+2}(x, y, z) - (xy + xz + yz)P_{n+1}(x, y, z) + xyzP_n(x, y, z).$$

Ebből látjuk, hogy ha kifejezésünk  $n$  három egymásutáni egész értékére a változók egész együtthatós polinomja, akkor ugyanez áll minden nagyobb  $n$  egész számra is. Mivel pedig  $P_0(x, y, z) = P_1(x, y, z) = 0$ ,  $P_2(x, y, z) = 1$ , így  $P_n(x, y, z)$  minden nem negatív egész  $n$ -re az  $x$ ,  $y$ ,  $z$  változók egész együtthatós polinomja.

*Megjegyzés.* Az V. megoldás módszerével is bizonyítható a IV. megoldásban szereplő általánosabb állítás tetszés szerinti adott  $k$ -ra, csak ekkor  $n = 0, 1, \dots, k - 1$ -re kell meghatározni  $P_n^{(k)}(x_1, x_2, \dots, x_k)$  értékét.

**2. feladat.** *Megmértük egy vízszintes terepen álló antennatorony emelkedési szögét a talppontjától 100 m, 200 m és 300 m távolságból. A három szög összege  $90^\circ$ . Milyen magas a torony?*

Igen egyszerű trigonometriai megoldás kínálkozik a feladatra és a versenyzők mind ilyen utat is választottak.

**I. megoldás.** Jelöljük a torony magasságát méterben mérve  $x$ -szel, a látószögét 100, 200, 300 m-ről rendre  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ -val, ekkor

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{x}{100}, \quad \operatorname{tg} \beta = \frac{x}{200}, \quad \operatorname{tg} \gamma = \frac{x}{300},$$

és feltétel szerint  $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$ , tehát

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{x}{300} = \operatorname{tg} [90^\circ - (\alpha + \beta)] = \operatorname{ctg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta - 1}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta} = \\ = \frac{\frac{100}{x} \cdot \frac{200}{x} - 1}{\frac{100}{x} + \frac{200}{x}} = \frac{100 \cdot 200 - x^2}{300x}.$$

Innen


$$2x^2 = 100 \cdot 200,$$

és mivel  $x$  gyanánt csak pozitív érték jön számításba, tehát a torony magassága  $x = 100$  m.

*Megjegyzés.* Mint többen észrevették, megoldható a feladat ugyanezzel a gondolatmenettel akkor is, ha tetszés szerinti  $a, b, c$  távolságokból mért  $\alpha, \beta, \gamma$  látószögekről tudjuk azt, hogy összegük  $90^\circ$ . Ekkor a torony magassága  $\sqrt{abc/(a+b+c)}$ .

Megoldható azonban a feladat lényegesen egyszerűbb összefüggésekre támaszkodva is.

**II. megoldás.** Sík talajon nem lényeges, hogy milyen irányból mérjük a torony látószögét az adott távolságokból, válasszuk tehát a 100, ill. 200 m távolságra levő  $A$ , ill.  $B$  pontokat a toronytól egymással ellentétes irányban, a  $\gamma$  látószöget pedig szemléltessük úgy, hogy a  $B$  pontból az  $AB$  egyenesnek a torony  $C$  csúcsával ellentétes oldalán mérünk fel  $AB$ -re merőlegesen a torony magasságával egyenlő  $BD$  távolságot. Ekkor  $BAD\angle = \gamma$ , mert  $AB = 300$  m.




1. ábra

A torony  $T$  talppontja,  $C$  csúcsa továbbá a  $B$  és  $D$  pontok meghatározta négyszög paralelogramma, mert két oldala egymással párhuzamos és egyenlő, tehát  $CD$  a  $TB$  szakaszt  $E$  felezőpontjában metszi. Eszerint  $ET = 100$  m, s így  $TEC\angle = \alpha$ , az  $ACE$  háromszög egyenlő szárú. Megállapíthatjuk  $C$ -nél levő szögének a nagyságát is abból, hogy az  $ADBC$  négyszög  $A$ -nál és  $B$ -nél levő (szemben fekvő) szögeinek összege  $\alpha + \gamma + \beta + 90^\circ$ , a feltétel szerint  $180^\circ$ -ot ad; a négyszög tehát húrnégyszög, és  $AD$  a körülírt kör átmérője, mert a  $B$  pontból  $90^\circ$ -os szögben látszik. Így az  $ACD\angle = ACE\angle$  szintén  $90^\circ$ -os, az  $ACE$  egyenlő szárú háromszög tehát derékszögű. Ebből adódik, hogy  $\alpha = 45^\circ$ , így az  $ATC$  derékszögű háromszög ugyancsak egyenlő szárú, tehát a torony magassága 100 m.

**III. megoldás.** Rajzoljuk meg a tornyot háromféleképpen. Két oldalról egyrészt az  $\alpha$  és  $\beta$  látószögű egyenesekkel, másrészt  $\beta$  és  $\gamma$ , harmadrészt  $\gamma$  és  $\alpha$  látószögű egyenesekkel (2. ábra). A keletkező három háromszögben az  $A_1B_1, B_2C_2, C_3A_3$  oldalakon levő szögek összege  $2\alpha + 2\beta + 2\gamma = 180^\circ$ , így a  $D_1, D_2, D_3$ -nál levő szögek összege  $360^\circ$ . Mivel még  $B_1D_1 = B_2D_2, C_2D_2 = C_3D_3, A_3D_3 = A_1D_1$ , így a három háromszög egy  $ABC$  háromszöggé tehető össze. Ennek oldalai  $AB = 300$  m,  $BC = 500$  m,  $CA = 400$  m kielégítik a


$$BC^2 = CA^2 + AB^2$$

összefüggést, és ismeretes, hogy ebből következik a háromszög derékszögű volta, (a Pythagorász-tétel megfordítható) derékszöggel az  $A$  csúcsnál. Így  $2\alpha = 90^\circ$ , és ebből következik, hogy a torony 100 m magas.



2. ábra

*Megjegyzés.* A II. megoldás lényegesen kihasználja a feladat speciális adatait, a III. azonban csak részben. Ha ugyanis megfigyeljük, hogy az összeillesztésnél a  $D_1, D_2, D_3$  egybeesésével keletkező  $D$  pont az  $ABC$  háromszög beírt körének a középpontja, akkor területszámítás segítségével más távolságadatok mellett is meghatározható a torony magassága.



**3. feladat.** *Három fiúr egy napon látogatott meg egy beteget. Ugyanazon a napon mindegyiknek a felesége is ott járt. Egyikük sem volt ott aznap többször. Mindhárom fiúr találkozott a betegágynál mindkét sógornőjével. Bizonyítandó, hogy valamelyikük a feleségével is találkozott ott.*

**I. megoldás** (KÓTA GÁBOR dolgozata nyomán). Tegyük fel, hogy pl.  $A$  és  $A$ -né nem találkozott a betegágynál. Ekkor  $A$ -né vagy elment, mielőtt férje megérkezett és ez esetben korábban távozott a betegágytól mint két sógornője, hiszen ők találkoztak a betegágynál az  $A$ -né távozása után érkező  $A$ -val, vagy pedig  $A$ -né  $A$  távozása után érkezett és ekkor később érkezett mint két sógornője, hiszen azoknak  $A$  távozása előtt kellett a beteghez érkezniük. Csak úgy lehet tehát, hogy egy asszony nem találkozott a férjével, ha vagy előbb távozott, mint a két sógornője, vagy később érkezett náluk.

Azonban három asszony közül legalább az egyik sem nem érkezett a másik kettő után, sem nem távozott azok távozása előtt, így legalább egynek találkoznia kellett a férjével.

**II. megoldás.** Indirekt úton bizonyítjuk a feladat állítását. Tegyük fel, hogy egyik házaspár sem találkozott a betegágynál. Ez esetben, ha pl.  $A$  előbb érkezett  $A$ -nénél, akkor el is kellett távoznia felesége érkezése előtt. Viszont találkozott  $B$ -nével, tehát  $B$ -né előbb érkezett mint  $A$ -né.  $B$ -nek felesége távozása után kellett érkeznie, csak így találkozhatott  $A$ -nével anélkül, hogy feleségével találkozott volna. Ha  $A$  a felesége után érkezett a betegágyhoz, akkor fenti megfontolásunkban férj és feleség szerepét mindenütt megcserélve szintén azt nyerjük, hogy férj és feleség a  $B$  házaspárból fordított sorrendben kellett, hogy a betegágyhoz érkezzék, mint az  $A$  házaspárból.

Ugyanezt a megfontolást megismételve egyrészt az  $A$  és  $C$  házaspárra, másrészt a  $B$  és  $C$  házaspárra azt kapjuk, hogy  $C$  és  $C$ -né fordított sorrendben kellett hogy a betegágyhoz érkezzék, mint  $A$  és  $A$ -né, de ugyancsak fordított sorrendben, mint  $B$  és  $B$ -né. Ez azonban már lehetetlen, tehát legalább egy házaspárnak találkoznia kellett a betegágynál.

*Megjegyzés.* A most ismertetett megfontolás alkalmas egy általánosabb tétel bizonyítására is. Hogy ezt könnyebben megfogalmazhassuk, előbb átfogalmazzuk az eredeti feladatot.

A három házaspár elhelyezkedhet egy kerek asztal körül pl.  $A$ ,  $B$ -né,  $C$ ,  $A$ -né,  $B$ ,  $C$ -né sorrendben ( $C$ -né másik szomszédja  $A$ ). Ekkor azt mondhatjuk: a hattagú társaság minden tagja meglátogatott (pl. másnap) egy beteg ismerőst. Mindenki csak egyszer járt ezen a napon a betegágynál és mindenki találkozott ott mind a két előző napi asztalszomszédjával. Ez csak úgy történhetett, hogy valaki házastársával (azaz a vele szemben ülővel) is találkozott.

Ez speciális esete a következő általánosabb tételnek: *Egy nap  $n$  házaspár beszélgetett egy asztal körül, ahol úgy helyezkedtek el, hogy mindenki éppen házastársával szemben ült. Elhatározták, hogy másnap mindegyikük meglátogatja egy közös ismerősüket, aki beteg. A látogatás során úgy adódott, hogy mindenki találkozott a betegágynál két előző napi asztalszomszédjával és ezen a napon mindenki csak egyszer járt a betegnél. Ekkor valamelyik házaspár találkozott a betegágynál.*

Tegyük fel az állítással ellentétben, hogy egyik házaspár sem találkozott, noha a többi feltételek teljesültek. Az asztalszomszédok legyenek sorra  $A_1, A_2, \dots, A_{2n}, A_1$ , itt  $A_1$  és  $A_{n+1}, A_2$  és  $A_{n+2}, \dots, A_n$  és  $A_{2n}$  házastársak. Tegyük fel, hogy a betűzést úgy választottuk, hogy  $A_1$  előbb érkezett a betegágyhoz, mint házastársa,  $A_{n+1}$  (és feltevésünk szerint el is kellett távoznia  $A_{n+1}$  érkezése előtt).

Ekkor  $A_2$ , aki találkozott  $A_1$  gyel, előbb kellett, hogy érkezzék, mint  $A_{n+1}$ . Így  $A_{n+2}$ , aki találkozott  $A_{n+1}$ -gyel, de feltevésünk szerint nem találkozott házastársával,  $A_2$ -vel, csak  $A_2$  távozása után érkezhetett. Hasonlóan  $A_{n+3}$ -nak  $A_3$  távozása után kellett érkeznie és így tovább. Így azonban az  $n$ -edik lépésben azt kapjuk, hogy az  $A_{2n}$ -nel találkozó  $A_1$  csak azután érkezhetné a betegágyhoz, miután  $A_n$ -nel találkozó házastársa,  $A_{n+1}$  eltávozott, holott abból indultunk ki, hogy  $A_1$  előbb érkezett mint  $A_{n+1}$ .

Nem lehet tehát, hogy egyik látogató se találkozzék a betegágynál a házastársával.