

*Tudnivalók.* A sorozat első három része az 53. kötet 2. szám 49 – 52. oldalán, az 54. kötet 1. szám 1 – 3. oldalán és az 54. kötet 5. szám 193 – 197. oldalán található. A IV. rész az 55. kötet 2. szám 55 – 58. oldalán van.

A feladatok megoldására pontversenyt nem írunk ki, de a legjobb megoldók között könyvtalványokat sorsolunk ki. A megoldásokat kérjük a lap megjelenését követő hónap 20-ig a szerkesztőség címére (1443 Budapest, Postafiók 129) beküldeni. A borítékra írják rá megoldóink: Pell-féle egyenletek. A megoldásokat nem szükséges külön lapra írni, de mindig írják ki, hogy melyik feladat megoldása következik. Bár a feladatok egymásra épülnek, nem szükséges mindegyiket megoldani. Egyes feladatokat úgy is megoldhatunk, hogy elfogadjuk az előző feladatok állításának helyességét. Az új feladatok kitűzésénél figyelembe vesszük a beküldött megoldások tapasztalatait is; éppen ezért kérjük megoldóinkat, hogy a feladatokkal kapcsolatban minden véleményt, felmerült kérdést írjanak meg.

A IV. rész feladataira helyes megoldást küldtek be: Hajnal Péter, Szabó Sándor (részben), Varga Livia (részben).

#### A IV. részben kitűzött feladatok megoldása

15. feladat. Legyen  $\alpha \in Z[\sqrt{D}]$ ,  $\alpha \neq 1$  és  $N(\alpha) = 1$ . Jelölje  $\varepsilon$  az  $\alpha$ ,  $\bar{\alpha}$ ,  $-\alpha$ ,  $-\bar{\alpha}$  számok közül a legnagyobbat. Bizonyítsuk be, hogy

$$-\varepsilon < -1 < -\bar{\varepsilon} < 0 < \bar{\varepsilon} < 1 < \varepsilon$$

*Megoldás.* A feltételekből azonnal következik, hogy  $\alpha$ ,  $\bar{\alpha}$ ,  $-\alpha$ ,  $-\bar{\alpha}$  mind 0-tól és 1-től különbözők. Mivel  $\alpha\bar{\alpha} = 1$ , ezért  $(-\alpha)(-\bar{\alpha}) = 1$  is teljesül, vagyis  $\alpha$  és  $\bar{\alpha}$ , továbbá  $-\alpha$  és  $-\bar{\alpha}$  egyenlő előjelűek. Az  $\alpha$  és  $-\alpha$  a különböző előjelűek, ezért a négy számból 2 pozitív. Ezek 1-től különböznek és a szorzatuk 1, így közülük a nagyobb 1-nél nagyobb. Mivel a vizsgált számok közül a további kettő negatív, ezért a kiválasztott  $\varepsilon$ -ra  $\varepsilon > 1$  teljesül.  $\varepsilon \cdot \bar{\varepsilon} = 1$  miatt  $\bar{\varepsilon} < 1$  és  $\varepsilon$  pozitívításából  $\bar{\varepsilon} > 0$  következik. Az egyenlőtlenségek negatív számmal való szorzási szabályából már következik a  $-\varepsilon < -1 < \bar{\varepsilon} < 0$  összefüggés.

16. feladat. Legyen  $\varepsilon = a + b\sqrt{D} \in Z[\sqrt{D}]$  olyan, amelyre  $N(\varepsilon) = 1$ . Bizonyítsuk be, hogy  $\varepsilon > 1$  pontosan akkor teljesül, ha  $a$  és  $b$  mindegyike pozitív.

*Megoldás.* Ha  $\varepsilon = a + b\sqrt{D} \in Z[\sqrt{D}]$  olyan, hogy  $a, b > 0$ , akkor nyilvánvalóan teljesül az is, hogy  $\varepsilon > 1$ . Tekintsük másrészt  $\varepsilon$ -nal együtt az  $\bar{\varepsilon}$ ,  $-\varepsilon$ ,  $-\bar{\varepsilon}$  elemeket, ezek:  $a + b\sqrt{D}$ ,  $a - b\sqrt{D}$ ,  $-a - b\sqrt{D}$ ,  $-a + b\sqrt{D}$ . Mivel  $a$  és  $-a$ , továbbá  $b$  és  $-b$  valamelyike pozitív, ezért a négy szám valamelyike pozitív  $u$  és  $v$  egészekkel,  $u + v\sqrt{D}$  alakú. Világos, hogy ezek között éppen ez a legnagyobb, és a 15. feladat állítása szerint ez közülük az egyetlen, amelyik 1-nél nagyobb, tehát ez éppen a kiválasztott  $\varepsilon$ . Így  $\varepsilon = u + v\sqrt{D}$ , ahol  $u, v$  pozitívak.

17. feladat. Bizonyítsuk be, hogy azok között a  $Z[\sqrt{D}]$ -beli  $\varepsilon$  számok között, amelyekre  $N(\varepsilon) = 1$ , és  $\varepsilon > 1$ , van egy  $\varepsilon_1$  legkisebb.

*Megoldás.* A feltételnek eleget tevő  $a + b\sqrt{D}$  számok közül válasszuk ki az  $a_1 + b_1\sqrt{D}$ -t úgy, hogy  $a_1$  minimális legyen. Ilyen létezik, hiszen  $a$  csak pozitív egész lehet. Ekkor  $a_1^2 - b_1^2 D = 1 = a^2 - b^2 D$  következtében  $(b^2 - b_1^2)D = a^2 - a_1^2 > 0$ , és mivel  $b_1$  és  $b$  pozitív ezért  $b_1 < b$ . Így  $a_1 + b_1\sqrt{D} < a + b\sqrt{D}$ , vagyis  $\varepsilon_1 = a_1 + b_1\sqrt{D}$  eleget tesz a kirótt feltételnek.

*Megjegyzés.* A feladat állítása egy sokkal általánosabb tételből is következik. Tekintsük az  $a_1, \dots, a_n$  szám- $n$ -eseket, amelyeknek elemei pozitív egészek, és minden ilyen szám- $n$ -eshez rendeljük hozzá a  $\mu(a_1, \dots, a_n)$  valós számot úgy, hogy

1. Ha  $b_1 \leq a_1, \dots, b_n \leq a_n$ , akkor

$$\mu(b_1, \dots, b_n) \leq \mu(a_1, \dots, a_n).$$

2.  $a_i \leq \mu(a_1, \dots, a_n)$  minden  $i$ -re ( $1 \leq i \leq n$ ).

Ekkor a fenti szám- $n$ -esek bármely  $H$  részhalmazában van olyan  $(b_1, \dots, b_n)$ , hogy tetszőleges  $H$ -beli  $(a_1, \dots, a_n)$  esetén  $\mu(b_1, \dots, b_n) \leq \mu(a_1, \dots, a_n)$ . [Pl. ilyen  $\mu$  lehet  $\mu(a_1, \dots, a_n) = a_1\alpha_1 + \dots + a_n\alpha_n$ , 1-nél nem kisebb  $\alpha_i$  valós számokkal. A feladat ennek speciális esete.]

Az állítást a következőképpen láthatjuk be. Legyen  $c_1, \dots, c_n$  a  $H$  tetszőleges eleme és legyen  $N$  egy, a  $\mu(c_1, \dots, c_n)$  számnál nagyobb természetes szám. Ha mármost  $\mu(a_1, \dots, a_n) \leq \mu(c_1, \dots, c_n)$ , akkor az 1. és 2. feltételek szerint minden egyes  $a_i$  kisebb  $N$ -nél. Az  $a_i$ -k pozitívítása miatt ilyen  $(a_i, \dots, a_n)$  legfeljebb  $N^n$  van, mert minden egyes  $a_i$ -re legfeljebb  $N$  lehetőség van. Így a  $H$  halmazban is csak véges sok olyan  $(a_i, \dots, a_n)$  szám- $n$ -es van, amelyre  $\mu(a_1, \dots, a_n) \leq \mu(c_1, \dots, c_n)$ . E véges sok között van tehát olyan  $(b_1, \dots, b_n)$ , amelyre  $\mu(b_1, \dots, b_n)$  minimális. Ez a  $b_1, \dots, b_n$  viszont az egész  $H$  halmazban megfelelő lesz. Ha ugyanis a  $(d_1, \dots, d_n)$  szám- $n$ -es nem tartozik a kiválasztottak közé, akkor  $\mu(d_1, \dots, d_n) > \mu(c_1, \dots, c_n)$ ; ami,  $\mu(b_1, \dots, b_n) \leq \mu(c_1, \dots, c_n)$  alapján bizonyítja az állítást.

18. feladat. Bizonyítsuk be, hogy a 17. feladatban szereplő  $\varepsilon_1$  számra bármilyen  $k$  egész szám esetén  $\varepsilon_k = (\varepsilon_1)^k$  eleme  $Z[\sqrt{D}]$ -nek és  $N(\varepsilon_k) = N(-\varepsilon_k) = 1$ .

*Megoldás.* Ha  $k$  pozitív, akkor  $(\varepsilon_1)^k \in Z[\sqrt{D}]$  abból következik, hogy  $Z[\sqrt{D}]$  a szorzásra zárt. Ha  $k$  negatív egész szám, akkor  $\varepsilon\bar{\varepsilon} = 1$  alapján  $(\varepsilon_1)^k = \overline{(\varepsilon_1)^{-k}} \in Z[\sqrt{D}]$ . A  $k = 0$  esetén azt kell bizonyítani, hogy  $1 \in Z[\sqrt{D}]$ , ami igaz. A további állítás triviálisan következik abból, hogy  $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$  és  $N(-1) = 1$ .

19. feladat. Bizonyítsuk be, hogy a 18. feladatban definiált

$$\begin{aligned} & \dots, \varepsilon_{-k}, \dots, \varepsilon_{-1}, \varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k, \dots \\ & \dots, -\varepsilon_{-k}, \dots, -\varepsilon_{-1}, -\varepsilon_0, -\varepsilon_1, \dots, -\varepsilon_k, \dots \end{aligned}$$

számok valamennyien különböznek egymástól.

*Megoldás.* A 17. feladat állítása szerint  $\varepsilon_1 > 1$ . Így pozitív  $k$  egész számra

$$1 = \varepsilon_0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \dots < \varepsilon_k \dots$$

E számok tehát különböznek egymástól. Mivel különböző számok reciproka is és negatívja is különböző, ezért az

$$\begin{aligned} & \varepsilon_{-1}, \dots, \varepsilon_{-k}, \dots \\ & -\varepsilon_0, -\varepsilon_1, \dots, -\varepsilon_k, \dots \\ & -\varepsilon_{-1}, \dots, -\varepsilon_{-k}, \dots \end{aligned}$$

sorozatok is csupa különböző számokból állnak. A 15. feladat állítása szerint pedig a különböző sorozatok sem tartalmazhatnak egyező számokat.

### A Pell-féle egyenlet összes megoldásának a meghatározása

Mint beláttuk, léteznek olyan  $p$  és  $q$  egész számok, amelyek a

$$(P) \quad x^2 - Dy^2 = 1$$

Pell-féle egyenletnek nem triviális megoldását adják, ami azt jelenti, hogy  $q \neq 0$  és  $p^2 - Dq^2 = 1$ . A IV. sorozatban azt is beláttuk, hogy a (P) egyenletnek végtelen sok megoldása van. Tekintsük ugyanis a 17. feladatban szereplő  $\varepsilon_1 = p_1 + q_1\sqrt{D}$  számot. Az  $\varepsilon_1 \in Z[\sqrt{D}]$  feltétel azt jelenti, hogy  $p_1$  és  $q_1$  egészek; az  $N(\varepsilon_1) = 1$  összefüggés biztosítja, hogy  $p_1, q_1$  a (P) egyenlet megoldásai; míg  $\varepsilon_1 > 1$  következtében a kapott megoldás nem lehet triviális. Ebből még nem következne az, hogy a (P) egyenletnek végtelen sok megoldása van. A 19. feladat állításából viszont már ez is adódik. Az ott szereplő számok ugyanis a 18. feladat alapján mind a (P) egyenlet egy-egy megoldását adják (a  $p + q\sqrt{D}$  által kapott megoldásban az  $x = p, y = q$ ). E megoldások mind különbözőek; éppen a 19. feladat állítása szerint; továbbá közülük kettő, nevezetesen  $\varepsilon_0$  és  $-\varepsilon_0$ , a triviális  $(1, 0)$  és  $(-1, 0)$  megoldást adja, a többiek nem triviális megoldást adnak. Világos azonban, hogy a végtelen sok megoldás meghatározásánál nem használtak ki a 17. feladat állítása szerint az  $\varepsilon_1$ -re kirótt feltételt. Erre a feltételre éppen most lesz szükségünk, annak a kimutatására, hogy a 19. feladatban szereplő számok a (P) összes megoldását meghatározzák. E célt szolgálják a 20., 21. és 22. feladatok. Ebben a folytatásban azonban szeretnénk teljesíteni még egy ígéretünket is. Említettük ugyanis, hogy rögzített  $k$  mellett az  $a^2 - Db^2 = k$  megoldásai bizonyos értelemben periodikusan következnek. Ezt fogjuk pontosan megfogalmazni a 23. és 24. feladatban.

### V. sorozat (az összes gyök meghatározása)

#### Feladatok

20. Legyen  $\varepsilon > 1$  a  $Z[\sqrt{D}]$ -nek olyan eleme, amelyre  $N(\varepsilon) = 1$ . Bizonyítsuk be, hogy a 17. feladatban értelmezett  $\varepsilon_1$  számhoz található olyan  $k$  természetes szám, amelyre

$$(\varepsilon_1)^k \leq \varepsilon < (\varepsilon_1)^{k+1}.$$

21. Bizonyítsuk be, hogy ha  $\varepsilon$  olyan eleme  $Z[\sqrt{D}]$ -nek, amelyre  $N(\varepsilon) = 1$ , akkor valamilyen  $k$  egész számra teljesül az  $\varepsilon = \varepsilon_k$  vagy az  $\varepsilon = -\varepsilon_k$  egyenlőségek valamelyike, ahol  $\varepsilon_k$  a 18. feladatban adott definíció szerint egyenlő  $(\varepsilon_1)^k$ -nal.

22. Legyen a 18. feladatban szereplő  $\varepsilon_k$ -ra  $\varepsilon_k = p_k + q_k\sqrt{D}$ ; nem negatív  $k$  esetén. Bizonyítsuk be, hogy az

$$(P) \quad x^2 - Dy^2 = 1$$

Pell-féle egyenlet összes (egész) megoldásai:

$$x = \pm p_k, \quad y = \pm q_k.$$

23. Legyen az  $\alpha = a + b\sqrt{D} \in Z[\sqrt{D}]$  számra  $\alpha > 1$  és  $N(\alpha) = k$ . Bizonyítsuk be, hogy ekkor létezik olyan  $\alpha_0 = a_0 + b_0\sqrt{D}$ , amelyre  $1 < \alpha_0 < \varepsilon_1$  és  $\alpha = \alpha_0(\varepsilon_1)^k$  valamely nem negatív  $k$  egész számmal; ahol  $\varepsilon_1$  a 17. feladatban definiált szám. (Igaz-e, hogy mind  $a_0$ , mind  $b_0$  pozitívak?)

24. Hogyan állítható elő az  $x^2 - Dy^2 = k$  egyenlet összes egész  $(a, b)$  megoldása?