

1. 1962-ben e folyóiratban publikáltam egy azonos című cikket.<sup>1</sup> E cikkre mint I-re fogok hivatkozni. E cikkben hasonló természetű problémákkal fogok foglalkozni, de elsősorban néhány I-ben felvetett problémához kell megjegyzéseket fűznöm.

I-ben a következő, Sylvestertől származó problémát említettem: Legyen adva  $n$  pont,  $P_1, \dots, P_n$  a síkban. Maximálisan hány olyan egyenes lehetséges, mely e pontok közül pontosan három megy át? E probléma még most teljesen megoldva, de *Burr*, *Grünbaum* és *Sloane*<sup>2</sup> egy nemrég megjelent cikkükben sok érdekes eredményt értek el és Sylvester eredményeit messzemenően élesítették.

Sylvester problémájával kapcsolatban I-ben a következő kérdést vetem fel: Mekkora azon egyenesek maximális száma, amelyek az  $n$  pont közül pontosan  $k$ -en (illetve általában  $k$ -n) mennek át? Azt sejtettem, hogy ez a maximum sokkal kisebb rendű, mint  $n^2$  és talán kisebb, mint  $cn$ . Elsősorban *Croft*-tal észrevettük, hogy a síkrács pontjai mutatják, hogy meg lehet adni a síkban  $n$  pontot úgy, hogy azon egyenesek száma, amelyek e pontok közül pontosan  $k$ -n mennek át, nagyobb, mint  $c_k n^2$ , ahol  $c_k$   $k$ -től függő állandó.  $c_k$  pontos értéke nem ismeretes, és *Croft*-tal sejtjük, hogy minden  $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan  $k_0 = k_0(\varepsilon)$ , melyre minden  $k > k_0$  esetén  $c_k < \varepsilon/k^2$ . Ha viszont feltesszük, hogy  $P_1, \dots, P_n$  olyan, hogy nincs közülük  $k + 1$  egy egyenesen, akkor valószínűleg tényleg igaz, hogy azon egyenesek száma, melyek közülük  $k$ -n mennek át, sokkal kisebb rendű, mint  $n^2$ . *Kárteszi*<sup>3</sup> bebizonyította, hogy ezen egyenesek száma nagyobb lehet, mint  $c_k n \log n$  és ezt *Grünbaum*  $c_k n^{1+1/k}$ -ra élesítette. Nem lehetetlen, hogy *Grünbaum* eredménye már közel van ahhoz, hogy éles legyen. Egyelőre azonban még a következő egyszerű kérdésre sem tudjuk a választ: Igaz-e, hogy minden  $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan  $n_0$ , hogy ha  $n > n_0$  és  $P_1, \dots, P_n$   $n$  olyan pont (a síkban), melyek közül nincs öt egy egyenesen, akkor azon egyenesek száma, melyek négy  $P_i$ -n mennek át, kisebb, mint  $\varepsilon n^2$ .

*Elliott*<sup>4</sup> bebizonyította, hogy ha  $n > 393$  és a síkban adva van  $n$  pont, melyek nincsenek mind egy körön, akkor ezek legalább  $\binom{n-1}{2}$  kört határoznak meg. Ezzel egy enyhén módosított formában bebizonyította I-ben kimondott sejtéseim egyikét. ( $\binom{n-1}{2}$  az  $\binom{n-1}{2} + 1$ -gyel helyettesíthető, ha azt az egyenest, mely  $n - 1$  ponton megy át, végtelen sugarú körnek tekintjük.) Az  $n > 393$  valószínűleg lényegesen javítható.

2. *Corrádi*, *Hajnal* és én sejtettük, hogy ha  $P_1, \dots, P_n$   $n$  pont a síkban, melyek nincsenek mind egy egyenesen, akkor ezek legalább  $n - 2$  különböző szöget határoznak meg (a szögek  $\geq 0$  és  $\leq \pi$ -nek veendő). Ha még feltesszük, hogy a pontok között nincs három egy egyenesen, akkor egészen egyszerű bebizonyítani, hogy a pontok valóban  $n - 2$  különböző szöget határoznak meg, és a szabályos sokszög mutatja, hogy  $n - 2$  pontos. Sajnos azonban az általános esetben semmi elfogadható alsó becslésünk nincs – például azt sem tudtuk eddig bebizonyítani, hogy legalább  $n/2$  különböző szöget határoznak meg. E kérdés elintézéséért 1000 forint jutalmat adok.

3. 1932-ben *Klein Eszter* észrevette, hogy ha öt pont van adva a síkban és nincs három egy egyenesen, akkor ezen öt pontból mindig kivethető négy, melyek egy konvex sokszög csúcsai. Az egyszerű bizonyítást az olvasóra hagyjuk. *Klein Eszter* továbbá kérdezte: Van-e olyan  $f(n)$ , hogy ha a síkban adva van  $f(n)$  pont, melyek közül semelyik három sincs egy egyenesen, akkor mindig kivethető közülük  $n$  pont, melyek egy konvex sokszög csúcsai? *Szekeres* hamarosan sejtette, hogy  $f = 2^{n-2} + 1$ . *Szekeres*szel bebizonyítottuk,<sup>5</sup> hogy

$$2^{n-2} + 1 \leq f(n) \leq \binom{2n-4}{n-2}.$$

*Makai Endre* és *Turán Pál* bizonyította, hogy  $f(5) = 9$ , de egyelőre  $f(6) = 17$  nincs meg.

E problémát én happy end problem-nek neveztem, ugyanis *Klein Eszter* „behálózta” *Szekeres Györgyöt* és boldogan élnek Sydney-ben – jelenleg (1980. augusztus) Pesten tartózkodnak.

Mikor 1977-ben meglátogattam *Szekeres*éket, a probléma következő változata jutott eszembe: Létezik-e olyan  $F(n)$ , hogy ha a síkban adva van  $F(n)$  pont,  $P_1, \dots, P_F$ , melyek közül semelyik három nincs egy egyenesen, akkor kiválasztható-e közülük  $n$  pont, melyek olyan konvex  $n$ -szöget határoznak meg, mely egyetlen  $P_i$ -t sem tartalmaz a belsejében? Azonnal adódik  $f(4) = 5$ -ből, hogy  $F(4) = 5$  (az egyszerű bizonyítást az olvasóra bízom). De már  $F(5)$  létezését nem tudtam bizonyítani. *Ehrenfurt* bebizonyította, hogy  $F(5)$  létezik, és *Harborth*<sup>6</sup> bebizonyította, hogy  $F(5) = 10$ . Egyelőre nem tudjuk, hogy  $F(6)$  létezik-e. Ugyanis könnyen elképzelhető, hogy minden  $n$ -re megadható  $n$  pont,  $P_1, \dots, P_n$  a síkban úgy, hogy nincs három egy egyenesen és a  $P_i$ -k közül bármely 6 vagy nem alkot konvex hatszöget, vagy ha a hatszög konvex, akkor belsejében van legalább egy másik  $P_i$ .

Az  $F(6)$ -ról való kérdés megoldására 1000 forint jutalmat tűzök ki,  $F(n)$  létezésének bizonyításáért 3000 forintot.

<sup>1</sup> *Erdős Pál*, Néhány elemi geometriai problémáról, Középiskolai Matematikai Lapok 24. (1962) 193–201. és Megjegyzések a „Néhány elemi geometriai problémáról” című cikkhez, 26. (1963) 1–2.

<sup>2</sup> *S. Burr*, *B. Grünbaum* és *Sloane*, The orchard problem. *S. Burr* munkatársam a New York-i City College-ben professzor. *B. Grünbaum* szintén munkatársam, az University of Washingtonban (Seattle) professzor. *Sloane* a Bell Laboratories matematikai osztályán munkatárs.

<sup>3</sup> *Kárteszi Ferenc*, Sylvester egy tételéről és Erdős egy sejtéséről, Középiskolai Matematikai Lapok, 25. (1963) 3–9.

<sup>4</sup> *P. D. T. A. Elliott*, On the number of circles determined by  $n$  points, *Acta Math. Sci. Hungar.* 18. (1967) 181–188. – Elliott a Boulder University of Colorado-ban professzor, angol matematikus, munkatársam, fő területe az additív számelméleti függvények.

<sup>5</sup> *P. Erdős* and *G. Szekeres*, A combinatorial problem in geometry, *Compositio Math.* 2 (1935) 463–470.

<sup>6</sup> *H. Harborth*, Konvexe Fünfecken in ebenen Punktmengen, *Elemente der Math.* 33 (1978) 116–118.

*Szekeres*rel bizonyítottuk,<sup>7</sup> hogy ha a síkban adott  $2^n$  pont, akkor azok mindig meghatároznak egy szöveget, mely nagyobb, mint  $\pi(1 - 1/n)$ . E tétel meglepően éles, mert *Szekeres* egy régebbi tétele<sup>8</sup> szerint minden  $\varepsilon > 0$ -hoz van  $2^n$  pont úgy, hogy e pontok által meghatározott szögek mind kisebbek, mint  $\pi(1 - 1/n) + \varepsilon$ . Első pillanatban azt gondolhatnánk, hogy e tétel annyira éles, hogy további javításra nincs lehetőség. Lehetséges azonban, hogy már  $2^n$ -nél kevesebb pont is biztosít  $\pi(1 - 1/n)$ -nél nagyobb szöveget. Bizonyítani csak annyit tudunk, hogy már  $2^n - 1$  pont is biztosít egy szöveget, mely nagyobb vagy egyenlő, mint  $\pi(1 - 1/n)$ . Nem lehetetlen azonban, hogy ha  $n > n_0$ , akkor már  $2^{n-1} + 1$  pont is biztosít egy szöveget, mely nagyobb, mint  $\pi(1 - 1/n)$ .

4. Jelölje  $d(P, Q)$  a  $P$  és  $Q$  pontok távolságát. *Anning* és én még 1945-ben bizonyítottuk,<sup>9</sup> hogy ha  $P_1, P_2, \dots$  végtelen sok pont a síkban úgy, hogy  $d(P_i, P_j)$  minden  $1 \leq i < j$  számpárra egész szám, akkor pontjaink egy egyenesen vannak. Első bizonyításunk nem volt egész egyszerű, de néhány hónap múlva a következő meglepően egyszerű bizonyítást találtam: Ha pontjaink nincsenek mind egy egyenesen, akkor az általánosság rovása nélkül feltehetjük, hogy  $P_1, P_2, P_3$  nincsenek egy egyenesen. Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_k$  olyan pontok, melyekre  $d(X_i, P_1), d(X_i, P_2), d(X_i, P_3)$ , mind egész számok. Bebizonyítjuk, hogy ekkor

$$(1) \quad k \leq 4(d(P_1, P_2) + 1)(d(P_1, P_3) + 1).$$

(1)-ből *Anning*gel közös tételünk azonnal következik. (1) bizonyítása viszont rendkívül egyszerű. Legyen  $X$  olyan pont, melynek távolsága a  $P_1, P_2, P_3$  pontoktól egész szám. A háromszög egyenlőtlenség miatt

$$|d(X, P_1) - d(X, P_2)| \leq d(P_1, P_2),$$

és ezért  $X$   $d(P_1, P_2) + 1$  darab olyan hiperbola valamelyikén van, melyeknek fókusza  $P_1$  és  $P_2$  (ugyanis minthogy  $|d(X, P_1) - d(X, P_2)|$  egész és nem nagyobb, mint  $d(P_1, P_2)$ , legfeljebb  $d(P_1, P_2) + 1$  különböző értéket vehet fel). Hasonlóan adódik, hogy  $X$  legfeljebb  $d(P_1, P_3) + 1$  olyan hiperbolán van, melyeknek fókuszai  $P_1$  és  $P_3$ . Minthogy  $P_1, P_2, P_3$  nincsenek egy egyenesen, két hiperbola, melyeknek fókuszai  $P_1, P_2$ , illetve  $P_1, P_3$ , legfeljebb négy pontban metszik egymást. Ebből viszont azonnal nyerjük, hogy az  $X$  pont választására legfeljebb  $4(d(P_1, P_2) + 1) \cdot (d(P_1, P_3) + 1)$  lehetőség van, s ezzel (1) be van bizonyítva.

Tudtommal senki sem vizsgálta, vajon az (1) egyenlőtlenség javítható e és ha igen, mennyire.

Legyen  $P_1, P_2, \dots$  végtelen sok pont a síkban, melyek közül nincs három egy egyenesen. Két ilyen pontot összekötünk egy éllel, ha távolságuk egész szám. Hogyan jellemezhetőek az így nyert gráfok? Előbbi bizonyításunk adja, hogy e gráf nem tartalmazhat egy  $K(3, \alpha_0)$  részgráfot, azaz nem lehet benne három szögpont  $X_1, X_2, X_3$  és végtelen sok más szögpont  $Y_1, Y_2, \dots$ , melyek mindegyike az  $X_i$ -kel össze van kötve. Nem sikerült eldöntennem, hogy e szükséges feltétel elégséges-e. Az biztos, hogy gráfunk minden  $n$ -re tartalmazhat egy  $n$  szögpontú teljes gráfot. Nem világos azonban, hogy minden  $n$  szögpontú gráf beágyazható gráfunkba (azaz van  $P_1, \dots, P_n$  pont úgy, hogy  $d(P_i, P_j)$  akkor és csakis akkor egész szám, ha  $P_i$  és  $P_j$  a gráfunkban össze van kötve).


Nagyon érdekes problémára jutunk, ha még azt is feltesszük, hogy négy  $P_i$  nem lehet egy körön. *Harborth* és mások is bebizonyították, hogy megadható öt pont általános helyzetben (azaz nincs négy egy körön és három egy egyenesen) úgy, hogy bármely kettő távolsága egész szám. Nem ismeretes azonban, hogy megadható-e hat ilyen tulajdonságú pont. Nem lehetetlen, hogy minden  $n$ -re megadható  $n$  ilyen pont. *Ulam* a következő problémát vetette fel: Van-e a síkban egy mindenütt sűrű ponthalmaz, melyre bármely két pont távolsága racionális szám? (Egy ponthalmaz mindenütt sűrű, ha minden kör belsejében van pontja.) *Ulam* kérdésére a válasz valószínűleg tagadó, de ennek bizonyítása nem látszik könnyűnek. Ismeretes, hogy van olyan  $r$ , melyre az  $r$  sugarú körön megadható egy mindenütt sűrű ponthalmaz úgy, hogy bármely két pont távolsága racionális. Valószínűnek látszik, hogy ha  $S$  egy zárt ponthalmaz a síkban (vagyis  $S$  minden konvergens pontsorozatával együtt annak határértékét is tartalmazza), melyre van olyan  $S_1 \subset S$ , mely  $S$ -ben mindenütt sűrűn van és  $S_1$  bármely két pontjának távolsága racionális, akkor ez csak nagyon speciális  $S$  halmazokra lehetséges. Biztosra veszem, hogy ez akkor is igaz marad, ha nem ragaszkodunk az  $S_1 \subset S$  feltételhez és csak azt kívánjuk, hogy  $S_1$  minden sűrűsödési pontja  $S$ -ben legyen. Tudtommal e kérdéseket még nem vizsgálták.

Végül még egy kérdést említek. Legyen adva  $n$  pont,  $P_1, \dots, P_n$  a síkban általános helyzetben (azaz nincs három egy egyenesen és négy egy körön). Tekintsük a  $d(P_i, P_j)$ ,  $1 \leq i < j \leq n$  számokat. Lehetséges, hogy e távolságok között  $n - 1$  különböző legyen és az  $i$ -edik távolság  $(n - i)$ -szer forduljon elő?

<sup>7</sup> *P. Erdős and G. Szekeres*, On some extremum problems in elementary Geometry, Ann. Univ. Sci. Budapest 3-4 (1961) 53-62.

<sup>8</sup> *G. Szekeres*, On an extremum problem in the plane, Amer. J. Math. 63 (1941) 208-210.

<sup>9</sup> *P. Erdős and A. Anning*, Integral distances, Bull. Amer. Math. Soc. 51 (1945) 548-560. és *P. Erdős*, Integral distances, ugyanott 966. - Anning Ann Arborban (University of Michigan) volt matematikus, már 30 éve elhunyt.



$n = 3$ -ra e feltétel teljesül, ha a  $P_1P_2P_3$  háromszög egyenlő szárú,  $n = 4$ -re, ha  $P_4$  az egyenlő szárú háromszög körülírt körének középpontja. Azt gondoltam, hogy  $n \geq 5$ -re ez már nem lehetséges, de *C. Pomerance*  $n = 5$ -re a következő példát találta:  $P_1$  az  $r$  sugarú kör középpontja,  $d(P_1, P_2) = d(P_1, P_3) = d(P_2, P_3) = r$ ,  $P_4$  a  $P_1P_2P_3$  háromszög körülírt körének középpontja,  $P_5$  a  $P_3P_4$  felező merőlegesének az  $r$  sugarú körrel való metszéspontja. Könnyű belátni, hogy ez az 5 pont általános helyzetű és a feltételeinket kielégíti. Az  $r$  távolság 4-szer fordul elő,  $d(P_1, P_4)$  háromszor,  $d(P_3, P_5) = d(P_4, P_5)$ . Talán  $n \geq 6$ -ra már tényleg igaz, hogy nincs ilyen tulajdonságú pontrendszer, de e kérdést egyelőre nem tudom eldönteni.

Még két megjegyzést szeretnék ehhez a problémához fűzni. Megkövetelhetnénk, hogy három  $P$  ne legyen egy egyenesen, négy egy körön és ne legyen olyan kör, melynek középpontja egy adott  $P$  és amely három másik  $P$ -t tartalmaz.  $n = 4$ -re könnyű négy ilyen pontot találni, melyre az  $i$ -edik távolság ( $i = 1, 2, 3$ )  $(n - i)$ -szer fordul elő, de  $n = 5$ -re ez nem sikerült, és nem tudom, 5 ilyen pont van-e.

Legyen  $P_1, \dots, P_n$  általános helyzetben, nem tudom, hogy legalább hány különböző távolságot határoznak meg. Továbbá kérdezhetjük, hogy ha  $P_1, \dots, P_n$  nem tartalmaz egyenlő szárú háromszöget (azaz minden  $i$ -re a  $d(P_i, P_j)$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$ ,  $j \neq i$  távolságok mind különbözőek), akkor legalább hány különböző távolság fordul elő a  $d(P_i, P_j)$ ,  $1 \leq i < j \leq n$  számok között? A választ erre a kérdésre nem ismerjük.

**5.** Legyenek  $P_1, \dots, P_n$  egy konvex  $n$ -szög csúcsai. Sejtettem és *Altman* bebizonyította, hogy a  $d(P_i, P_j)$  távolságok között legalább  $\lfloor n/2 \rfloor$  különböző van. Egyenlőség áll például a szabályos  $n$ -szög esetén.

Továbbá sejtettem, hogy mindig van egy pont,  $P_i$ , hogy a  $d(P_i, P_j)$   $j = 1, 2, \dots, n$ ,  $j \neq i$  távolságok közül is van legalább  $\lfloor n/2 \rfloor$  különböző. E sejtés még nincs eldöntve. Továbbá sejtettem, hogy van egy  $P_i$  pont, melytől nincs három másik  $P_j$  egyenlő távolságban. E sejtésből az előbbi sejtések könnyen következnenek, de legnagyobb meglepetésemre *Danzer* e sejtést megcáfolta. Erre sejtettem, hogy van olyan  $P_i$ , melytől nincs négy másik  $P$  egyenlő távolságban. *Danzer* ellenpéldája itt már nem működik, de még ha e sejtés igaz is lenne, az már nem következne, hogy van olyan  $P_i$ , melytől legalább  $\lfloor n/2 \rfloor$  különböző távolság van.

Legyen  $g(n)$  az a legnagyobb szám, melyre bárhogyan is adunk meg különböző  $P_1, \dots, P_n$  pontot a síkban, ezek legalább  $g(n)$  különböző távolságot határoznak meg.  $g(n)$  meghatározása, sőt jó megbecslése rendkívül nehéz feladatnak látszik. Fennáll a következő becslés:

$$(2) \quad c_1 n^{2/3} < g(n) < c_2 \cdot \frac{n}{(\log n)^{1/2}}.$$


A felső határ (2)-ben tőlem származik, az alsó határ *L. Mosertől*.<sup>10</sup> Úgy gondolom, hogy a felső határ közelebb van az igazsághoz, mint az alsó és talán  $g > c_3 \cdot n(\log n)^{-1/2}$ .

Sajnos e kérdés eldöntése reménytelennek látszik, és  $10^4$  forintot tűzök ki a kérdés tisztázására.

Sejtettem, hogy minden  $k$ -hoz van olyan  $\varepsilon > 0$ , melyre ha  $P_1, \dots, P_n$  olyan pontrendszer, mely  $\varepsilon n$ -nél kevesebb különböző távolságot határoz meg, akkor van  $k$  olyan  $P_i$ , melyek egy egyenesen vannak. E sejtésre *Szemerédi Endre* egy meglepően szellemes és egyszerű bizonyítást adott.<sup>11</sup> Továbbá *Szemerédi* sejti *Altman* tételének a következő élesítését: Legyen  $P_1, \dots, P_n$   $n$  pont a síkban úgy, hogy semelyik három nincs egy egyenesen. Ekkor e pontok legalább  $\lfloor n/2 \rfloor$  különböző távolságot határoznak meg. *Szemerédi* bizonyítása azonban csak  $\lfloor n/3 \rfloor$ -at ad  $\lfloor n/2 \rfloor$  helyett. Próbálják bebizonyítani  $\lfloor n/3 \rfloor$ -at és ha tudják, élesítsék ezt az eredményt.

<sup>10</sup> *P. Erdős*, On sets of distances of  $n$  points, Amer. Math. Monthly 53 (1946) 248–250.; *L. Moser*, On the different distances determined by  $n$  points, ugyanott 59 (1952) 85–91. – *L. Moser* kanadai matematikus, munkatársam és jó barátom, ki sajnos idő előtt 1970-ben elhunyt.

<sup>11</sup> *Szemerédi* tételének bizonyítását lásd *P. Erdős*, On some problems of elementary and combinatorial geometry, Annali di Mat. Ser IV. 103 (1975) 99–108. E cikk sok más problémát és eredményt is tartalmaz. Egy valamivel kisebb, de magyar nyelvű cikkre is hivatkozhatom: *Erdős Pál*, Néhány geometriai problémáról, Mat. Lapok, 8 (1957) 86–92. A legújabb ilyen típusú cikkem: *P. Erdős*, Some combinatorial problems in geometry, Lecture Notes in Math. 792, Geametry and Diff. Geometry, Proc. Haifa, Israel (1979) 46–53.



6. Befejezésül még két problémát említek. *E. Straus* tavaly bebizonyította, hogy ha az egységkörben adva van egy  $O$  pont és három tetszőleges húr,  $P_1P_2$ ,  $P_3P_4$ ,  $P_5P_6$ , melyek az  $O$  ponton átmennek, akkor  $d(P_1, P_3) + d(P_5, P_2) + d(P_4, P_6) < 4$ . Könnyű belátni, hogy 4 nem helyettesíthető kisebb számmal. *Straus* bizonyítása trigonometriát és elemi analízist használt, nem sikerült e tételre egy szintetikus geometriai bizonyítást találni – talán valamelyik olvasó ötletesebb, szerencsésebb lesz.

Könnyű belátni, hogy ha  $P_1, \dots, P_n$  egy konvex  $n$ -szög csücskei, akkor a  $P_iP_j$  átlók  $\binom{n}{4}$  metszéspontot határoznak meg a konvex sokszög belsejében. Jelentse  $h(n)$  azt a legnagyobb számot, amelyre a  $P_iP_j$  ( $1 \leq i < j \leq n$ ) átlók legalább  $h(n)$  különböző pontot határoznak meg. Határozzák meg  $h(n)$ -et a lehető legnagyobb pontossággal. Biztosra veszem, hogy tetszőleges  $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan  $n_0$ , hogy ha  $n > n_0$ , akkor  $h(n) \leq (1 + \varepsilon) \binom{n}{4}$ . Nem vagyok biztos, hogy ez utóbbi probléma tőlem származik-e vagy olvastam valahol. \*

A problémákat bárki megoldhatja. A megoldásokat a következő címre kérjük:

*Erdős Pál*  
MTA Matematikai Kutató Intézet  
Budapest, Reáltanoda u. 13-15. 1053.