

2. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget, ha adott a száruk által bezárt szög, továbbá a beírt és a körülírt kör középpontjának egymástól való távolsága.

3. Egy körmérkőzéses asztalitenisz bajnokságon n játékos vett részt. A mérkőzések rendszertelenül kerültek sorra. Még nem volt vége a versenynek, amikor kiderült, hogy Péter, aki k győzelmet aratott, behozhatatlan előnyre tett szert. Legalább hány mérkőzést játszottak le addig a bajnokságon?

Matematika II. tantervi osztályok feladatai

1. Keressük meg az összes olyan természetes számot, amely a tízes számrendszerben négyjegyű, jegyei rendre a, b, c, d ; továbbá $a \cdot b = c + d$, $b \cdot d = a + c$ és $a \cdot c \cdot d = (a + d)^3$.

2. Két egymásba nem nyúló r sugarú kört tartalmazó egyenlő oldalú (szabályos) háromszögek közül melyiknek a területe minimális?

3. Egy $2n$ tagú társaságban n^2 -nél több kézfogás történt. Tudjuk, hogy senki sem fogott többször kezet, mint András. Bizonyítsuk be, hogy azok között, akikkel András kezet fogott, van két olyan ember, akik egymással is kezet fogtak.

Haladók (legfeljebb II. osztályosok), I. forduló

1. Szerkesszük meg az egyenlő szárú háromszöget, ha adott az alapon fekvő szöge, valamint a magasságpontjának és súlypontjának távolsága.

2. Legyen n tetszőleges természetes szám. Bizonyítsuk be, hogy a $10^n - 1$ szám 37-tel osztva négyzetszámot ad maradékul!

3. Az ABC háromszög P belső pontjára igaz, hogy

$$\frac{PBA \sphericalangle}{CBA \sphericalangle} = \frac{PAC \sphericalangle}{BAC \sphericalangle} = \frac{PCB \sphericalangle}{ACB \sphericalangle} = x.$$

Mennyi x értéke ?

4. Mennyi az olyan hatjegyű számok összege, amelyeknek számjegyei között csak 1-es vagy 2-es szerepel?

5. Egy háromszög három csúcsa köré szerkesszünk páronként közös belső pont nélküli köröket úgy, hogy kerületük összege a lehető legnagyobb legyen!

6. Milyen esetben osztható hat szomszédos természetes szám négyzetének összege 7-tel?

7. A síkon adott 200 pont. Igazoljuk, hogy a pontokat ki lehet színezni pirossal és kézzel úgy, hogy 100 piros pont legyen, 100 kék, és akármelyik két piros pontot összekötő szakaszra igaz, hogy semelyik két kék pontot összekötő szakaszt sem metszi!

8. Egy négyszög belsejébe négy kör rajzolható úgy, hogy mindegyik csúcshoz tartozik egy kör, amely érinti az oda futó oldalakat és a szomszédos csúcsokhoz tartozó két kört. Bizonyítsuk be, hogy ha a négyszög érintőnégyszög, akkor deltoid is!

Haladók (II. forduló)

A szakközépiskolások feladatai

1. Legyenek m és n egymástól különböző természetes számok, amelyekre n osztható m -mel. Tekintsük azon $(a; b)$ (természetes számokból álló) számpárokat, amelyekre a és b legnagyobb közös osztója m , legkisebb közös többszöröse n . Bizonyítsuk be, hogy ezen számpárok száma 2 hatványa. ($a \neq b$ esetén $(a; b)$ és $(b; a)$ párokat különbözőnek tekintjük.)

2. Az a_1, b_1, a_2, b_2 egész számokra teljesül, hogy $a_1 \neq a_2, b_1 \neq b_2$ továbbá $(a_1 b_2 - a_2 b_1)^2 + 4(a_1 - a_2)(b_1 - b_2) = 0$. Bizonyítsuk be, hogy $1 - a_1 b_1$ egy egész szám négyzete!

3. Egy háromszög oldalai a, b és c , beírt körének átmérője d hosszúságú. Igazoljuk, hogy $d^2 + (a - b)^2 < c^2$!

Az általános tantervű osztályok feladatai

1. Kis számológépünk elromlott, és most azon kívül, hogy kiszámítja a számok reciprokát, csak összeadni és kivonni tud. Eszeljünk ki olyan képleteket, amelyek alapján kiszámolható a számok négyzete és két szám szorzata!

2. Adott egy O pont és egy a hosszúságú szakasz. Tekintsük a síkban az O középpontú, a oldalú négyzetek H halmazát. Tetszőleges $N, N' \in H$ -ra $N \cap N'$ jelentse az N és N' négyzetlapok közös részét. Milyen határok között változik az $N \cap N'$ típusú sokszögek kerülete?

3. Mely y, x, m egész számokra áll fenn az $x^2(x^2 + y) = y^m$ egyenlet?

A szakosított matematika II. tantervű osztályok feladatai

1. Kis számológépünkön csupán összeadás és kivonás van, de egy szám reciprokát is lehet képezni. Eszeljünk ki olyan képletet, amely alapján kiszámíthatjuk vele két szám szorzatát!

2. Az $ABCD$ húrnégyszögben fennáll az $AB + CD = BC$ egyenlőség. Igazoljuk, hogy az A , illetve a D pontból húzott (belső) szögfelezők metszéspontja a BC szakaszra esik!

3. Egy társaságban bárkinek van ismerőse és tudjuk, hogy ha két embernek egyenlő számú ismerőse van, akkor nincsen közös ismerősük. Lássuk be, hogy van, aki csak egy embert ismer a társaságból! (Az ismeretséget kölcsönösnek tételezzük fel.)