

A feladatok alábbi megoldásait az olimpián részt vevő versenyzők és Pataki János készítették.

1. Egy adott kör AB , CD húrjai a kör belsejében lévő E pontban metszik egymást. Legyen M az EB szakasz egy belső pontja. A D , E , M pontokon átmenő körhöz E -ben húzott érintő messe a BC , ill. AC egyeneseket rendre az F , ill. a G pontban. Ha $\frac{AM}{AB} = t$, fejezzük ki az $\frac{EG}{EF}$ hányadost t segítségével.

Megoldás. Azt a pontot, ahol MD másodszor metszi a kört, jelöljük X -szel. Továbbá legyen $\angle ADC = \gamma$, $\angle CDX = \alpha$, $\angle XDB = \beta$. Mivel szintén az AC ívhez tartozik, $\angle ABC = \gamma$. Az FG egyenes a DEM háromszög körülírt körének E -beli érintője, e kis körben az FEM szög az EM húrhoz tartozó érintő szárú kerületi szög, így $\angle FEM = \angle EDM = \alpha$. Ennek csúcshozzá: $\angle GEA = \alpha$. Ezentúl csak az $ABCD$ körülírt körre fogunk hivatkozni „kör” néven. E kör sugarát $\frac{1}{2}$ -nek választva, és tetszőleges L_1, L_2, L_3 köri ponthármásra az általános szinusztételt felírva:

$$(*) \quad L_1 L_3 = (\sin L_1 L_2 L_3) \cdot 2R = \sin L_1 L_2 L_3.$$

Az AEG háromszögben a szinusztételt felírva:

$$(**) \quad \frac{EG}{\sin \angle GAE} = \frac{AE}{\sin \angle AGE}.$$

Itt két észrevételt teszünk: mivel $\angle GAE + \angle EAC = 180^\circ$, ezért $\sin \angle GAE = \sin \angle EAC$. Másrészt CB feletti szögek kerületi szögek lévén $\alpha + \beta = \angle CDB = \angle CAB$ és $\angle CAB$ az AEG háromszög külső szöge, így $\alpha + \beta = \angle CAB = \angle AGE + \angle AEG$, tehát $\angle AEG = \alpha$ szerint $\angle AGE = \beta = \angle XDB$.

A (*) és (**) állításokból:

$$(1) \quad EG/CB = AE/XB.$$

Vegyük észre, hogy az EFB háromszögben az E csúcsnál levő szög α , a B -nél levő γ , ezért az F csúcsnál levő szög $180^\circ - \alpha - \gamma$, $\sin \angle EFB = \sin(\alpha + \gamma) = AX$. Az EFB háromszögben a szinusztétellel: $\frac{EF}{\sin \gamma} = \frac{EB}{\sin(\alpha + \gamma)}$, így (*) szerint:


$$(2) \quad EF/AC = EB/AX.$$

(1)-et (2)-vel elosztva:

$$(3) \quad \frac{EG}{EF} = \frac{AE \cdot CB \cdot AX}{EB \cdot AC \cdot XB}.$$

Lemma: Egy $ACBD$ konvex húrnégyszög AB és CD átlóinak metszéspontja E . Ekkor:

$$CB \cdot AE \cdot BD = AC \cdot EB \cdot AD.$$



Bizonyítás: Az ADE háromszögben a szinusztételből:

$$AE/\sin \angle ADE = AD/\sin \angle AED,$$

azaz (*) szerint

$$(L_1) \quad AE/AC = AD/\sin \angle AED.$$

Az EBC háromszögben hasonlóan

$$(L_2) \quad \begin{aligned} EB / \sin BCE &= CB / \sin CEB = CB / \sin AED, \\ EB / BD &= CB / \sin AED. \end{aligned}$$

Az (L_2) egyenletet az (L_1) egyenlettel elosztva és rendezve a bizonyítandó állítást kapjuk. Lemmánkat az $ACBD$ és $AXBD$ négyszögekre alkalmazva:

$$\begin{aligned} CB \cdot AE \cdot BD &= AC \cdot EB \cdot AD, \\ XB \cdot AM \cdot BD &= AX \cdot MB \cdot AD. \end{aligned}$$

A második egyenletet az elsővel elosztva:

$$\frac{AM}{MB} = \frac{AE \cdot CB \cdot AX}{XB \cdot EB \cdot AC},$$

amelyet (3)-mal összevetve:

$$\frac{EG}{EF} = \frac{AM}{MB} = \frac{AM}{AB - AM} = \frac{t}{1 - t}.$$

Megjegyzés. A feladat elolvasása és az ábra felrajzolása után mindjárt az a benyomásom támadt, hogy itt olyan sok szép egyenlő szög van, hogy elképzelhetetlen, hogy a megoldást ne lehetne valahogyan „kiszervedni”. Sajnos, elegáns megoldást nem találván, tényleg ezt kellett tennem. Így versenydolgozatomban a szinusztételt 8 háromszögre alkalmaztam, majd ezek „cseles” összeszorozásával rengeteg tag kiesett és a bizonyítandó állítást kaptam. Az itt közölt megoldásbeli lemmát Pataki János javaslatára használom fel, ez a megoldást jóval áttekinthetőbbé teszi (azért a háttérben ugyanazok a szinusztételek vannak).

Kondacs Attila

2. Legyen $n \geq 3$, és tekintsünk egy E halmazt, amely egy kör területén lévő $2n - 1$ darab különböző pontból áll. Tegyük fel, hogy ezen pontok közül pontosan k darabot feketére színezzünk. Egy ilyen színezést „jó”-nak nevezünk, ha található két olyan fekete pont, hogy az általuk meghatározott két körív belseje pontosan n darab E -beli pontot tartalmaz. Határozzuk meg a legkisebb olyan k értéket, amelyre igaz, hogy E bármely k pontját színezzük is feketére, a színezés „jó”.

Megoldás. Kétségtelenül ez a feladat volt az első versenynap legkönnyebb feladata, főleg azok számára, akik nem szeretik a geometriát. Ugyanis a megoldás folyamán csupa „természetes” ötletet kell csak felhasználni, tulajdonképpen józan ész elegendő hozzá.

Legyenek a pontok nevei rendre $A_1, A_2, \dots, A_{2n-1}$. (Ha valamilyen A_i -t említünk, amelyre $i \geq 2n$, vagy $i \leq 0$, akkor az i modulo $(2n - 1)$ értendő.)

Könnny kialakulhat az a sejtésünk, hogy n -től függően $n - 1$ vagy n a megfelelő k .

Próbáljunk „rossz” színezést találni. Vizsgáljuk a következő sorozatot

$$(*) \quad A_{n-2}; A_{2(n-2)}; A_{3(n-2)}; \dots; A_{i(n-2)},$$

amelyre teljesüljön, hogy $A_{(i+1)(n-2)}$ már előfordul a sorozatban. Ez az $A_{(i+1)(n-2)}$ pont csak az A_{n-2} lehet, hisz minden ponttól két pont van $n - 2$ távolságra, s a többi pontnál ezek a szomszédok. Így

$$(i + 1)(n - 2) \equiv n - 2 \pmod{(2n - 1)},$$

vagyis

$$(i + 1)(n - 2) = n - 2 + a(2n - 1),$$

(ahol a megfelelő egész szám), így

$$(1) \quad i(n - 2) = a(2n - 1).$$

Ha $i = 2n - 1$, akkor a sorozatunk az összes pontot tartalmazza. Közülük n darabot kiválasztva lesz köztük szomszédos (A_{n-2} és $A_{i(n-2)}$ szomszédosnak tekintendő), hiszen különben $A_{j(n-2)}$ kiválasztása esetén $A_{(j+1)(n-2)}$ nem választható ki, s az egyértelmű hozzárendelés miatt n pontot kiválasztva n pontot zárunk ki, ami összesen már több, mint $2n - 1$. Nyilván $n - 1$ pont kiválasztható, ilyen pl. az $A_{2(n-2)}; A_{4(n-2)}; \dots; A_{(2n-2)(n-2)}$. Tehát ha $i = 2n - 1$, akkor $k = n$.

Nézzük meg azt, hogy milyen n -re lehetséges $i \neq 2n - 1$. Ekkor $n - 2$ -nek és $2n - 1$ -nek van 1-nél nagyobb közös osztója, ami csak a $(2n - 1) - 2 \cdot (n - 2) = 3$ lehet, és pedig abban az esetben, ha $n = 3e + 2$ alakú. Vagyis $i = \frac{2n - 1}{3}$ lehetséges még. Ekkor a $(*)$ sorozatban éppen a 3-mal osztható sorszámú pontok találhatóak. A sorszámokhoz 1-et, ill. 2-t adva kaphatjuk az alábbi sorozatokat:

$$(**) \quad A_{1(n-2)+1}; A_{2(n-2)+1}; \dots; A_{\frac{2n-1}{3}(n-2)+1},$$

$$(***) \quad A_{1(n-2)+2}; A_{2(n-2)+2}; \dots; A_{\frac{2n-1}{3}(n-2)+2}.$$

A három sorozat tartalmazza az összes pontot. Az előzőekhez hasonlóan igazolható, hogy ha egy sorozat $\frac{2n-1}{3}$ elemet tartalmaz, akkor legfeljebb $\frac{n-2}{3}$ elem színezhető ki úgy, hogy a színezés rossz legyen. Ez mindhárom esetben megtehető, így adódik, hogy $n-2$ pontot még ki lehet színezni rosszul, $n-1$ -et azonban már nem.

Tehát: ha $n = 3e + 2$ alakú, akkor $k = n - 1$, különben $k = n$.

Balog József

3. Határozzuk meg az összes olyan $n > 1$ egész számot, amelyre $\frac{2^n + 1}{n^2}$ is egész szám.

Megoldás. $n = 3$ nyilván megoldás, hiszen $2^3 + 1 = 9$ osztható $3^2 = 9$ -cel. Megmutatjuk, hogy más megoldás nem létezik.

Írjuk ehhez az n -et $3^k \cdot d$ alakba ($k \geq 0$, 3 és d relatív prímelek). Ekkor

$$(1) \quad 2^n + 1 = 2^{3^k d} + 1 = (2^d + 1) \prod_{i=0}^{k-1} (2^{2 \cdot 3^i d} - 2^{3^i d} + 1).$$

Mivel minden páratlan t egészre $2^{2t} - 2^t + 1$ osztható 3 -mal, de nem osztható 9 -cel, ezért (1) jobb oldalán a k -tényezős szorzat 3 -nak pontosan a k -adik hatványával osztható.

Ha most a fenti alakú szám megoldás, azaz $n^2 = (3^k d)^2$ osztója $2^n + 1$ -nek, akkor a „hiányzó” 3 -as tényezőket az (1)-beli szorzat első tényezőjének kell tartalmaznia:

$$3^k | 2^d + 1,$$

ami csak a $k = 0$, vagy 1 esetekben lehetséges, hiszen $(d, 3) = 1$ miatt $9 \nmid 2^d + 1$.

Megmutatjuk, hogy d értéke csak 1 lehet. Tegyük fel, hogy $d > 1$ és legyen a d legkisebb prímosztója p , ami legalább 5, másfelől $(p-1, d) = 1$.

A feltétel miatt

$$(2) \quad p | 2^n + 1,$$

a kis Fermat-tételből pedig

$$p | 2^{p-1} - 1$$

következik. Így a

$$2^{2n} \equiv 1 \pmod{p}$$

és

$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

kongruenciákból

$$(3) \quad 2^m \equiv 1 \pmod{p}$$

következik, ahol $m = (2n, p-1)$.

Mivel $2n | 2 \cdot 3d$ és $(p-1, d) = 1$, ezért szükségképpen $m | 6$, azaz (3) szerint a p prímszám az 1, 3, 7, 63 számok valamelyikének 3-nál nagyobb prímtényezője, ami csak úgy lehetséges, ha $p = 7$. Ez viszont lehetetlen, ugyanis (2) alapján ekkor $7 | 2^n + 1$, ami egyetlen pozitív egész n kitevővel sem teljesül. A d tehát valóban nem lehet 1-nél nagyobb.

A feladat feltétele így csak azokra az $n = 3^k d$ számokra teljesülhet, amelyekre $k \leq 1$ és $d = 1$. Ha $k = 0$, akkor $n = 1$, ha pedig $k = 1$, akkor $n = 3$.

Pataki János

4. Jelölje Q^+ a pozitív racionális számok halmazát. Adjunk példát olyan $F : Q^+ \rightarrow Q^+$ függvényre, amelyre

$$f(x \cdot f(y)) = \frac{f(x)}{y}$$

teljesül minden $x, y \in Q^+$ esetén.

Megoldás. Defináljuk az f függvényt a következőképpen: Vegyük tetszőleges $x \in Q^+$ számnak a prímfelbontását, ahol a prímeket a szokásosan értelmezzük, de nem csak nemnegatív, hanem egész hatványon fordulhatnak elő a prímfelbontásban. Vegyük sorra a prímeket (minden x esetében ugyanolyan sorrendben): p_1, p_2, p_3, \dots . Ekkor $f(x)$ legyen az a szám, amelyet x prímfelbontásából kapunk úgy, hogy p_{2n} helyébe p_{2n-1} -et, p_{2n-1} helyébe p_{2n}^{-1} -et írunk. Mivel mind a prímfelbontás, mind a behelyettesítési művelet egyértelmű, ezért $f(x)$ is. (Persze csak adott prímfelsorolás mellett) Bebizonyítjuk, hogy f teljesíti a kívánt feltételeket:

I. $f(x) \in Q^+$ nyilvánvaló.

II. Mivel f multiplikatív, és a kritérium nem érzékeny a multiplikativitásra, ezért elég $f(f(y)) = y^{-1}$ -et igazolni, és ezt is csak prímekekre. Az f definíciója szerint

$$\begin{array}{ll} y = p_{2n} & \text{esetén} & f(f(y)) = f(p_{2n-1}) = p_{2n}^{-1} = y^{-1}, \\ y = p_{2n-1} & \text{esetén} & f(f(y)) = f(p_{2n}^{-1}) = p_{2n-1}^{-1} = y^{-1}. \end{array}$$

Ezzel beláttuk az $f(x \cdot f(y)) = \frac{f(x)}{y}$ kritérium teljesülését is, azaz az így kapott f függvény példa ilyen függvényre.

Megjegyzés. Hammel-bázissal R^+ -ra is általánosítható a feladat, illetve minden ilyen f függvény jellemezhetővé válik. (A versenyen beadott, R^+ -ra is általánosított megoldásom is ezzel dolgozik, míg az itt leírt megoldásom alapötletét a versenyen csak megjegyzésben közöltem.)

Lakos Gyula

5. Egy $n_0 > 1$ egész számból kiindulva két játékos, A és B felváltva neveznek meg n_1, n_2, n_3, \dots egész számokat, az alábbi szabályokat betartva.

Ha n_{2k} már meg van nevezve, A tetszése szerint választ egy n_{2k+1} egész számot, amire

$$n_{2k} \leq n_{2k+1} \leq n_{2k}^2$$

teljesül. Ha már n_{2k+1} meg van nevezve, B tetszése szerint választ egy n_{2k+2} egész számot, amire

$$\frac{n_{2k+1}}{n_{2k+2}}$$

legalább 1 kitevőjű prímszám. Az A játékos nyer, ha 1990-et nevezi meg, B játékos nyer, ha 1-et nevezi meg.

Mely n_0 értékekre teljesül:

- A -nak van nyerő stratégiája,
- B -nek van nyerő stratégiája,
- egyik játékos sem tudja kikényszeríteni a győzelmet?

Megoldás. Rögtön észrevehetjük, hogy B -nek mindig csökkentenie kell az utoljára elhangzott számot, A -nak pedig növelnie (legalábbis nem csökkentenie). Az is látszik, hogy B csak akkor nyerhet, ha A előtte prímszámot mondott. Mivel A mindig egy $[n_{2k}, n_{2k}^2]$ típusú intervallumból választhat számot, ezért — úgy érezzük — B -nek elég kevés esetben van esélye a nyeresre, feltéve persze, hogy A valamilyen ésszerű stratégiával játszik.

Célszerű tehát először az a) kérdéssel foglalkoznunk. Ha $n_0 \leq 1990 < n_0^2$, akkor A triviálisan nyer az $n_1 = 1990$ számmal, ezért $45 \leq n_0 \leq 1990$ esetén A -nak van nyerési stratégiája.

Az $1990 < n_0$ esetben A nem alkalmazhatja ezt a módszert, de ha tud olyan n_1 számot mondani, amelyre B csak $45 \leq n_2 \leq 1990$ számmal választhat, akkor ismét A nyer, hiszen ekkor n_0 szerepét n_2 veszi át. Legyen például $n_1 = 47 \cdot 53 = 2491$ — A választhatja ezt a számot $1990 < n_0 \leq 2491$ esetén —, ezzel $n_2 = 47$ vagy 53 .

Ezzel beláttuk, hogy $45 \leq n_0 \leq 2491$ esetén A tud nyerni, hasonlóan fogjuk igazolni k szerinti teljes indukcióval, hogy $45 \leq n_0 \leq 2^{k-1} \cdot 2491$ esetén (k pozitív egész) is A -nak van nyerési stratégiája.

$k = 1$ -re már beláttuk az állítást, tegyük fel ezért, hogy valamilyen $k \geq 1$ -re igaz az állítás, azt kell megmutatnunk, hogy

$$2^{k-1} \cdot 2491 < n_0 \leq 2^k \cdot 2491$$

esetén A -nak van nyerési stratégiája.

Válassza ehhez A az $n_1 = 2^k \cdot 2491 = 2^k \cdot 47 \cdot 53$ számot, nyilván $n_0 \leq n_1 < n_0^2$. Ezek után B csak egy $n_2 = n_1/p^\alpha = (2^k \cdot 47 \cdot 53)/p^\alpha$ alakú egészet választhat, ahol p^α prímszám. Erre $47 < n_2 \leq \frac{n_1}{2} = 2^{k-1} \cdot 2491$, ami azt jelenti induktív feltevésünk szerint, hogy A -nak van nyerési stratégiája, az állítás $(k+1)$ -re is fennáll.

Eddigi eredményeinket összefoglalva kapjuk, hogy a $45 \leq n_0$ esetben A -nak van nyerési stratégiája.

Próbáljuk meg a fennmaradó $n_0 < 45$ eseteket is erre az esetre visszavezetni. A -nak olyan n_1 számot kell mondania, amelyre B csak egy $45 \leq n_2$ számot választhat. Tekintsük ehhez az $n_1 = 3^2 \cdot 5 \cdot 11 = 495$ számot — A választhatja ezt a $23 \leq n_0 \leq 44$ esetben, mert ekkor $n_0 \leq n_1 \leq n_0^2$ —, ezzel n_2 -re

$$n_2 \geq \min(3^2 \cdot 5, 3^2 \cdot 11, 5 \cdot 11) = 3^2 \cdot 5 = 45,$$

vagyis az előzőek alapján A -nak van nyerési stratégiája.

Hátra van az $n_0 \leq 22$ eset vizsgálata; A -nak most már elegendő olyan n_1 számot mondania, amelyre $n_2 \geq 23$. Legyen ehhez $n_1 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$, ezzel $n_2 \geq 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. Mivel a $15 \leq n_0 \leq 22$ esetben $n_0 \leq n_1 \leq n_0^2$ is teljesül, ezért ilyenkor is A -nak van nyerési stratégiája.

Tovább „lépegetünk” lefelé — mindig ugyanazzal a redukáló szándékkal: $11 \leq n_0 \leq 14$ esetén A száma legyen $n_1 = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$; nyilván $n_0 \leq n_1 \leq n_0^2$, és $n_2 \geq 3 \cdot 5 = 15$, vagyis innen A nyerni tud — az eddig bizonyítottak miatt.

Végül legyen $n_1 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ ha $8 \leq n_0 \leq 10$; ekkor $n_0 \leq n_1 \leq n_0^2$ és $n_2 \geq \min(2^2 \cdot 3, 2^2 \cdot 5, 3 \cdot 5) = 2^2 \cdot 3 = 12$, ami azt jelenti, hogy ekkor is A -nak van nyerési stratégiája.

Ezzel beláttuk, hogy $8 \leq n_0$ esetén A -nak van nyerési stratégiája.

Ezzel a módszerrel nem tudjuk tovább csökkenteni n_0 olyan lehetséges értékeit, amelyekből kiindulva A el tudja érni a győzelmet. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy $n_0 < 8$ esetén A nem tud olyan n_1 számot mondani, amelyre B csak egy $n_2 \geq 8$ -cal válaszolhatna. Ez a tény azt sejteti velünk, hogy $n_0 < 8$ esetén B legalább egy döntetlent ki tud kényszeríteni. (Valójában az előbbi észrevétel igazolja is sejtésünket, hiszen ha B nem nyer, akkor B még mindig ki tud kényszeríteni egy végtelen

$$n_0 < 8, n_1 < 64, n_2 < 8, n_3 < 64, n_4 < 8, n_5 < 64, \dots$$

számsorozatot, ami azt jelenti, hogy A sem nyerhet, mert nem nevezheti meg az 1990-et. A későbbiekben azonban úgyszólván pontosabban megvizsgáljuk a döntetlen lehetőségeit, ezért egyelőre a sejtés elegendő számunkra.)

Foglalkozzunk most a b) kérdéssel.

Ha $n_0 = 2$, akkor $n_0 \leq n_1 \leq n_0^2$ miatt A csak prímszámot választhat ($n_1 = 2, 3, 4$), vagyis B mondhatja az $n_2 = 1$ számot, amivel megnyeri a játékot.

Ha $n_0 = 3$, akkor $n_1 = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$. Ha n_1 prímszám, akkor $n_2 = 1$ -gyel B nyer, egyébként $n_1 = 6 = 2 \cdot 3$. Ekkor B választhatja az $n_2 = 2$ számot, és ekkor – mint az előbb igazoltuk – B -nek van nyerési stratégiája. (n_0 szerepét n_2 veszi át).

Ha $n_0 = 4$, akkor B az előbbiekhöz hasonlóan el tudja érni a győzelmet, amennyiben n_1 prímszám, vagy $n_1 \leq 3^2$. Különben pedig $n_1 = 10, 12, 14, 15$; és ezeket az eseteket rendre visszavezethetjük az előzőkre az $n_2 = 2, 3, 2, 3$ választással, ugyanis $n_2 \leq 3$ esetén B -nek van nyerési stratégiája.

Végül $n_0 = 5$ esetén $n_0 \leq n_1 \leq n_0^2$ miatt n_1 prímszám, vagy $n_1 \leq 4^2$ (amire már láttuk, hogy B -nek van nyerési stratégiája), vagy pedig $n_1 = 18, 20, 21, 22, 24$, és ezeket az $n_2 = 2, 2^2, 3, 2, 3$ választással rendre visszavezethetjük a már megvizsgált $n_0 \leq 4$ esetre (n_0 szerepét n_2 veszi át).

Összességében tehát kimondhatjuk, hogy $2 \leq n_0 \leq 5$ esetén B -nek van nyerési stratégiája.

Meg kell még vizsgálnunk az $n_0 = 6, 7$ esetet. Mivel a B -nek győzelmet jelentő n_0 kezdőértékek lehetséges értékeit nem tudjuk a szokásos módszerünkkel tovább növelni, ezért igen valószínűnek látszik, hogy $n_0 = 6, 7$ esetén egyik játékos sem tudja kikényszeríteni a győzelmet. Ehhez csak azt kell igazolnunk, hogy mind A , mind B tud úgy játszani, hogy a másik ne nyerhessen.

Legyen tehát $n_0 = 6$ vagy 7 , és A válassza az $n_1 = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ számot, amelyre nyilván $n_0 < n_1 < n_0^2$. B ezután csak $n_2 = 2 \cdot 5 = 10$ -et, vagy $n_2 = 3 \cdot 5 = 15$ -öt, vagy $n_2 = 2 \cdot 3 = 6$ -ot választhat.

Az $n_2 = 10, 15$ esetben – mint már láttuk – A -nak van nyerési stratégiája, az $n_2 = 6$ eset pedig A szempontjából ekvivalens az $n_0 = 6$ kezdéssel (tehát újra jöhet $n_0 = 30$, stb.) így beláttuk, hogy ha A ügyesen játszik, akkor B nem nyerhet.

Ugyanez áll viszont B -re is. Ha ugyanis $n_0 = 6$ vagy 7 , akkor $6 \leq n_1 \leq 49$, és ha végignézzük a $6, 7, \dots, 49$ számokat, azt találjuk, hogy B mindig tud olyan n_2 számot mondani, amelyre $n_2 \leq 6$. Ha $n_2 \leq 5$, akkor a fentiek miatt nyerési stratégiája van B -nek (esetleg $n_2 = 1$), ha pedig $n_2 = 6$, akkor ugyanolyan helyzetet kapunk, mint amilyennel kezdtük a játékot (amikor $n_0 = 6, 7$).

Ezzel a feladatot megoldottuk, eredményeinket a következőképpen foglalhatjuk össze:

- A -nak van nyerési stratégiája, ha $8 \leq n_0$,
- B -nek van nyerési stratégiája, ha $2 \leq n_0 \leq 5$, végül
- egyik játékos sem tudja kikényszeríteni a győzelmet, ha $n_0 = 6, 7$.

Harcos Gergely

6. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan konvex 1990-szög, amelyik rendelkezik az alábbi két tulajdonsággal:

- A sokszög minden szöge egyenlő.
- Az oldalak hosszai az $1^2, 2^2, 3^2, \dots, 1989^2, 1990^2$ számok valamilyen sorrendben.

Jelölje ε a 995-ik komplex egységgyökök közül az elsőt. Tekintsük a következő 995 tagú összeget:

$$(1) \quad \begin{aligned} S = & 0 \cdot \varepsilon^0 + 199 \cdot \varepsilon^{199} + 398 \cdot \varepsilon^{398} + 597 \cdot \varepsilon^{597} + 796 \cdot \varepsilon^{796} + \\ & + 1 \cdot \varepsilon^5 + 200 \cdot \varepsilon^{204} + 399 \cdot \varepsilon^{403} + 598 \cdot \varepsilon^{602} + 797 \cdot \varepsilon^{801} + \\ & + 2 \cdot \varepsilon^{10} + 201 \cdot \varepsilon^{209} + 400 \cdot \varepsilon^{408} + 599 \cdot \varepsilon^{607} + 798 \cdot \varepsilon^{806} + \\ & + \dots \\ & + 198 \cdot \varepsilon^{990} + 397 \cdot \varepsilon^{194} + 596 \cdot \varepsilon^{393} + 795 \cdot \varepsilon^{592} + 994 \cdot \varepsilon^{791} + \end{aligned}$$

(Minden tag ε -os szorzandója a felette levőének ε^5 -szerese. Felhasználjuk, hogy $\varepsilon^{995} = 1$. Az együtthatók a 995-ik

egységgyököket megszorozzák a $[0; 994]$ intervallum egészeivel. Az (1)-et a nem nulla $(1 - \varepsilon^{199})$ -el szorozva:

$$\begin{aligned}
 (2) \quad (1 - \varepsilon^{199})S &= 0 \cdot \varepsilon^0 - 0 \cdot \varepsilon^{199} + 199 \cdot \varepsilon^{199} - 199 \cdot \varepsilon^{398} + 398 \cdot \varepsilon^{398} - 398 \cdot \varepsilon^{597} + \\
 &\quad + 597 \cdot \varepsilon^{597} - 597 \cdot \varepsilon^{796} + 796 \cdot \varepsilon^{796} - 796 \cdot \varepsilon^{995} + \dots = \\
 &= -796 \cdot \varepsilon^0 + 199 \cdot \varepsilon^{199} + 199 \cdot \varepsilon^{398} + 199 \cdot \varepsilon^{597} + 199 \cdot \varepsilon^{796} + \dots = \\
 &= 199 \underbrace{(\varepsilon^0 + \varepsilon^1 + \varepsilon^2 + \varepsilon^3 + \dots + \varepsilon^{994})}_{S_1} - 995 \underbrace{(\varepsilon^0 + \varepsilon^5 + \varepsilon^{10} + \varepsilon^{15} + \dots + \varepsilon^{990})}_{S_2}.
 \end{aligned}$$

Mivel $S_1 = S_2 = 0$, ezért $(1 - \varepsilon^{199})S = 0$, amiből $S = 0$, innen $995(997S_1 + 2S) = 0$. Így a 995-ik egységgyökök megszámozhatóak a $995 \cdot 997, 995 \cdot 999, \dots, 995 \cdot 2985$ számokkal úgy, hogy minden egységgyököt a rá írt számmal megszorozva, majd az így kapott vektorokat összeadva nullvektort kapunk. A $995(995 + 2k)$ hosszúságú vektort egy vele egyirányú $(995 + i)^2$, és egy vele ellentétes irányú i^2 hosszúságú vektorral helyettesítve az összeg változatlan marad, hiszen $(995 + k)^2 - k^2 = 995(995 + 2k)$. Tehát az 1990-edik egységgyököket megszámoztuk az $1^2, 2^2, 3^2, \dots, 1990^2$ számokkal úgy, hogy mindegyiket a ráírt számmal szorozva, majd ezeket összeadva az összeg a nullvektor lesz. Másrészt azonban ezeket a súlyozott egységgyököket növekvő argumentum szerint az „orr-farok” módszerrel egymás után rakva éppen egy, a feladatban kért 1990-szöget kapunk.

Csirik János