

Keressük a  $p(x)$  és  $q(x)$  másodfokú polinomot  $p(x) = ax^2 + bx + c$  és  $q(x) = rx^2 + sx + t$  alakban. Ha a  $p(q(x))$  összetett függvény azonos az  $f(x)$  polinommal, akkor a megfelelő együtthatók megegyeznek, és így az együtthatók összehasonlításával az

$$\begin{aligned} ar^2 &= A, \\ 2ars &= B, \\ 2art + as^2 + br &= C, \\ 2ast + bs &= D, \\ at^2 + bt + c &= E \end{aligned}$$

egyenletrendszerre jutunk. A kérdéses előállításnak tehát szükséges és elégséges feltétele, hogy ez a rendszer az  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ,  $r$ ,  $s$ ,  $t$  ismeretlenekre megoldható legyen. Világos, hogy az utolsó egyenletet figyelmen kívül hagyhatjuk, ugyanis  $c$  csak ebben szerepel, ha tehát  $a$ ,  $b$  és  $t$  értékét már valahogy meghatároztuk,  $c$ -t mindig megválaszthatjuk úgy, hogy az ötödik egyenlet teljesüljön. Az  $A \neq 0$  feltételből az első egyenlet alapján  $a \neq 0$  és  $r \neq 0$ . Az első egyenlettel a további hármat végigosztva a

$$\begin{aligned} \frac{B}{A} &= 2 \frac{s}{r}, \\ \frac{C}{A} &= 2 \frac{t}{r} + \frac{s^2}{r^2} + \frac{b}{ar}, \\ \frac{D}{A} &= \left( 2 \frac{t}{r} + \frac{b}{ar} \right) \frac{s}{r} \end{aligned}$$

egyenletekre jutunk és ezekből

$$\left( \frac{C}{A} - \frac{1}{4} \frac{B^2}{A^2} \right) \frac{1}{2} \cdot \frac{B}{A} = \frac{D}{A},$$

vagyis

$$(*) \quad D = \frac{BC}{2A} - \frac{B^3}{8A^2}.$$

Ahhoz tehát, hogy az  $f(x) = p(q(x))$  előállítás lehetséges legyen,  $f$  együtthatói között teljesülnie kell a fenti egyenlőségnek, hiszen következménye az együtthatókra felírt egyenletrendszernek. Másrészt, ha a (\*) egyenlet teljesül, akkor az egyenletrendszer megoldható: legyen pl.  $r = 1$ ,  $t = 0$ , az első egyenletből  $a = A$ , a másodikból  $s = \frac{B}{2A}$ , a harmadikból  $b = C - \frac{B^2}{4A}$  és (\*) biztosítja, hogy a negyedik egyenlet ezzel nincs ellentmondásban, végül az ötödik egyenletből  $c$  is kifejezhető.

*Hornung Tamás* (Győr, Czuczor G. Bencés Gimn., IV. o. t.)