


Az alábbi problémák megoldásához analízisből vett eszközöket használunk. Ezek a feladatok középiskolás diákok számára is hozzáférhetőek, és jelentősen mélyíthetik a függvény és a folytonosság fogalmát.

**1. Bizonyítsuk be, hogy bármely korlátos, konvex síkbeli alakzat adott irányú egyenessel két egyenlő területű részre vágható szét.**

**Megoldás.** Az 1. ábrán  $e$  az adott iránnyal párhuzamos egyenes,  $e_1$  és  $e_2$  pedig ugyanilyen irányú támaszegyenesek. Legyen  $P$  az  $e_1$  egyenes és a konvex alakzat közös pontja,  $P$  és  $e$  távolságát pedig jelöljük  $x$ -szel. Az  $e$  egyenes az alakzatot két részre vágja, legyen a két rész területe az ábra szerint  $t(x)$  és  $t_1(x)$ . Feltehetjük, hogy  $t(x) < t_1(x)$ , azaz  $t(x) - t_1(x) < 0$ . Ha  $e_1$  és  $e_2$  távolsága  $x_1$ , akkor nyilván  $t(x_1) - t_1(x_1) > 0$ . Ezért, ha  $t(x)$  és  $t_1(x)$   $x$ -nek folytonos függvényei, akkor Bolzano tétele<sup>2</sup> szerint az  $(x; x_1)$  intervallumban van olyan  $x_0$ , amelyre  $t(x_0) - t_1(x_0) = 0$ , ami a feladat állítását jelenti. Megmutatjuk, hogy  $t(x)$  (és  $t_1(x)$ ) folytonos függvénye  $x$ -nek.



Ehhez definíció szerint azt kell belátnunk, hogy tetszőleges  $\varepsilon$  pozitív számhoz található olyan  $\delta > 0$ , hogy minden  $\Delta x < \delta$  esetén  $|t(x + \Delta x) - t(x)| < \varepsilon$ . A korlátosság feltétele szerint létezik olyan  $R$  sugarú kör, amely a konvex alakzatot magába foglalja. Ezért


$$|t(x + \Delta x) - t(x)| \leq 2R\Delta x < 2R\delta < \varepsilon,$$

ha  $\delta = \frac{\varepsilon}{2R}$ . ■

**Feladat.** Bizonyítandó, hogy a feladat állítása adott irányú egyenes helyett adott ponton átmenő egyenessel is érvényes.

**2. Bizonyítsuk be, hogy minden korlátos, konvex síkbeli tartományhoz létezik két egymásra merőleges egyenes, amelyek a tartományt négy egyenlő területű részre vágják.**

**Megoldás.** Legyenek  $e_1$  és  $e_2$  a konvex halmaz területét felező egymásra merőleges (irányított) egyenesek. Ilyenek az előző feladat szerint léteznek. Jelöljük az  $e_1$  és az  $x$  tengely szögét  $\alpha$ -val, az  $e_1$  és  $e_2$  létrehozta négy síkrész területét  $t_i(\alpha)$ -val, és használjuk a 2. ábra további jelöléseit is. Tekintve, hogy  $t_1(\alpha) + t_2(\alpha)$ , valamint  $t_2(\alpha) + t_3(\alpha)$  is a konvex alakzat területének a fele,  $t_1(\alpha) = t_3(\alpha)$ , és hasonlóan  $t_2(\alpha) = t_4(\alpha)$ . Ezért a feladat állításának igazolásához elegendő megmutatni, hogy van olyan  $\alpha_0$  szög, amellyel  $t_1(\alpha_0) = t_2(\alpha_0)$ . Ha  $\alpha$  már ilyen, akkor készen vagyunk. Egyéb esetben feltehetjük, hogy  $t_1(\alpha) > t_2(\alpha)$ , azaz  $t_1(\alpha) - t_2(\alpha) > 0$ . Forgassuk el  $e_1$ -et és  $e_2$ -t  $90^\circ$ -kal úgy, hogy eközben mindig területfelező egyenesek maradjanak.



<sup>1</sup> A cikk megjelent a Polygon folyóirat 1992. májusi számában (115–123. o.)

<sup>2</sup> E tétel a következőt állítja: ha  $f$  az  $[a, b]$  intervallumon folytonos függvény, akkor ott  $f$  minden  $f(a)$  és  $f(b)$  közötti valós értéket felvesz.

Ekkor  $t_1(\alpha + 90^\circ) = t_4(\alpha)$ ,  $t_2(\alpha + 90^\circ) = t_1(\alpha)$ , és így


$$t_1(\alpha + 90^\circ) - t_2(\alpha + 90^\circ) = t_2(\alpha) - t_1(\alpha) < 0.$$

Azt nyertük, hogy a  $t_1(\alpha) - t_2(\alpha)$  függvény az  $[\alpha; \alpha + 90^\circ]$  intervallumban előjelet vált. Ezért, feltéve, hogy  $t_1(\alpha)$  és  $t_2(\alpha)$  folytonos, Bolzano tétele szerint létezik olyan  $\alpha_0$ , amellyel  $t_1(\alpha_0) = t_2(\alpha_0)$ . Forgassuk el  $e_1$ -et és  $e_2$ -t egy  $\Delta\alpha$  szöggel. Az elforgatott egyenesek  $e'_1$  és  $e'_2$ , Megmutatjuk, hogy pl.  $t_1(\alpha)$  folytonos. Ehhez meg kell becsülnünk  $t_1(\alpha + \Delta\alpha)$  és  $t_1(\alpha)$  különbségét. Az ábrán bevonalkázott területek mindegyike kisebb  $\frac{(2R)^2 \cdot \Delta\alpha}{2}$ -nél, ahol  $R$  egy olyan kör sugara, amely magába foglalja a konvex alakzatot. Ilyen kör a korlátosság következtében létezik. Könnyen belátható, hogy

$$|t_1(\alpha + \Delta\alpha) - t_1(\alpha)| < 4 \frac{(2R)^2 \cdot \Delta\alpha}{2} < \varepsilon, \quad \text{ha } \Delta\alpha < \frac{\varepsilon}{8R^2} < \delta, \quad \text{ahol } \varepsilon > 0. \blacksquare$$

**3. Bizonyítsuk be, hogy bármely korlátos síkbeli ponthalmaz belefoglalható egy négyzetbe úgy, hogy a négyzet mindegyik oldalán van az alakzat határának pontja.**

**Megoldás.** Először konvex tartományokra bizonyítjuk az állítást. Legyenek a konvex alakzat támasztéglalapjának oldalai  $a(\gamma)$ ,  $b(\gamma)$ , ahol  $\gamma$  az  $a$  oldal egyenesének az  $x$  tengellyel bezárt szöge (3. ábra).



Itt fölhasználjuk azt a tényt, hogy korlátos síkbeli ponthalmaz belefoglalható két adott irányú támaszegyenes közötti sávba. Ha  $a(\gamma) = b(\gamma)$ , akkor a feladat állítása igaz. Tegyük fel ezután, hogy  $a(\gamma) > b(\gamma)$ , azaz  $a(\gamma) - b(\gamma) > 0$ . Tekintsük a  $\gamma + 90^\circ$  szöghöz tartozó támasztéglalap oldalait:

$$a(\gamma + 90^\circ) = b(\gamma); \quad b(\gamma + 90^\circ) = a(\gamma).$$

Ezekből

$$a(\gamma + 90^\circ) - b(\gamma + 90^\circ) = b(\gamma) - a(\gamma) < 0.$$


Ezért, ha  $a(\gamma)$  és  $b(\gamma)$  folytonos, akkor Bolzano tétele szerint a  $[\gamma; \gamma + 90^\circ]$  intervallumban létezik olyan  $\gamma_0$  hely, amelyre  $a(\gamma_0) - b(\gamma_0) = 0$ , tehát a támasztótéglalap négyzet.

Ha a ponthalmaz nem konvex, akkor konvex burkára létezik körülírt négyzet. Mivel egy alakzat konvex burka éppen a támaszegyenesei által meghatározott félsíkok közös része, a konvex burok minden támaszegyenesese az eredeti alakzatnak is támaszegyenesese. Ezért a konvex burok körülírt négyzete az eredeti alakzatnak is körülírt négyzete. ■

**Feladat.** Mutassuk meg, hogy  $a(\gamma)$  és  $b(\gamma)$  a  $\gamma$ -nak folytonos függvénye.

**4. Bizonyítandó, hogy a sík bármely korlátos, konvex halmazához található olyan egyenes, amely a konvex alakzat területét és határvonalát is felezi.**

**Megoldás.** Legyen a halmaz határvonalának hossza  $k$ . Legyen  $P(x)$  az a pont, amelyre rögzített  $P$  és  $P(x)$  közötti kisebbik kerület darab hossza  $x$ , ahol  $0 \leq x \leq \frac{k}{2}$ . Legyen a  $P(x)$ -szel szemben levő pont  $Q(x)$ , ami azt jelenti, hogy a két pontot összekötő (irányított) egyenes a konvex halmaz határvonalát két egyenlő hosszú részre vágja. Ennek az egyenesnek a „jobb” oldalán lévő területrész legyen  $T_j(x)$ , a másik  $T_b(x)$  (4. ábra). Ha  $T_j(x) = T_b(x)$ , akkor a feladat állítása igaz. Egyébként feltehető, hogy pl.  $T_j(0) - T_b(0) > 0$ .




Mivel

$$T_j\left(\frac{k}{2}\right) = T_b(0) \text{ és } T_b\left(\frac{k}{2}\right) = T_j(0),$$

azért

$$T_j\left(\frac{k}{2}\right) - T_b\left(\frac{k}{2}\right) = T_b(0) - T_j(0) < 0.$$

Így, ha  $T_j(x)$  és  $T_b(x)$   $x$ -nek folytonos függvényei, akkor Bolzano tétele szerint létezik olyan  $x_0$ , amelyre  $T_j(x_0) - T_b(x_0) = 0$ . Az  $x_0$ -hoz tartozó  $P(x_0)$  és  $Q(x_0)$  pontokat összekötő egyenes a konvex alakzat területét és kerületét is felezi.



Be kell még bizonyítanunk, hogy  $T_j(x)$  (és  $T_b(x)$  is)  $x$ -nek folytonos függvénye. Használjuk az 5. ábra jelöléseit. A  $P(x)$ ,  $P(x_0)$  pontok és a velük szemköztiek belefoglalhatók egy  $|x - x_0|$  szélességű és  $2R$  hosszúságú téglalapba, ahol  $|x - x_0|$  a  $P(x)$  és  $P(x_0)$  közötti kerület darab hossza,  $R$  pedig egy a konvex halmazt magába foglaló kör sugara. Mivel  $T_j(x)$  megváltozása a bevonalkázott területek különbségeinek abszolút értéke, érvényes a következő becslés:

$$|T_j(x) - T_j(x_0)| < |x - x_0| \cdot 2R < \varepsilon,$$


ha  $|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{2R} = \delta$ , ahol  $\varepsilon > 0$ . Tehát  $T_j(x)$  valóban folytonos. ■

*Megjegyzés.* Ebben a feladatban – és az előbbieken is – fölhasználtuk, hogy korlátos, konvex síkbeli alakzatnak van területe. Az 1. feladatban a konvexség feltétele csak a terület létezése miatt kellett. Ebben a feladatban fölhasználtuk azt is, hogy korlátos és zárt, konvex síkbeli alakzat határvonala mérhető.

**5. Van-e olyan sík, amely egy adott tetraédert két egyenlő felszínű és térfogatú részre vág szét?**

**1. megoldás.** Először bebizonyítjuk, hogy a tetraéder két szemközti élének felezőpontján átmenő sík felezi a tetraéder térfogatát. Két esetet különböztetünk meg.

a) Legyen az  $ABCD$  tetraéder  $AB$  élének felezőpontja  $E$ , a  $CD$  él felezőpontja pedig  $G$  (6. ábra). Az  $E$  és  $G$  pontokon átmenő  $CEG$  sík a tetraédert két egyenlő térfogatú részre vágja. Ugyanis a  $CE$  súlyvonal felezi az  $ABC$  háromszög területét, ezért az  $AECD$  és  $EBCD$  tetraéderek  $AEC$  és  $EBC$  alapterülete megegyezik, továbbá egybeesik a  $D$ -ből húzható magasságuk is.



b) Forgassuk el a  $CED$  síkot az  $EG$  egyenes körül. Az elforgatott sík a tetraédert az  $EFGH$  négyszögben metszi. Azt állítjuk, hogy az elforgatott sík is felezi a tetraéder térfogatát. Tekintsük az  $EBCD$  tetraédert. Ebből az elforgatott sík egyrészt levágja az  $EFG$  alapú  $C$  csúcsú gúlát, másrészt hozzáveszi az  $EGH$  alapú  $D$  csúcsú gúlát. Mivel a tetraéder  $AD$  és  $BC$  éle egy-egy  $EG$ -vel párhuzamos síkba foglalható, az  $F$  és  $H$  pontok egyenlő távolságra vannak  $EG$ -től. Ezért az  $EFG$  és az  $EGH$  háromszögek területe egyenlő. Tekintve, hogy a  $G$  pont a  $CD$  él felezőpontja, a  $C$  és  $D$  pontoknak az  $EFGH$  síktól való távolsága ugyanakkora, ezért az említett két gúla magassága is egyenlő, tehát térfogatuk egyenlő. Ez azt jelenti, hogy az elforgatott sík felezi a tetraéder térfogatát. A  $CED$  sík  $GE$  körüli forgatása közben pl. az  $F$  pont a  $DA$  szakaszon mozog  $A$  felé. Ha  $F$  egybeesik  $A$ -val, újra előáll a megoldás a) részében leírt helyzet. Ha az  $ABG$  síkot  $EG$  körül tovább forgatjuk, a megoldás b) részében leírtak ismétlődnek.

Tekintsünk ezután egy, a tetraéder térfogatát felező  $S$  síkot. A két résztest felszíne – a metszetalap területe nélkül – legyen  $A_1(\gamma)$ , illetve  $A_2(\gamma)$ , ahol  $\gamma$   $S$ -nek és egy rögzített síknak a hajlásszöge. Ha  $A_1(\gamma) = A_2(\gamma)$ , akkor készen vagyunk. Tegyük fel ezután, hogy  $A_1(\gamma) > A_2(\gamma)$ , azaz  $A_1(\gamma) - A_2(\gamma) > 0$ . Forgassuk el  $S$ -et a tetraéder két szemközti élének felezőpontját összekötő egyenes körül  $180^\circ$ -kal. Ekkor  $A_1(\gamma + 180^\circ) = A_2(\gamma)$  és  $A_2(\gamma + 180^\circ) = A_1(\gamma)$ , hiszen az  $S$  sík  $180^\circ$ -os forgatás után önmagába megy át. Ezért

$$A_1(\gamma + 180^\circ) - A_2(\gamma + 180^\circ) = A_2(\gamma) - A_1(\gamma) < 0.$$

Feltéve, hogy  $A_1(\gamma) - A_2(\gamma)$  folytonos, Bolzano tétele szerint lesz a  $[0^\circ; 180^\circ]$  intervallumban olyan  $\gamma_0$  szög, amelyre  $A_1(\gamma_0) - A_2(\gamma_0) = 0$ , tehát  $A_1(\gamma_0) = A_2(\gamma_0)$ . ■

**Feladat.** Bizonyítsuk be, hogy  $A_1(\gamma)$  és  $A_2(\gamma)$   $\gamma$ -nak folytonos függvényei.

**2. megoldás.** A feladat elemi úton is megoldható. Az elemi megoldásnak további szépsége, hogy megad egy olyan síkot, amely a tetraéder felszínét és térfogatát is felezi, míg az első megoldásban csak létezését bizonyítottunk.

Legyen a  $V$  térfogatú,  $A$  felszínű tetraéder beírt gömbjének középpontja  $O$ . Az  $O$  pontot a csúcsokkal összekötve a tetraédert olyan gúlákra bonthatjuk, amelyek alapterülete a tetraéder egy-egy lapja, magassága pedig a beírt gömb  $r$  sugara. Ezeknek a gúláknak a térfogatát összeadva a tetraéder térfogatát kapjuk. Ezért  $V = \frac{A \cdot r}{3}$ . Vegyünk fel ezután egy  $O$ -n átmenő tetszőleges síkot. Ez a sík a tetraédert egy  $V_1$ , illetve  $V_2$  térfogatú részre vágja, legyen a  $V_1$  térfogatú testhez tartozó felszínrész  $A_1$ , a másik  $A_2$ . A szóban forgó sík az előbb említett gúlák némelyikét nem metszi, másokat pedig két  $O$  csúcsú gúlára vág szét, ezért  $V_1 = \frac{A_1 \cdot r}{3}$  és  $V_2 = \frac{A_2 \cdot r}{3}$ .

Az 1. megoldásban bebizonyítottuk, hogy a tetraéder két szemközti élének felezőpontján átmenő sík felezi a tetraéder térfogatát. Tekintsük azt a síkot, amely két szemközti él felezőpontján és az  $O$  ponton megy át. Ez a sík felezi a tetraéder térfogatát, azaz  $V_1 = V_2$ , ezért az előbbi képletekből  $A_1 = A_2$ . ■

**6. Bizonyítsuk be, hogy a tér bármely korlátos, konvex halmazához található olyan sík, amely a test térfogatát és felszínét is felezi.**

**Megoldás.** A feladat megoldását az Olvasóra bizzuk. Mutassuk meg, hogy a tér egy adott egyenesén átmenő síkok bármelyikéhez található vele párhuzamos sík, amely a korlátos, konvex halmazt két egyenlő térfogatú részre vágja. Egy ilyen sík és a  $180^\circ$ -os elforgatottja egybeesik. (Mindig csak olyan síkokat tekintünk, amelyek az adott egyenesre illeszkedő síksor valamelyik elemével párhuzamosak.) A  $[0^\circ; 180^\circ]$  intervallumban lesz olyan szög, amellyel egy, a térfogatot felező síkot elforgatva, az elforgatott sík a felszínét is felezi. Végül meg kell mutatni, hogy a felszín a forgatás szögének folytonos függvénye.

Bogdán Zoltán