


A **Gy. 3213.** gyakorlatban egy konvex ötszög területét kellett megfelezni kerületének egy kijelölt pontján átmenő egyenessel (megoldása megjelent a KöMaL 1999/3. számában). Az 1999/6. számban kitűzött **B. 3295.** feladatban az volt a kérdés, hogy a háromszög súlypontján átmenő egyenesek közül melyek felezik a háromszög területét (megoldása a szám 96. oldalán). Aki megoldotta ezeket a feladatokat, rájöhetett: A területfelező nem okvetlenül súlyvonal, a súlyvonal pedig nem mindig területfelező. A második feladatban súlyponton átmenő egyenesekről van szó, amelyek fizikai értelmezés szerint mind súlyvonalak, a matematikai fogalomalkotás szerint viszont a háromszögeknek csak három súlyvonala van. A háromszögon túl – pl. egy ötszög esetén – a matematikában alig-alig esik szó súlyvonalról. Az említett két feladat jó alkalom, hogy a súlypontról beszéljünk. Ezt az is indokolja, hogy a dolgozatok javítása közben észrevehetjük: a súlyvonal és a súlypont fogalma a megoldókban kialakulatlan.

A súlypont fizikai fogalom, amelyet pl. úgy értelmezhetünk, hogy a súlyponton alátámasztott test egyensúlyban van. Másrészt a súlypont fogalmát a matematikában is használjuk (pl. egy háromszög súlypontja vagy egy pontrendszer súlypontja). A közös nevet az indokolja, hogy *bizonyos* anyageloszlások (homogén háromszöglemez vagy egyenlő tömegű pontszerű testek) esetén a matematikai értelemben vett súlypont megegyezik a fizikaival. Azonban, mint az alábbiakból kiderül, ez nincs mindig így!

1. *Pontrendszer súlypontja*

a) Egyetlen pont esetén a súlypont azonos a ponttal.

b) Az  $A, B$  pontok rendszerének súlypontja az  $AB$  szakasznak az az  $S$  pontja, amelyre  $\vec{SA} + \vec{SB} = \mathbf{0}$ , tehát  $S$  az  $AB$  felezőpontja.



1. ábra

c) Az  $A, B, C$  ponthármas súlypontja az az  $S$  pont, amelyre  $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} = \mathbf{0}$ , ami az 1. ábra jelöléseivel:  $\mathbf{a} - \mathbf{s} + \mathbf{b} - \mathbf{s} + \mathbf{c} - \mathbf{s} = \mathbf{0}$ , és így

$$\mathbf{s} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{3}.$$

d) Teljesen hasonlóan kapjuk, hogy az  $A_1, A_2, \dots, A_n$  pontrendszer súlypontjának helyvektora

$$(1) \quad \mathbf{s} = \frac{\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \dots + \mathbf{a}_n}{n},$$

ahol  $\mathbf{a}_i$  az  $A_i$  helyvektora.

2. *Súlyozott pontrendszer súlypontja*

Ha az 1.d) esetet úgy képzeljük, hogy az  $A_1, A_2, \dots, A_n$  pontokban  $m_1, m_2, \dots, m_n$  (esetleg nem pozitív) súlyok vannak, akkor a rendszer  $S$  súlypontjára

$$m_1 \cdot \vec{SA}_1 + m_2 \cdot \vec{SA}_2 + \dots + m_n \cdot \vec{SA}_n = \mathbf{0}.$$

Ezt a pontok helyvektorával kifejezve:

$$m_1(\mathbf{a}_1 - \mathbf{s}) + m_2(\mathbf{a}_2 - \mathbf{s}) + \dots + m_n(\mathbf{a}_n - \mathbf{s}) = \mathbf{0},$$

amiből

$$(2) \quad \mathbf{s} = \frac{m_1 \mathbf{a}_1 + m_2 \mathbf{a}_2 + \dots + m_n \mathbf{a}_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}, \quad (m_1 + m_2 + \dots + m_n \neq 0).$$

(2)-ből látjuk, hogy a közönséges pontrendszert csupa azonos súllyal súlyozott pontrendszernek is tekinthetjük.<sup>1</sup>

Súlyvonalnak hívunk ezután minden olyan egyenest, amelyik a pontrendszer súlypontján áthalad.

Bizonyítás nélkül megemlítünk két egyszerű tételt:

<sup>1</sup>Bár pontrendszer súlypontját annak helyvektorával adtuk meg, könnyen ellenőrizhető, hogy maga a súlypont nem függ az origó megválasztásától. (A szerk.)

**1. tétel.** Ha egy súlyozott pontrendszert két, közös pont nélküli halmazra bontunk, és az egyiknek a súlypontja  $S_1$ , a benne lévő pontok súlyainak összege  $M_1$ , ugyanezek az adatok a másik halmaznál  $S_2$  és  $M_2$ , akkor a pontrendszer  $S$  súlypontja az  $S_1S_2$  egyenesen van, és  $S_1S : SS_2 = M_2 : M_1$  ( $S_1S$  és  $SS_2$  irányított szakaszok).

**2. tétel.** Ha egy súlyozott pontrendszer súlyai nem negatívak, akkor a súlypont benne van a pontrendszer konvex burkában.


Mindkét tétel (2)-ből levezethető.

Az alábbiakban nemcsak véges pontrendszerek súlypontját vizsgáljuk. Ehhez az 1. tétel értelemszerű kiterjesztésére van szükség, pontosabban arra, hogy ha egy ponthalmazt két részhalmazra osztunk, akkor a részhalmazok súlypontján átmenő egyenes súlyvonal, tehát átmegy a súlyponton.

3. A háromszög súlypontja

a) A három pontból álló pontrendszer súlypontjának helyvektora

$$\mathbf{s} = \frac{\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}}{3}.$$




2. ábra

b) Homogén anyageloszlású háromszöglemez súlypontja

Ha egy lemeznek nincsen legalább két szimmetriatengelye, a súlypont matematikai meghatározása általában nehéz feladat, integrálszámítással történhet. A 2. ábrán – az integrálszámítást megkerülve – azt láthatjuk, hogyan határozta meg Arkhimédész a háromszöglemez súlypontját. Ő úgy okoskodott, hogy ha a háromszöget az  $AB$  oldalával párhuzamos keskeny sávokra bontja, akkor mindegyik sáv súlypontja – a szimmetria miatt – rajta lesz a  $CF$  egyenesen ( $F$  az  $AB$  szakasz felezőpontja), ezért  $CF$  egy súlyvonal. Ugyanígy kaphatunk egy másik súlyvonalat, és a két súlyvonal metszéspontja a súlypont. Tehát a háromszöglemez súlypontja ugyanaz lesz, mint a három csúcsból álló pontrendszeré.

c) Vékony, állandó keresztmetszetű és homogén drótból készült egyenlő szárú háromszög alakú keret súlypontja




3. ábra

A 3. ábrán 1 cm hosszú drót tömege legyen 1 g. Az  $ACB$  „törött” drótszakaszt  $AC$  és  $CB$  darabokból összetéve a súlypont az egyenlő tömegű  $AC$ , illetve  $BC$  részek  $F$ ,  $G$  súlypontját (felezőpontját) összekötő szakasz  $H$  felezőpontja és összesen 4 g tömeget képvisel. Az  $AB$  szakasz 1 g tömege pedig a drótszakasz  $E$  súlypontjába (felezőpontjába) vonható össze. A keret súlypontja ezután a  $HE$  szakasz  $H$ -hoz közelebbi ötödölő pontja. Itt felhasználtuk azt a tényt, hogy egy testet két részre vágva, de a részeket helyben hagyva, a részek súlypontjait összekötő egyenes a test egy súlyvonala. Felhasználtuk továbbá, hogy (2)-ből az  $n = 2$  esetben az következik, hogy két pontszerű tömeg súlypontja a pontok összekötő szakaszát a tömegekkel fordított arányban osztja.


4. A négyszög súlypontja

a) Húrtrapézot alkotó pontnégyes súlypontja

A 4. ábrán  $F_1$ , illetve  $F_2$  az alapok felezőpontjai. Az  $S$  súlypont az  $F_1F_2$  szakasz felezőpontja.



4. ábra



5. ábra

b) Húrtrapéz alakú homogén lemez súlypontja

Az 5. ábrán  $F_1F_2$  szimmetriatengely, tehát súlyvonal. Az  $ACD$  háromszög  $S_1$  és az  $ABC$  háromszög  $S_2$  súlypontját összekötve egy másik súlyvonalat kapunk. A két súlyvonal  $S$  metszéspontja a súlypont.

Az a) és b) eset azt mutatja, hogy négyszögek esetén a négy csúcs pontrendszerének súlypontja különbözhet a négyszöglemez súlypontjától.


c) Tetszőleges pontnégyes súlypontja

Ha az  $F_i$  pontok ( $i = 1, 2, \dots, 6$ ) a 6. ábrán látható megfelelő szakaszok felezőpontjai, akkor például  $F_1F_3$  felezőpontjaként kaphatjuk az  $S$  súlypontot. Ha a csúcsokba mutató vektorokat a megfelelő kisbetűvel jelöljük, akkor  $S$ -nek az  $s$  helyvektora.


$$(3) \quad \mathbf{s} = \frac{\frac{\mathbf{a}+\mathbf{b}}{2} + \frac{\mathbf{c}+\mathbf{d}}{2}}{2} = \frac{\frac{\mathbf{a}+\mathbf{d}}{2} + \frac{\mathbf{b}+\mathbf{c}}{2}}{2} = \frac{\frac{\mathbf{a}+\mathbf{c}}{2} + \frac{\mathbf{b}+\mathbf{d}}{2}}{2}.$$

Ha a négy pont nincs egy síkban, akkor egy tetraédert határoz meg. (3)-ból következik, hogy a tetraéder szemközti élének felezőpontját összekötő szakaszok egy ponton mennek át, ez a pont a pontrendszer súlypontja, és felezi a szóbanforgó szakaszokat.

Bebizonyítható, hogy a homogén anyageloszlású tetraéder alakú test súlypontja megkapható az előbbi módon (6. ábra).



6. ábra



7. ábra

d) Homogén anyageloszlású (sík)négyszöglemez súlypontja

A 7. ábrán az  $ABCD$  minden oldalát három egyenlő részre osztottuk. Az osztópontokat az ábra szerint összekötve a  $PQRT$  paralelogrammát, az úgynevezett *Wittenbauer*-paralelogrammát kapjuk.  $S_1$  az  $ABD$  háromszög,  $S_3$

pedig a  $BCD$  háromszög súlypontja, ezért  $S_1S_3$  a négyszög egy súlyvonala. Hasonlóan súlyvonal  $S_2S_4$  is, ezért  $S$  a négyszög súlypontja. Mivel  $S_1S_3$ , illetve  $S_2S_4$  illeszkednek a Wittenbauer-paralelogramma középvonalaira,  $S$  ennek a paralelogrammának a középpontja.

5. Az elmondottak alapján *tetszőleges (súlyozott) pontrendszer, vagy homogén sokszöglemez súlypontja* megszerkeszthető. A tetraéderrel kapcsolatos tétel alapján bizonyos testek súlypontja is meghatározható.

**Bogdán Zoltán**