

1. Az a, b, c, x, y, z valós számokra $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$ és $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$. Mennyi $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ értéke?

Megoldás. $a, b, c, x, y, z \neq 0$. Alkalmazzuk pl. az $u = \frac{x}{a}$, $v = \frac{y}{b}$, $w = \frac{z}{c}$ helyettesítést; ekkor a két egyenlet $u + v + w = 1$ és $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} + \frac{1}{w} = 0$ alakba írható, s $u^2 + v^2 + w^2$ értéke a kérdés. $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} + \frac{1}{w} = \frac{uv + vw + uw}{uvw} = 0$ miatt $uv + vw + uw = 0$; az $(u + v + w)^2 = u^2 + v^2 + w^2 + 2(uv + vw + uw)$ átalakításból kapjuk, hogy $u^2 + v^2 + w^2 = 1$.

Megjegyzés. Érdekes megvizsgálni, léteznek-e egyáltalán a feladat feltételeinek megfelelő u, v, w számok.

Mivel $u + v = 1 - w$ és $uv = -w(u + v) = -w(1 - w) = w^2 - w$, így a $t^2 + (w - 1)t + w^2 - w = 0$ egyenlet két gyöke $t_1 = u$ és $t_2 = v$. (A gyökök és együtthatók közötti összefüggések alapján.) Az egyenlet diszkriminánsa

$$D = (w - 1)^2 - 4(w^2 - w) = (w - 1)(-3w - 1) = -3(w - 1) \left(w + \frac{1}{3} \right); \quad -\frac{1}{3} \leq w \leq 1$$

esetén $D \geq 0$, tehát találhatóak megfelelő u, v számok. Például $w = -\frac{1}{3}$, $u = v = \frac{2}{3}$ megfelelő.

2. Oldjuk meg a $4 \cdot \log_x 2 = 7 + 2 \cdot \log_2 x$ egyenletet a valós számok halmazán!

Megoldás. Az egyenlet alaphalmaz $x > 0$, $x \neq 1$. Áttérve azonos alapú logaritmusokra: $4 \cdot \frac{\log_2 2}{\log_2 x} = 7 + 2 \cdot \log_2 x$.

Az $a = \log_2 x$ helyettesítéssel egyenletünk $\frac{4}{a} = 7 + 2a$ alakú lesz, melyet átalakítva a $2a^2 + 7a - 4 = 0$ másodfokú egyenletet kapjuk. $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = -4$; visszahelyettesítve x -re $x_1 = \sqrt{2}$, $x_2 = 2^{-4} = \frac{1}{16}$. Mindkét gyök kielégíti az eredeti egyenletet.


3. Az $x^3 + x^2 - 14x + m = 0$ egyenlet egyik gyöke 3. Határozzuk meg az m valós paraméter és a másik két gyök értékét!

Megoldás. Az $x_1 = 3$ helyettesítés után $3^3 + 3^2 - 14 \cdot 3 + m = 0$, innen $m = 6$. Az $x - 3$ gyöktényezőt kiemelve $x^3 + x^2 - 14x + 6 = (x - 3)(x^2 + 4x - 2) = 0$. A második tényező zérushelyei $x_2 = -2 + \sqrt{6}$, ill. $x_3 = -2 - \sqrt{6}$.

4. Az ABC háromszögben a B csúsból húzott magasságvonal az AC egyenest a D pontban, a C -ből húzott magasságvonal az AB egyenest az E pontban metszi. Mekkora a DE szakasz hossza, ha $\angle CAB = 70^\circ$, $AB = 12$ cm, $AC = 10$ cm?

Megoldás. Jelöljük az adott háromszög A, B, C csúcsnál lévő szögeit hagyományosan α, β, γ -val, az AB, BC, AC oldalak hosszát c, a, b -vel; így $\alpha = 70^\circ$, $c = 12$ cm, $b = 10$ cm.

Készítsünk ábrát!



Észrevehetjük, hogy $BCDE$ húrnégyszög, hiszen a BC oldal E -ből és D -ből is 90° alatt látszik. (A négyszög köré írt kör középpontja a BC oldal felezőpontja.) A húrnégyszögek szemközti szögeinek összege 180° , ezért $\angle BED = 180^\circ - \gamma$, s így $\angle DEA = \gamma$ (ábra). Hasonlóan kapjuk, hogy $\angle EDA = \beta$. Az ABC és ADE háromszögek tehát hasonlóak, mert szögeik megegyeznek. A megfelelő oldalak arányát felírva $\frac{DE}{BC} = \frac{AE}{AC}$, s mivel az AEC derékszögű háromszögből

$$\frac{AE}{AC} = \cos \alpha, \quad DE = BC \cdot \cos \alpha = a \cdot \cos \alpha.$$

A háromszög $BC = a$ oldalát a koszinusz-tétel felhasználásával számíthatjuk ki:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \alpha = 100 + 144 - 2 \cdot 10 \cdot 12 \cdot \cos 70^\circ,$$

$a \approx 12,72$ cm, s innen $DE = a \cdot \cos \alpha \approx 4,35$ cm.

Megjegyzés. A három magasságvonal talppontja (ábránkon kettőt jelöltünk: D és E) meghatározza az ún. talpponti háromszöget. Meggondolásainkból következik, hogy hegyesszögű háromszögben a talpponti háromszög kerülete $a \cdot \cos \alpha + b \cdot \cos \beta + c \cdot \cos \gamma$.

5. Oldjuk meg a $\cos(2x) - 3 \cos x + 2 \leq 0$ egyenlőtlenséget a valós számok halmazán!

Megoldás. Felhasználva a $\cos 2x$ -re vonatkozó addíciós tételt és a trigonometria alapegyenletét: $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2\cos^2 x - 1$. Visszahelyettesítés után az eredeti egyenlőtlenség $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 \leq 0$ alakú lesz, s ez a $\cos x$ változóban másodfokú. A két zérushely $(\cos x)_1 = 1$, $(\cos x)_2 = \frac{1}{2}$; a bal oldalt eszerint szorzattá alakítva kapjuk, hogy $2(\cos x - 1) \left(\cos x - \frac{1}{2} \right) \leq 0$. Ennek megoldása $\frac{1}{2} \leq \cos x \leq 1$. A $\cos x \leq 1$ egyenlőtlenség minden valós számra igaz, $\frac{1}{2} \leq \cos x$ pedig akkor teljesül, ha $-\frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi$, ahol k tetszőleges egész szám. Ez tehát a feladat megoldása.


6. Legfeljebb hány különböző pozitív prímszám adható meg úgy, hogy közülük bármely három összege is prímszám legyen?

Megoldás. Némi próbálkozás után találhatunk négy ilyen számot (pl. a 7, 11, 13, 23 vagy 19, 23, 37, 41 számnégyes megfelelő), de ötöt nem sikerül. Megmutatjuk, hogy öt egész szám közül mindig kiválasztható három, melyek összege osztható 3-mal (s mivel összegük 3-nál nagyobb, nem prím).

Az egész számok 3-mal osztva 0, 1 vagy 2 maradékot adnak. Ha azonos maradékosztályból választunk ki három számot, ezek összege osztható lesz 3-mal, így egy-egy maradékosztályból legfeljebb két számot választhatunk ki. Ugyanakkor három különböző maradékú szám összege is osztható 3-mal, ezért csak két maradékosztályból választhatunk ki számokat.

Azt kaptuk, hogy legfeljebb két maradékosztályból, legfeljebb két-két számot, vagyis összesen legfeljebb négy számot választhatunk ki, ha azt akarjuk, hogy közülük semelyik három összege se legyen osztható 3-mal; a feladat feltételeinek megfelelően tehát legfeljebb 4 szám adható meg.

7. Az R sugarú gömbbe írt egyenes körhengerek közül melyik henger térfogata maximális? Mekkora a térfogat lehető legnagyobb értéke?



Megoldás. A beírt henger térfogata csak akkor lehet maximális, ha tengelye átmegy a gömb középpontján, s alap- és fedőkörének kerülete a gömb felületén van. Jelöljük a henger alapkörének sugarát r -rel, magasságát m -mel, s tekintsük a tengelyen átmenő síkmetszetet!

A $2R$, $2r$, m oldalú derékszögű háromszögből kapjuk a $4R^2 = 4r^2 + m^2$ összefüggést, s ezen feltétel mellett kell $V = r^2\pi m$ maximumát meghatároznunk. r^2 -et kiküszöbölve $4V = (4R^2 - m^2)\pi m$. Emeljük négyzetre az egyenletet, hogy a számtani-mértani közép közötti egyenlőtlenséget alkalmazni tudjuk. (Szabad négyzetre emelni: a tényezők pozitívak, s $(4V)^2$ ugyanott lesz maximális, ahol $4V$.)

$$16V^2 = (4R^2 - m^2)^2 \pi^2 m^2, \quad \frac{32V^2}{\pi^2} = (4R^2 - m^2)^2 \cdot 2m^2.$$

Ha most írjuk föl a $(4R^2 - m^2)$, $(4R^2 - m^2)$, $2m^2$ pozitív számokra a számtani-mértani közép közötti egyenlőtlenséget, akkor a számtani közép állandó:

$$(1) \quad \sqrt[3]{(4R^2 - m^2)(4R^2 - m^2) \cdot 2m^2} \leq \frac{(4R^2 - m^2) + (4R^2 - m^2) + 2m^2}{3},$$

ahonnan $\sqrt[3]{\frac{32V^2}{\pi^2}} \leq \frac{8R^2}{3}$, $\frac{32V^2}{\pi^2} \leq \frac{512R^6}{27}$, $V^2 \leq \frac{16\pi^2 R^6}{27}$, $V \leq \frac{4\pi R^3}{3\sqrt{3}}$.

A henger térfogata legfeljebb $\frac{4\pi R^3}{3\sqrt{3}}$ lehet (ez a gömb térfogatának $\frac{1}{\sqrt{3}}$ része). A lehető legnagyobb érték akkor érhető el, ha az (1) egyenlőtlenség jobb oldalán szereplő tagok egyenlőek, vagyis $4R^2 - m^2 = 2m^2$. Mivel $4R^2 = 4r^2 + m^2$, innen $m = \frac{2}{\sqrt{3}}R$ és $r = \sqrt{\frac{2}{3}}R$.

8. Adott az $y = x^2$ parabola és az $A(9, 8)$ pont. A parabola mely P pontjába húzott érintőjére igaz, hogy ez az érintő merőleges az AP egyenesre?

Megoldás. Legyen a P futópont koordinátája $(p; p^2)$, a P pontba húzott érintő meredeksége m . Ekkor az érintő egyenlete $e: y - p^2 = m(x - p)$. Mivel e érinti a parabolát, az egyenes és a parabola közös pontjait adó $y = x^2$, $y - p^2 = m(x - p)$ egyenletrendszernek pontosan egy megoldása van. (Az y tengellyel párhuzamos egyenest kizártuk.)

Az egyenletrendszerből $x^2 - mx - p^2 + pm = 0$ egyenlet adódik x -re. Egy megoldást akkor kaphatunk, ha a diszkrimináns nulla: $m^2 + 4p^2 - 4pm = 0$, $(m - 2p)^2 = 0$, vagyis $m = 2p$.

Tehát az $y = x^2$ parabola tetszőleges $P(p; p^2)$ pontjába húzott érintő meredeksége $2p$.

Az érintő egy irányvektora $\mathbf{v}(1; 2p)$, ez a feladat szerint merőleges az \overrightarrow{AP} vektorra. $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{P} - \overrightarrow{A} = (p; p^2) - (9; 8) = (p - 9; p^2 - 8)$. Két vektor merőlegességét legegyszerűbben a skalárszorzatuk segítségével írhatjuk fel: $\mathbf{v} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$.

$$\mathbf{v} \cdot \overrightarrow{AP} = (1; 2p) \cdot (p - 9; p^2 - 8) = p - 9 + 2p^3 - 16p,$$

átrendezés után a $2p^3 - 15p - 9 = 0$ harmadfokú egyenletet kapjuk.

Észrevehetjük, hogy $p = 3$ gyöke az egyenletnek. A $(p - 3)$ gyöktényezőt kiemelve $2p^3 - 15p - 9 = (p - 3)(2p^2 + 6p + 3)$.

A $2p^2 + 6p + 3 = 0$ egyenlet további gyökei $p_1 = \frac{-3 + \sqrt{3}}{2}$ ($\approx -0,63$) és $p_2 = \frac{-3 - \sqrt{3}}{2}$ ($\approx -2,37$).

Tehát három megfelelő P pontot kaptunk: $P_1(3; 9)$, $P_2(-0,63; 0,40)$, $P_3(-2,37; 6,00)$.