

1. Egy derékszögű háromszögben a befogók összege 10,5 egység, a beírható kör sugara  $\varrho = 1,5$  egység. Számítsuk ki a derékszögű háromszög

- körülírt körének sugarát;
- területét;
- a hozzáírható körök sugarát.

**Megoldás.** Legyen a derékszögű háromszög két befogója  $a$  és  $b$ , az átfogója  $c = 2r$ , ahol  $r$  a körülírt kör sugara. Egy külső pontból a körhöz húzható érintőszakaszok hosszának egyenlőségét felhasználva

a)  $2r = c = a - \varrho + b - \varrho = 10,5 - 3 = 7,5$ ;  $r = 3,75$  egység.

b) A háromszög területe  $T = \frac{1}{2}ab$ . Mivel  $c^2 = a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$ , azért  $7,5^2 = 10,5^2 - 4T$ ;  $T = 13,5$  terület egység.

c) A háromszöghöz írható körök sugara rendre  $\varrho_a = \frac{T}{s-a}$ ,  $\varrho_b = \frac{T}{s-b}$ ,  $\varrho_c = \frac{T}{s-c}$ , ahol  $s$  a félkerület hossza. Tudjuk, hogy  $ab = 2T = 27$ ;  $a + b = 10,5$ , amiből  $a = 4,5$  és  $b = 6$ , vagy fordítva. Mivel  $2s = 10,5 + 7,5$ , azért  $s = 9$  egység, ezért  $\varrho_a = 3$ ,  $\varrho_b = 4,5$  és  $\varrho_c = 9$  egység.

2. Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \sqrt[3]{x + \frac{x}{x^3 - 1}} = x \cdot \sqrt[3]{\frac{x}{x^3 - 1}}; & \text{b)} \quad & \frac{\log_x \frac{9}{4}}{\log_x \frac{27}{8}} = \frac{\frac{9}{4}}{\frac{27}{8}}; \\ \text{c)} \quad & \text{tg}(x + \pi) + \text{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = 2 \text{tg} x. \end{aligned}$$

**Megoldás.** a) Az egyenlet  $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$  halmazon értelmezett és minden ilyen szám megoldás, mert azonos átalakításokkal mindkét oldalon álló kifejezés  $\sqrt[3]{\frac{x^4}{x^3 - 1}}$ -gyel azonos.

b) Az egyenlet minden  $x > 0$ ,  $x \neq 1$  valós számra értelmezett és minden ilyen szám megoldása az egyenletnek, hiszen  $\frac{\log_x \frac{9}{4}}{\log_x \frac{27}{8}} = \log_{\left(\frac{3}{2}\right)^3} \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{2}{3}$  és  $\frac{\frac{9}{4}}{\frac{27}{8}} = \frac{2}{3}$ .

c) Az egyenlet az  $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + n\pi; n \in \mathbb{Z}\right\}$  halmazon értelmezett és itt azonosság, mert azonos átalakításokkal

$$\text{tg}(x + \pi) + \text{ctg}\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) = \text{tg} x + \text{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 2 \text{tg} x.$$

3. Oldjuk meg a következő egyenletrendszert a valós számpárok halmazán, ahol a valós paraméter:

$$\begin{aligned} x - y &= 1 - a - a^2; \\ \log_x(2x^2 + 4x - y + 1) &= 2. \end{aligned}$$

**Megoldás.** A második kifejezés akkor értelmezett, ha

$$x > 0, \quad x \neq 1 \quad \text{és} \quad 2x^2 + 4x - y + 1 > 0.$$

Az első egyenletből  $y = x + a^2 + a - 1$ , a másodikból  $2x^2 + 4x - y + 1 = x^2$ ,  $y = x^2 + 4x + 1$ , ahonnan

$$x^2 + 3x - a^2 - a + 2 = 0, \quad x_1 = a - 1, \quad x_2 = -a - 2.$$

Ha  $x_1 = a - 1$ , akkor  $a - 1 > 0$  és  $a - 1 \neq 1$ , tehát  $a > 1$  és  $a \neq 2$ .

Ekkor  $y_1 = a^2 + 2a - 2$ , és ez a számpár valóban megoldás, hiszen ekkor

$$2x^2 + 4x - y + 1 = (a - 1)^2 > 0.$$

Ha  $x_2 = -a - 2$ , akkor  $-a - 2 > 0$  és  $-a - 2 \neq 1$ , tehát  $a < -2$  és  $a \neq -3$ . Ekkor  $y_2 = a^2 - 3$ , és ez a számpár is megoldás, hiszen ekkor

$$2x^2 + 4x - y + 1 = (a + 2)^2 > 0.$$

4. Az  $ABCD$  húrtrapéz ( $AB \parallel DC$ ) rövidebb párhuzamos oldalának hossza,  $DC = 13$  egység, magassága,  $m = CC_1 = 15,6$  egység ( $C_1$  a  $C$  pont merőleges vetülete az  $AB$  oldalán), az  $AC$  átló merőleges a  $BC$  oldalra. Számítsuk ki a hosszabb párhuzamos oldalt ( $AB$ ), a szárak ( $BC$ ) és az átlók ( $AC$ ) hosszát.

**Megoldás.** A feladat szövegében adott jelölés szerint legyen  $C_1B = x$ , ekkor  $AC_1 = x + 13$ . Az  $ACB$  derékszögű háromszögben a magasságtétel alkalmazásával  $x(x + 13) = 15,6^2$ , ahonnan  $x = 10,4$  egység, tehát  $AB = 33,8$  egység. A Pitagorasz-tétel alkalmazásával  $BC = DA = \sqrt{351,52} \approx 18,75$  egység, az átlók hossza  $AC = BD \approx 28,12$  egység.

5. Az  $y = x^2 + x + 1$  egyenletű parabola melyik pontja van a legközelebb az  $y = 2x - 2$  egyenletű egyeneshez? Mennyi ez a legkisebb távolság?

**Megoldás.** A parabolának az a  $P$  pontja van legközelebb az adott egyeneshez, amelyben az adott egyenessel párhuzamos  $y = 2x + b$  egyenletű egyenes érinti a parabolát. Az  $y = 2x + b$  egyenletű egyenes pontosan akkor érinti az  $y = x^2 + x + 1$  egyenletű parabolát, ha az  $x^2 + x + 1 = 2x + b$  egyenlet diszkriminánsa nulla:  $x^2 - x + 1 - b = 0$ ,  $D = 1 - 4(1 - b) = 0$ ,  $b = \frac{3}{4}$ . Ekkor  $x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$ ,  $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$ , az érintési pont  $P\left(\frac{1}{2}; \frac{7}{4}\right)$ . A legkisebb távolság:  $\frac{11}{4\sqrt{5}}$  egység.

6. Az  $ABC$  háromszögben  $AC = 8$ ,  $BC = 24$ , a  $C$  csúcsból induló belső szögfelezőszakasz,  $CC_1 = 6\sqrt{2 - \sqrt{2}}$  egység. Számítsuk ki az  $ACB$  szöget, a háromszög területét és az  $AB$  oldal hosszát.

**Megoldás.** Legyen az  $ACB \sphericalangle = 2\gamma$ . Az  $A$  ponton át a  $CC_1$ -gyel párhuzamos egyenes a  $BC$  egyenest a  $D$  pontban metszi. Mivel

$$DAC \sphericalangle = ACC_1 \sphericalangle = \gamma \quad \text{és} \quad ADC \sphericalangle = C_1CB \sphericalangle = \gamma,$$

azért  $DC = AC = 8$  egység és  $AD = 16 \cos \gamma$ .  $DAB \triangle \sim CC_1B \triangle$ , tehát

$$\frac{16 \cos \gamma}{6\sqrt{2 - \sqrt{2}}} = \frac{8 + 24}{24}, \quad \cos \gamma = \frac{1}{2} \sqrt{2 - \sqrt{2}}, \quad \gamma = 67,5^\circ, \quad 2\gamma = 135^\circ.$$

A háromszög területe  $T = \frac{8 \cdot 24 \cdot \sin 135^\circ}{2} = 48\sqrt{2}$  területegység,  $AB^2 = 8^2 + 24^2 + 2 \cdot 8 \cdot 24 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $AB \approx 30,19$  egység.

7. Tekintsük az  $x \mapsto \frac{x}{x^2 + x + 1}$ ,  $x \in \mathbb{R}$  függvényt. Határozzuk meg a függvény értékkészletét. Mely  $x$  helyen veszi fel a függvény a legkisebb, illetve a legnagyobb értékét?

**Megoldás.** A függvény azokat a  $k \in \mathbb{R}$  értékeket veszi fel, amelyekre az

$$\frac{x}{x^2 + x + 1} = k$$

egyenletnek van valós megoldása.  $x^2 + x + 1 > 0$  minden valós számra, hiszen

$$x^2 + x + 1 \equiv \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}.$$

A  $kx^2 + (k - 1)x + k = 0$  egyenletnek pontosan akkor van valós megoldása, ha az egyenlet diszkriminánsa

$$D = (k - 1)^2 - 4k^2 \geq 0.$$

Ez pontosan akkor teljesül, ha  $-1 \leq k \leq \frac{1}{3}$ . A függvény értékkészlete a  $\left[-1; \frac{1}{3}\right]$  intervallum. A legkisebb értékét

(ez  $-1$ ) az  $x_1 = -1$  helyen, a legnagyobb értékét (ez  $\frac{1}{3}$ ) az  $x_2 = 1$  helyen veszi fel.

8. Legyen az  $(a_n)$  számtani sorozat  $n$ . tagja  $a_n$ ,  $k$ . tagja  $a_k$ , az első  $n$  tag összege  $S_n$ , az első  $k$  tag összege  $S_k$ , valamint  $a_1 \neq 0$ ,  $n \neq 1$ ,  $k \neq 1$  és  $n \neq k$ .

Igazoljuk, hogy

$$(1) \quad \frac{S_n}{S_k} = \frac{n^2}{k^2}$$

akkor és csak akkor teljesül, ha

$$(2) \quad \frac{a_n}{a_k} = \frac{2n - 1}{2k - 1}.$$

**Megoldás.** Azt kell belátni, hogy ha (1) teljesül, akkor (2) is, és fordítva, ha (2) teljesül, akkor (1) is.

Ha a sorozatban

$$\frac{\frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1)d)}{\frac{k}{2}(2a_1 + (k - 1)d)} = \frac{n^2}{k^2},$$

akkor átalakításokkal  $2a_1(k - n) = d(k - n)$ , s mivel  $k \neq n$ ,  $d = 2a_1$ . Így

$$\frac{a_n}{a_k} = \frac{a_1 + (n - 1) \cdot 2a_1}{a_1 + (k - 1) \cdot 2a_1} = \frac{2n - 1}{2k - 1},$$

hiszen  $a_1 \neq 0$ . Ha pedig  $\frac{a_1 + (n-1)d}{a_1 + (k-1)d} = \frac{2n-1}{2k-1}$ , akkor azonos átalakításokkal  $d = 2a_1$  adódik ( $k \neq n$ ), tehát valóban

$$\frac{S_n}{S_k} = \frac{\frac{n}{2}(2a_1 + (n-1) \cdot 2a_1)}{\frac{k}{2}(2a_1 + (k-1) \cdot 2a_1)} = \frac{n^2}{k^2}.$$