

Bevezető

2015 májusában, egy kellemesen napsütötte hétvégén meglátogattam a Cambridge-i Egyetem híres matematikai intézetét. Az épületkomplexum leginkább egy marsbéli űrbázist idézett fel bennem, aminek élesen ellentmondani látszott egy csillogó görbét rajzoló csiga és egy kerítésoszlopon érdeklődve szemlélődő mókus. Amint körülsétáltam az épületeket, az egyik süllyesztett szint üvegajtáján keresztül két színes plakát ragadta meg a figyelmem.

Óriások és negatív számozású kocka. A bal oldali plakát kérdéseit kigyűjtöttem alább:

- Melyik nagyobb: 9^{10} , vagy 10^9 ?
- Számológéppel eldönthető-e, melyik nagyobb: 99^{100} , vagy 100^{99} ?
- Döntsük el, hogy 999^{1000} , vagy 1000^{999} a nagyobb.

Amint hazaértem smallfieldi szobámba, a kíváncsiság nem hagyott, elkezdtem tesztelni a Win10 számológépét. A kalkulátor az 1. ábrán látható válaszokat adta. Az első kérdésben szereplő mennyiségeket – egész aritmetikát használva – gond nélkül kiértékelte. A második és harmadik kérdésben szereplő hatványok kiszámításához normálalakot használt és amikor a 10000^{9999} hatványt kérdeztem, túlsordulási hibával leállt. Végül is mindhárom kérdésre választ találtam – $9^{10} > 10^9$, $99^{100} > 100^{99}$ és $999^{1000} > 1000^{999}$ –, úgyhogy hátradőlhettem volna elégedetten székeemben.

$9^{10} =$ 3486784401	$99^{100} =$ 3,66032341273229504930 61602657252e+199	$999^{1000} =$ 3,67695424770964044626 80613922046e+2999	10000^{9999} Túlsordulás
$10^9 =$ 1000000000	$100^{99} =$ 1,e+198	$1000^{999} =$ 1,e+2997	

1. ábra. Számológépem válaszai

Nem ez történt. Felrémlt egy klasszikus figyelmeztető példa a számelméletből. Az $x^2 + x + 41$ polinom $x = 0, 1, 2, \dots, 39$ esetén prímszámot eredményez, azonban $40^2 + 40 + 41 = 40 \cdot 41 + 41 = 41^2$, ami nem prím. Szóval attól, hogy tudok valamit az $N = 1, 2, 3$ esetekre, nem lehetek biztos benne, hogy a felismert törvény megmarad nagyobb hatványkitevőkre is. Ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel érdemben tudjunk foglalkozni, meg kell alkotnunk a probléma általános matematikai formalizmusát és az eddigi tapasztalatainknak megfelelő sejtést kell bebizonyítanunk. Az általános probléma formálisan a következő:

Legyen N pozitív egész és $A_N = (10^N - 1)^{10^N}$, valamint $B_N = (10^N)^{10^N - 1}$. Melyik nagyobb az A_N és B_N számok közül? Volt eredetileg három kérdésünk, most pedig végtelen sok lett hirtelen. A matematikai bizonyítás ereje éppen ebben rejlik: egyetlen bizonyítás keretében képes megválaszolni – ebben az esetben – megszámlálhatóan végtelen sok kérdést. Mivel ismerjük a választ az $N = 1, 2, 3$ speciális esetekben, indokoltnak tűnik azt sejtteni, hogy A_N általában is nagyobb, mint B_N , továbbá vegyük észre, hogy $A_1 > 3B_1$, $A_2 > 30B_2$ és $A_3 > 300B_3$. Most, hogy megalkottuk a pontos matematikai modellt a problémához, az maradt hátra, hogy bizonyítást találjunk sejtésünkre, ami a munka nagyobb, nehezebb és érdekesebb része. A fent megfogalmazott kérdés inspirált egy nagyobb lélegzetvételi munkát, mely teljes egészében a BCME9 2018 (British Congress of Mathematics Education, Warwick University, 3–6 April 2018, <https://www.bcme.org.uk/>) konferencián hangzott el. Ezen előadásom anyagából választottam két fejezetet, amik ezen írás gerincét alkotják.

A számjegyek száma

Össze szeretnénk hasonlítani két természetes számot nagyságrendileg. Az egyik legegyszerűbb mód az, ha összehasonlítjuk a számjegyeik számát valamilyen előre lerögzített számrendszerben. Jelen esetben decimális rendszert fogunk használni és a tömörebb leírás érdekében bevezetjük a számjegyek számát megadó függvényt (jelölése $\#$). A formális definíció az alábbi: $\#: \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}$, $\#(n) = n$ számjegyeinek száma. Például $\#(0) = 1$, $\#(9) = 1$ és $\#(2019) = 4$. Egyszerűen ellenőrizhető a következő alternatív formák érvényessége:

$$\#(n) = \max\{k \geq 0: 10^k \leq n\} + 1 = \max\{k \geq 0: k \leq \lg(n)\} + 1 = \lfloor \lg(n) \rfloor + 1.$$

Itt és a továbbiakban $\lg(\cdot)$ a 10-es alapú logaritmust jelöli, $\lfloor x \rfloor$ pedig az x valós szám alsó egészrésze, azaz az x -nél nem nagyobb egészek közül a legnagyobb. Például

$$\#(9^{10}) = \lfloor \lg(9^{10}) \rfloor + 1 = \lfloor 10 \lg(9) \rfloor + 1 = \lfloor 10 \cdot 0,954242 \dots \rfloor + 1 = 9 + 1 = 10$$

és nyilvánvalóan $\#(10^9) = 10$. Azt kaptuk, hogy a két szám ugyanolyan hosszú, mindkettő tíz számjeggyel írható fel a decimális rendszerben és mivel a legkisebb ilyen tulajdonságú szám a 10^9 , következésképp $9^{10} \geq 10^9$. Ugyanakkor 9^{10}

utolsó jegye nem 0, emiatt $9^{10} > 10^9$. Az $N = 1$ eset fenti elemzése már mutat valamit ezen megközelítés stílusából. Az alábbi összefoglaló táblázatban rögzítettük az $N = 1, 2, 3$ esetekre a számjegyek számát:

N	1	2	3
$\#(A_N)$	10	200	3000
$\#(B_N)$	10	199	2998

A táblázatbeli értékek alapján az alábbi tételt tudjuk megfogalmazni:

1. tétel. Legyen $N \geq 1$ egész szám, $A_N = (10^N - 1)^{10^N}$ és $B_N = (10^N)^{10^N - 1}$. Ekkor minden $N \geq 1$ -re a következő egyenlőség áll fenn:

$$\#(A_N) - \#(B_N) = N - 1.$$

Bizonyítás.

Kezdjük az egyszerűbbel, B_N számjegyei számának a meghatározásával.

$$\#(B_N) = \#[(10^N)^{10^N - 1}] = \#[10^{N(10^N - 1)}] = N(10^N - 1) + 1 = N10^N - (N - 1)$$

Ezek alapján elég azt bizonyítani, hogy $\#(A_N) = N10^N$. Ezt két lépésben tesszük. Az *a*) részben megmutatjuk, hogy $\#(A_N) \leq N10^N$, ami az egyszerűbb, aztán a *b*) részben a $\#(A_N) \geq N10^N$ egyenlőtlenséget, ami kissé technikásabb.

a) Induljunk ki a nyilvánvaló $\lg(10^N - 1) < N$ egyenlőtlenségből, amit 10^N -nel szorozva $10^N \lg(10^N - 1) < N10^N$, azonban $10^N \lg(10^N - 1) = \lg[(10^N - 1)^{10^N}] = \lg(A_N)$, így $\lfloor \lg(A_N) \rfloor \leq N10^N - 1$, ahonnan $\#(A_N) = \lfloor \lg(A_N) \rfloor + 1 \leq N10^N$.

b) Elegendő megmutatni, hogy

$$(1) \quad 10^N \lg(10^N - 1) > N10^N - 1.$$

Először belátjuk, hogy (1) ekvivalens a következővel:

$$(2) \quad \lg \left[\left(1 + \frac{1}{10^N - 1} \right)^{10^N - 1} \right] < 1 - \frac{1}{10^N}.$$

Ehhez helyettesítsünk

$$\lg(10^N - 1) = \lg \left[10^N \left(1 - \frac{1}{10^N} \right) \right] = N + \lg \left(1 - \frac{1}{10^N} \right) - t$$

(1)-be és egyszerűsítsünk a mindkét oldalon fellépő $N10^N$ taggal. Így:

$$10^N \lg \left(1 - \frac{1}{10^N} \right) > -1 \Leftrightarrow -\lg \left(1 - \frac{1}{10^N} \right) = \lg \left(1 + \frac{1}{10^N - 1} \right) < \frac{1}{10^N},$$

amit $(10^N - 1)$ -gyel szorozva kapjuk (2)-t. Az e szám tárgyalásakor mindenki találkozik a következő, ismertnek feltételezett egyenlőtlenséggel: $(1 + \frac{1}{k})^k < 3$ minden $k \geq 1$ esetén. Alkalmazzuk most ezt $k = 10^N - 1$ -re, ahonnan

$$\lg \left[\left(1 + \frac{1}{10^N - 1} \right)^{10^N - 1} \right] < \lg(3) \approx 0.4771 < \frac{1}{2} < 1 - \frac{1}{10^N} \quad (\forall N \geq 1),$$

így (1) fennáll és következésképp

$$\#(A_N) = \lfloor 10^N \lg(10^N - 1) \rfloor + 1 \geq N10^N,$$

amit bizonyítani szerettünk volna. \square

A fenti tétel birtokában és emlékezve az $N = 1$ speciális esetre kapott eredményre, válaszunk a végtelen sok esetre röviden: $A_N > B_N \quad \forall N \geq 1$.


A hiperkocka

Mielőtt rátérnénk a fejezetcímben szereplő geometriai modell elemzésére, vegyük észre, hogy az eredeti kérdés értelmes hatványok egy sokkal bővebb halmazára: nevezetesen minden természetes számra megkérdezhetjük, hogy vajon n^{n+1} , vagy pedig $(n+1)^n$ a nagyobb. Az előző fejezetben $n = 10^N - 1$ alakú számokra választottuk meg a kérdést. Az alábbi táblázatból a következőt tudjuk kiolvasni: $n = 1, 2$ esetén $n^{n+1} < (n+1)^n$, az $n = 3, 4, 5, 6$ értékekre pedig $n^{n+1} > (n+1)^n$.

n	1	2	3	4	5	6
n^{n+1}	1	8	81	1024	15625	279936
$(n+1)^n$	2	9	64	625	7776	117649

A továbbiakban azt fogjuk bizonyítani, hogy $n^{n+1} > (n+1)^n \forall n \geq 3$, felépítve egy érdekes geometriai kapcsolatot az egyenlőtlenségben szereplő hatványok és az $(n+1)$ élhosszúságú n dimenziós hiperkocka egy speciális partíciója között. Először elvégezzük a bizonyítást $n = 3$ dimenzióra, majd az itt szerzett tapasztalatokat átültetjük \mathcal{R}^n -be. Azt szeretnénk belátni, hogy $3^4 > 4^3$. Egy pillanatra tekintsünk el attól, hogy nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy $3^4 = 81 > 64 = 4^3$. Tekintsünk az egyenlőtlenségre a következő módon: $3 \cdot 3^3 > 4^3$ és interpretáljuk a 4^3 mennyiséget mint a $(0, 0, 0)$ és $(4, 4, 4) \in \mathcal{R}^3$ átellenes csúcspontok által kifeszített 4 egység élhosszúságú kocka térfogatát.


Ebben az értelmezésben az egyenlőtlenség azt mondja, hogy ez a kocka összerakható 3 db $3 \times 3 \times 3$ -as kockát alkotó, összesen 3×27 egységkockából úgy, hogy legalább egy közülük felesleges (szigorú egyenlőtlenség). A továbbiakban minden előforduló kockát és téglatestet úgy tekintünk, hogy egységkockákból összeragasztással keletkezik. Szét tudjuk őket szedni és más formában újra összerakni.



2. ábra. Kocka reprezentáció 3D

A 2. ábrán (mely a borítón színesben látható) világosan lehet követni, ahogyan a kiindulási $4 \times 4 \times 4$ -es kocka felépíthető egy $3 \times 3 \times 3$ -as (kék) kockából; 3 db $3 \times 3 \times 1$ -es (piros) téglatest ad egy másik $3 \times 3 \times 3$ -as kockát; és végül maradt 3db $3 \times 1 \times 1$ -es (zöld) téglá valamint egy $1 \times 1 \times 1$ -es (lila) sarok kocka, amik együttesen (10) kevesebb egységkockát tartalmaznak, mint a harmadik $3 \times 3 \times 3$ -as kocka (27). Ez a konstrukció valóban azt mutatja, hogy $3^4 = 3 \cdot 3^3 > 4^3$. Könnyen követhető, hogy mi történik, amint az alkotórészeket összerakjuk. Először felhasználunk 27 egységkockát (kék), majd $3 \cdot 9 = 27$ egységkockát (piros) és még szükségünk van $3 \cdot 3 = 9$ (zöld) plusz 1 (lila) egységkockára. $27 + 3 \cdot 9 + 3 \cdot 3 + 1 = 64$. Vegyük észre azt is, hogy a beépített alkotórészek száma 1, 3, 3, 1. Ez könnyen eszünkbe juttathatja a Pascal-háromszög harmadik sorát és a binomiális tételt. Ahhoz, hogy a fenti módszert általánosítani tudjunk, néhány előkészületre lesz szükségünk. Bevezetjük a következő jelöléseket:

- x^i az i -edik koordinátatengely \mathcal{R}^n -ben.
- $n^i = [0, n]^i$ és $1^i = [n, n+1]^i$, ahol az i index arra utal, hogy a szóbanforgó intervallumok az i -edik tengelyen, x^i -n vannak.
- $a(w) = a$ w szimbólum előfordulásainak száma egy kifejezésben; például ha $e = w \times n \times w$, akkor $a(w) = 2$ és $a(n) = 1$. Az $a(\cdot)$ függvény használatakor részletezni fogjuk, hogy pontosan mit is számol az adott helyzetben.
- Legyen $A \subseteq \mathcal{R}^n$ egy mérhető részhalmaz, $\text{Vol}(A)$ az A térfogata.
- $\prod_{j=1}^m A_j$ az A_j részhalmazok Descartes-szorzata.
- $3^x \oplus 1^x = 4^x$ jelentése: $3^x = [0, 3]^x$ -hez ragasztjuk az $1^x = [3, 4]^x$ egységintervallumot, ami így a $[0, 4]^x$ -t eredményezi; 3D-ben a szokásos x, y, z tengelyreferenciát fogjuk használni. Nyilvánvalóan érvényesek az $A \oplus B = B \oplus A$ és $A \times (B \oplus C) = (A \times B) \oplus (A \times C)$ azonosságok (3. ábra)



3. ábra. Intervallumok 3D-ben

Az eddig leírtakat a fenti fogalmakkal és műveletekkel lehet elegáns matematikai formába önteni. A 3. ábrán szereplő intervallumok Descartes-szorzataival elő tudjuk állítani a 2. ábrán látható alkotórészeket. Kezdjünk megint a 3D esettel. Jelölje C_3 a $[0, 4] \times [0, 4] \times [0, 4]$ kockát. Ekkor

$$\begin{aligned}
 C_3 &= \times_{i=1}^3 (3^i \oplus 1^i) = (3^x \oplus 1^x) \times (3^y \oplus 1^y) \times (3^z \oplus 1^z) = \\
 &= \overbrace{(3^x \times 3^y \times 3^z)}^{\text{kék}} \oplus \\
 &\quad \oplus \overbrace{(3^x \times 3^y \times 1^z)}^{\text{piros}} \oplus \overbrace{(3^x \times 1^y \times 3^z)}^{\text{piros}} \oplus \overbrace{(1^x \times 3^y \times 3^z)}^{\text{piros}} \oplus \\
 &\quad \oplus \overbrace{(3^x \times 1^y \times 1^z)}^{\text{zöld}} \oplus \overbrace{(1^x \times 3^y \times 1^z)}^{\text{zöld}} \oplus \overbrace{(1^x \times 1^y \times 3^z)}^{\text{zöld}} \oplus \\
 &\quad \oplus \overbrace{(1^x \times 1^y \times 1^z)}^{\text{lila}}.
 \end{aligned}$$

Legyen most $n \geq 3$ tetszőleges és C_n jelölje az n dimenziós hiperkockát, melyet a $(0, 0, \dots, 0)$ és $(n+1, n+1, \dots, n+1)$ pontok feszítenek ki. Ekkor ezen kocka térfogatára:

$$\begin{aligned}
 (n+1)^n &= \text{Vol}(C_n) = \text{Vol} \left[\times_{i=1}^n (n^i \oplus 1^i) \right] = \text{Vol} \left[\oplus_{u \in \{n,1\}} (u^1 \times u^2 \times \dots \times u^n) \right] = \\
 &= \text{Vol} \left[\oplus_{k=0}^n \oplus_{\substack{u \in \{n,1\} \\ a(1)=k}} (u^1 \times u^2 \times \dots \times u^n) \right] = \sum_{k=0}^n \text{Vol} \left[\oplus_{\substack{u \in \{n,1\} \\ a(1)=k}} (u^1 \times u^2 \times \dots \times u^n) \right].
 \end{aligned}$$

A fenti és a további formulákban az összeragasztási műveletre bevezetett \oplus alatti $a(1) = k$ az u formális változó helyettesítésekor előforduló 1-esek számát adja, ami itt éppen k . Ahhoz, hogy használható felső becslést tudjunk adni, vegyük észre a következőket:

a) Ha $k = 0, 1, \dots, n-2$, akkor

$$\begin{aligned}
 \text{Vol} \left[\oplus_{\substack{u \in \{n,1\} \\ a(1)=k}} (u^1 \times u^2 \times \dots \times u^n) \right] &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} n^{n-k} \leq \sum_{1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n} n^{n-k} = \\
 &= n^k \times n^{n-k} = n^n.
 \end{aligned}$$

b) A $k = n-1$ és $k = n$ indexekre

$$\binom{n}{n-1} \cdot n^1 + \binom{n}{n} \cdot n^0 = n^2 + 1 < n^n \quad \text{ha } n \geq 3,$$

következésképpen az alábbi becslést kapjuk:

$$(n+1)^n < (n-1) \cdot n^n + n^n = n \cdot n^n = n^{n+1}.$$

Emlékeztetőül: az $n = 3$ esetre vázolt bizonyítás végén megjegyeztük, hogy a $4 \times 4 \times 4$ -es kocka partíciójában szereplő alkotórészek darabszámai 1, 3, 3, 1, a Pascal-háromszög 3. sora. Hol szerepelnek a binomiális együtthatók az n -dimenziós esetben? Tudunk valamit mondani az $n^{n+1}/(n+1)^n$ hányadosról? Ezekre a kérdésekre keresünk választ a hátralévő részben. Mivel $\binom{n}{k}$ -féleképpen tudunk k indexet kiválasztani az $\{1, 2, \dots, n\}$ halmazból, így egyrészt

$$\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} n^{n-k} = \binom{n}{k} n^{n-k},$$

ami azt mutatja, hogy a fenti bizonyítás ekvivalens az $(n + 1)^n$ binomiális tétel szerinti kifejtésével. Másrésztől a következő felső becslés adható:

$$\binom{n}{k} n^{n-k} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} n^{n-k} \leq \frac{1}{k!} n^k n^{n-k} = \frac{1}{k!} n^n.$$

Innen azt kapjuk, hogy


$$(n + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} n^{n-k} \leq \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right) n^n < e n^n < 3n^n,$$

ahonnan végül az alábbi becslés nyerhető:

$$\frac{n}{3} < \frac{n}{e} < \frac{n}{s_n} < \frac{n^{n+1}}{(n+1)^n},$$

ahol s_n a $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ sor n -edik részletösszegét jelöli.

Visszatérve egy pillanatra az eredeti kérdéshez, a fenti becslés alapján az $n = 10 - 1 = 9$, $10^2 - 1 = 99$, $10^3 - 1 = 999$ értékekre 9^{10} , 99^{100} , 999^{1000} rendre legalább 3, 33, 333-szor nagyobb, mint 10^9 , 100^{99} , 1000^{999} . A pontos hányadosok 4 tizedesjegyre kerekítve 3,4867, 36,6032, 367,6954. Az e számot használó becslésre a faktorok: 3,3109, 36,4201, 367,5116. Ez a becslés igen pontos abban az értelemben, hogy $\lfloor \frac{n}{e} \rfloor = \lfloor \frac{n^{n+1}}{(n+1)^n} \rfloor$.



4. ábra. Az $n = 2$ dimenziós hiperkocka partíciója

A hiperkocka modell egy másik előnye, hogy a fenti gondolatmenet mentén a $(0, 0, \dots, 0)$, $(a + b, a + b, \dots, a + b)$ szemközti csúcsokkal rendelkező hiperkockát particionálva a binomiális tétel geometriai bizonyítása nyerhető és az azonos típusú alkotórészek száma éppen a Pascal-háromszög egy sorában található binomiális együtthatókkal egyezik meg.

Zoltan Retkes
26, Moore Road, Barwell, UK
e-mail: tigris35711@gmail.com