

Legyen a négyzet oldala egységnyi, az egyik kör  $k_1$ , és érintse ez  $k_2$ -t és  $k_3$ -at. Ekkor  $k_2$  érinti  $k_1$ -et, és  $k_3$  és  $k_4$  közül még egyet. Ez nem lehet  $k_3$ , mivel ekkor  $k_1, k_2$  és  $k_3$  páronként érintenék egymást, és  $k_4$  bármelyiket is érintené  $k_1, k_2, k_3$  közül, az a többi körök közül hármat (és nem kettőt) érintene. Így  $k_2$  csak  $k_1$ -et és  $k_4$ -et érintheti. Hasonlóan látható, hogy  $k_4$  a  $k_2$ -n kívül csak  $k_3$ -at érintheti, s  $k_3$  csak  $k_1$ -et és  $k_4$ -et. A feltétel szerint az érintő körök sugarai egyenlők, azért  $k_1$  és  $k_4$  sugara egyenlő – mondjuk  $r$ , továbbá  $k_2$  és  $k_3$  sugara is egyenlő –  $R$ .

Semelyik kör nem érintheti a négyzet szemben fekvő oldalait, hiszen a négyzetbe még egy ugyanakkora sugarú körnek el kell férnie. Így a körök két-két szomszédos oldalt érintenek, középpontjaik a négyzet átlóin helyezkednek el. Az is világos, hogy egyik sem érintheti belülről a másikat, tehát a négy kör a négyzet négy sarkában „ül”.

Tegyük fel először, hogy az  $r$  sugarú  $k_1$  és  $k_4$  a négyzet szomszédos sarkaiban van. Mivel  $k_1$  és  $k_4$  nem metszheti egymást, sőt nem is érintheti,  $r$  kisebb, mint a négyzet oldalának negyede, azaz  $1/4$ . Hasonlóan  $k_2$  és  $k_3$  sugara is kisebb  $1/4$ -nél, ekkor viszont  $k_1$  és  $k_2$  nem érinthetné egymást.

1985-03-114-1.eps

1. ábra

Ezért  $k_1$  és  $k_4$ , valamint  $k_2$  és  $k_3$  is a négyzet átellenes sarkaiban van (1. ábra).  $k_1$  sugara legfeljebb akkora lehet, hogy  $k_1$  és  $k_4$  metszés- és érintéspont nélkül elférjenek, vagyis hogy a  $k_1$  által az átlóból kivágott szakasz az átló felénél rövidebb legyen:

$$r\sqrt{2} + r < \frac{\sqrt{2}}{2},$$

azaz

$$r < \frac{\sqrt{2}}{2(\sqrt{2} + 1)} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,2929.$$

Ha  $r$ -et éppen  $(1 - \sqrt{2}/2)$ -nek választjuk,  $k_1$  és  $k_4$  éppen érinti egymást a négyzet középpontjában. Ezekhez található megfelelő  $k_2$  és  $k_3$  körök (2. ábra).

1985-03-114-2.eps

2. ábra

Ha most  $k_1$  (és  $k_4$ ) sugarát folyamatosan csökkentjük, a hozzájuk tartozó  $k_2, k_3$  körök sugara folyamatosan nő.  $r = 1/4$  esetben mind a négy kör sugara egyenlő (3. ábra),  $r$ -et tovább csökkentve  $k_2$  és  $k_3$  növekszik, s  $r$ -et addig tudjuk csökkenteni, míg  $k_2$  és  $k_3$  „össze nem ér” a négyzet középpontjában (4. ábra).

1985-03-115-1.eps

3. ábra

1985-03-115-2.eps

4. ábra

Ebben a helyzetben  $k_2$  és  $k_3$  sugara az előbb kiszámított  $R = 1 - \sqrt{2}/2$ , s a vastagon kihúzott derékszögű háromszögből

$$(r + R)^2 = R^2 + \left( \frac{\sqrt{2}}{2} - r\sqrt{2} \right)^2,$$

azaz

$$r^2 - 2r(1 + R) + \frac{1}{2} = 0.$$

Innen figyelembe véve, hogy  $r < 1$ , kapjuk, hogy

$$r = 2 - \frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{4 - 2\sqrt{2}} = 0,2105.$$

A  $k_1$  kör sugara csak ennél nagyobb, és  $(1 - \sqrt{2}/2)$ -nél kisebb lehet, ám ezek között tetszőleges értéket felvehet. A  $k_2$  és  $k_3$  körökre nyilván ugyanez a helyzet. Így a feladat kérdésére a válasz: a kérdéses körök sugarai az

$$\left( 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, 2 - \frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{4 - 2\sqrt{2}} \right)$$

nyílt intervallum valamelyik elemével, és csak ezekkel lehetnek egyenlők.