

Kétszeri négyzetreemeléssel az egyenlet olyan következményét írhatjuk fel, amelyben nem szerepel gyökjel:

$$4 \cdot \sqrt{(x^2 - p)(x^2 - 1)} = p + 4 - 4x^2,$$

$$16p - 16(p + 1)x^2 = p^2 + 8p + 16 - 8(p + 4)x^2,$$

amiből

$$(2) \quad 8(2 - p)x^2 = p^2 - 8p + 16 = (p - 4)^2,$$

$$x^2 = \frac{(p - 4)^2}{8(2 - p)}.$$

Eszerint gyök gyanánt csak az

$$x_1 = \frac{p - 4}{\sqrt{8(2 - p)}}, \quad x_2 = \frac{4 - p}{\sqrt{8(2 - p)}}$$

számok jönnek szóba, ha ti.  $p \neq 2$ . A  $p = 2$  esetben (2) ellentmondást fejez ki, ekkor (1)-nek nincs gyöke.

$x_1$  és  $x_2$  valósak, ha  $p < 2$ . Ekkor  $x_1 < 0$ ; ez nem lehet gyöke (1)-nek, mert (1) bal oldala nem negatív.  $x_2$ -t (1)-be helyettesítve a két négyzetgyök alatti kifejezés:

$$x^2 - p = \frac{p^2 - 8p + 16}{16 - 8p} - p = \frac{9p^2 - 24p + 16}{8(2 - p)} = \frac{(3p - 4)^2}{8(2 - p)},$$

$$x^2 - 1 = \frac{p^2}{8(2 - p)}.$$

Ha  $p < 2$ , akkor mindkét kifejezés pozitív. Négyzetgyökük összegének kell  $x_2$ -t adnia ahhoz, hogy  $x_2$  gyöke legyen (1)-nek, vagyis a közös nevezőt mindjárt elhagyva – teljesülnie kell a következő egyenlőségnek

$$|3p - 4| + 2|p| = 4 - p.$$

A bal oldal  $p < 0$  esetén

$$-(3p - 4) + 2(-p) = -5p + 4 \neq 4 - p,$$

tehát  $x_2$  nem gyök;  $0 \leq p \leq 4/3$  esetén

$$-(3p - 4) + 2p = -p + 4,$$

tehát ebben az intervallumban  $x_2$  kielégíti (1)-et; végül  $4/3 < p < 2$  esetén a bal oldal

$$3p - 4 + 2p = 5p - 4,$$

ami ebbe az intervallumba eső értékekre nem egyenlő a jobb oldallal, tehát  $x_2$  ebben az esetben sem gyök.

Mindezek szerint az (1) egyenlet egyetlen valós gyöke  $0 \leq p \leq 4/3$  esetén

$$x = \frac{4 - p}{\sqrt{8(2 - p)}},$$

más  $p$  értékek esetén nincs valós megoldása:

*Surányi László* (Budapest, Fazekas M. gyak. g. I. o. t.)

*Megjegyzés.* Meghatározhatjuk azt az intervallumot, amelybe a gyök esik. Átalakítással

$$x = \frac{4 - p}{\sqrt{8(2 - p)}} = \sqrt{\frac{16 - 8p + p^2}{16 - 8p}} = \sqrt{1 + \frac{p^2}{16 - 8p}},$$

eszerint a  $p$  számára megállapított  $(0, 4/3)$  intervallumon végighaladva  $x$  növekszik, mert a gyök alatt a tört számlálója növekszik, nevezője csökken.  $p = 0$  esetén  $x = 1$ ,  $p = 4/3$  esetén  $x = 2/\sqrt{3} > 1$ , tehát a mondott intervallum  $(1, 2/\sqrt{3})$ .