

Rögtön észrevehetjük, hogy  $B$ -nek mindig csökkentenie kell az utoljára elhangzott számot,  $A$ -nak pedig növelnie (legalábbis nem csökkentenie). Az is látszik, hogy  $B$  csak akkor nyerhet, ha  $A$  előtte prímszámot mondott. Mivel  $A$  mindig egy  $[n_{2k}, n_{2k}^2]$  típusú intervallumból választhat számot, ezért — úgy érezzük —  $B$ -nek elég kevés esetben van esélye a nyeresre, feltéve persze, hogy  $A$  valamilyen ésszerű stratégiával játszik.

Célszerű tehát először az a) kérdéssel foglalkoznunk. Ha  $n_0 \leq 1990 < n_0^2$ , akkor  $A$  triviálisan nyer az  $n_1 = 1990$  számmal, ezért  $45 \leq n_0 \leq 1990$  esetén  $A$ -nak van nyerési stratégiája.

Az  $1990 < n_0$  esetben  $A$  nem alkalmazhatja ezt a módszert, de ha tud olyan  $n_1$  számot mondani, amelyre  $B$  csak  $45 \leq n_2 \leq 1990$  számmal válaszolhat, akkor ismét  $A$  nyer, hiszen ekkor  $n_0$  szerepét  $n_2$  veszi át. Legyen például  $n_1 = 47 \cdot 53 = 2491$  —  $A$  választhatja ezt a számot  $1990 < n_0 \leq 2491$  esetén —, ezzel  $n_2 = 47$  vagy  $53$ .

Ezzel beláttuk, hogy  $45 \leq n_0 \leq 2491$  esetén  $A$  tud nyerni, hasonlóan fogjuk igazolni  $k$  szerinti teljes indukcióval, hogy  $45 \leq n_0 \leq 2^{k-1} \cdot 2491$  esetén ( $k$  pozitív egész) is  $A$ -nak van nyerési stratégiája.

$k = 1$ -re már beláttuk az állítást, tegyük fel ezért, hogy valamilyen  $k \geq 1$ -re igaz az állítás, azt kell megmutatnunk, hogy

$$2^{k-1} \cdot 2491 < n_0 \leq 2^k \cdot 2491$$

esetén  $A$ -nak van nyerési stratégiája.

Válassza ehhez  $A$  az  $n_1 = 2^k \cdot 2491 = 2^k \cdot 47 \cdot 53$  számot, nyilván  $n_0 \leq n_1 < n_0^2$ . Ezek után  $B$  csak egy  $n_2 = n_1/p^\alpha = (2^k \cdot 47 \cdot 53)/p^\alpha$  alakú egészet választhat, ahol  $p^\alpha$  prímszám. Erre  $47 < n_2 \leq \frac{n_1}{2} = 2^{k-1} \cdot 2491$ , ami azt jelenti induktív feltevésünk szerint, hogy  $A$ -nak van nyerési stratégiája, az állítás  $(k+1)$ -re is fennáll.

Eddigi eredményeinket összefoglalva kapjuk, hogy a  $45 \leq n_0$  esetben  $A$ -nak van nyerési stratégiája.

Próbáljuk meg a fennmaradó  $n_0 < 45$  eseteket is erre az esetre visszavezetni.  $A$ -nak olyan  $n_1$  számot kell mondania, amelyre  $B$  csak egy  $45 \leq n_2$  számot választhat. Tekintsük ehhez az  $n_1 = 3^2 \cdot 5 \cdot 11 = 495$  számot —  $A$  választhatja ezt a  $23 \leq n_0 \leq 44$  esetben, mert ekkor  $n_0 \leq n_1 < n_0^2$  —, ezzel  $n_2$ -re

$$n_2 \geq \min(3^2 \cdot 5, 3^2 \cdot 11, 5 \cdot 11) = 3^2 \cdot 5 = 45,$$

vagyis az előzőek alapján  $A$ -nak van nyerési stratégiája.

Hátra van az  $n_0 \leq 22$  eset vizsgálata;  $A$ -nak most már elegendő olyan  $n_1$  számot mondania, amelyre  $n_2 \geq 23$ . Legyen ehhez  $n_1 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$ , ezzel  $n_2 \geq 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ . Mivel a  $15 \leq n_0 \leq 22$  esetben  $n_0 \leq n_1 < n_0^2$  is teljesül, ezért ilyenkor is  $A$ -nak van nyerési stratégiája.

Tovább „lépegetünk” lefelé — mindig ugyanazzal a redukáló szándékkal:  $11 \leq n_0 \leq 14$  esetén  $A$  száma legyen  $n_1 = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$ ; nyilván  $n_0 \leq n_1 < n_0^2$ , és  $n_2 \geq 3 \cdot 5 = 15$ , vagyis innen  $A$  nyerni tud — az eddig bizonyítottak miatt.

Végül legyen  $n_1 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$  ha  $8 \leq n_0 \leq 10$ ; ekkor  $n_0 \leq n_1 < n_0^2$  és  $n_2 \geq \min(2^2 \cdot 3, 2^2 \cdot 5, 3 \cdot 5) = 2^2 \cdot 3 = 12$ , ami azt jelenti, hogy ekkor is  $A$ -nak van nyerési stratégiája.

Ezzel beláttuk, hogy  $8 \leq n_0$  esetén  $A$ -nak van nyerési stratégiája.

Ezzel a módszerrel nem tudjuk tovább csökkentenie  $n_0$  olyan lehetséges értékeit, amelyekből kiindulva  $A$  el tudja érni a győzelmet. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy  $n_0 < 8$  esetén  $A$  nem tud olyan  $n_1$  számot mondani, amelyre  $B$  csak egy  $n_2 \geq 8$ -cal válaszolhatna. Ez a tény azt sejteti velünk, hogy  $n_0 < 8$  esetén  $B$  legalább egy döntetlent ki tud kényszeríteni. (Valójában az előbbi észrevétel igazolja is sejtésünket, hiszen ha  $B$  nem nyer, akkor  $B$  még mindig ki tud kényszeríteni egy végtelen

$$n_0 < 8, n_1 < 64, n_2 < 8, n_3 < 64, n_4 < 8, n_5 < 64, \dots$$

számsorozatot, ami azt jelenti, hogy  $A$  sem nyerhet, mert nem nevezheti meg az 1990-et. A későbbiekben azonban úgyis pontosabban megvizsgáljuk a döntetlen lehetőségeit, ezért egyelőre a sejtés elegendő számunkra.)

Foglalkozzunk most a b) kérdéssel.

Ha  $n_0 = 2$ , akkor  $n_0 \leq n_1 < n_0^2$  miatt  $A$  csak prímszámot választhat ( $n_1 = 2, 3, 4$ ), vagyis  $B$  mondhatja az  $n_2 = 1$  számot, amivel megnyeri a játékot.

Ha  $n_0 = 3$ , akkor  $n_1 = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ . Ha  $n_1$  prímszám, akkor  $n_2 = 1$ -gyel  $B$  nyer, egyébként  $n_1 = 6 = 2 \cdot 3$ . Ekkor  $B$  választhatja az  $n_2 = 2$  számot, és ekkor — mint az előbb igazoltuk —  $B$ -nek van nyerési stratégiája. ( $n_0$  szerepét  $n_2$  veszi át).

Ha  $n_0 = 4$ , akkor  $B$  az előbbiekhöz hasonlóan el tudja érni a győzelmet, amennyiben  $n_1$  prímszám, vagy  $n_1 \leq 3^2$ . Különböző pedig  $n_1 = 10, 12, 14, 15$ ; és ezeket az eseteket rendre visszavezethetjük az előzőekre az  $n_2 = 2, 3, 2, 3$  választással, ugyanis  $n_2 \leq 3$  esetén  $B$ -nek van nyerési stratégiája.

Végül  $n_0 = 5$  esetén  $n_0 \leq n_1 < n_0^2$  miatt  $n_1$  prímszám, vagy  $n_1 \leq 4^2$  (amire már láttuk, hogy  $B$ -nek van nyerési stratégiája), vagy pedig  $n_1 = 18, 20, 21, 22, 24$ , és ezeket az  $n_2 = 2, 2^2, 3, 2, 3$  választással rendre visszavezethetjük a már megvizsgált  $n_0 \leq 4$  esetre ( $n_0$  szerepét  $n_2$  veszi át).

Összességében tehát kimondhatjuk, hogy  $2 \leq n_0 \leq 5$  esetén  $B$ -nek van nyerési stratégiája.

Meg kell még vizsgálnunk az  $n_0 = 6, 7$  esetet. Mivel a  $B$ -nek győzelmet jelentő  $n_0$  kezdőértékek lehetséges értékeit nem tudjuk a szokásos módszerünkkel tovább növelni, ezért igen valószínűnek látszik, hogy  $n_0 = 6, 7$  esetén egyik játékos sem tudja kikényszeríteni a győzelmet. Ehhez csak azt kell igazolnunk, hogy mind  $A$ , mind  $B$  tud úgy játszani, hogy a másik ne nyerhessen.

Legyen tehát  $n_0 = 6$  vagy  $7$ , és  $A$  válassza az  $n_1 = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$  számot, amelyre nyilván  $n_0 < n_1 < n_0^2$ .  $B$  ezután csak  $n_2 = 2 \cdot 5 = 10$ -et, vagy  $n_2 = 3 \cdot 5 = 15$ -öt, vagy  $n_2 = 2 \cdot 3 = 6$ -ot választhat.

Az  $n_2 = 10, 15$  esetben – mint már láttuk –  $A$ -nak van nyerési stratégiája, az  $n_2 = 6$  eset pedig  $A$  szempontjából ekvivalens az  $n_0 = 6$  kezdéssel (tehát újra jöhet  $n_0 = 30$ , stb.) így beláttuk, hogy ha  $A$  ügyesen játszik, akkor  $B$  nem nyerhet.

Ugyanez áll viszont  $B$ -re is. Ha ugyanis  $n_0 = 6$  vagy  $7$ , akkor  $6 \leq n_1 \leq 49$ , és ha végignézzük a  $6, 7, \dots, 49$  számokat, azt találjuk, hogy  $B$  mindig tud olyan  $n_2$  számot mondani, amelyre  $n_2 \leq 6$ . Ha  $n_2 \leq 5$ , akkor a fentiek miatt nyerési stratégiája van  $B$ -nek (esetleg  $n_2 = 1$ ), ha pedig  $n_2 = 6$ , akkor ugyanolyan helyzetet kapunk, mint amilyennel kezdtük a játékot (amikor  $n_0 = 6, 7$ ).

Ezzel a feladatot megoldottuk, eredményeinket a következőképpen foglalhatjuk össze:

- a)  $A$ -nak van nyerési stratégiája, ha  $8 \leq n_0$ ,
- b)  $B$ -nek van nyerési stratégiája, ha  $2 \leq n_0 \leq 5$ , végül
- c) egyik játékos sem tudja kikényszeríteni a győzelmet, ha  $n_0 = 6, 7$ .