

Megmutatjuk, hogy pontosan a következő gráfok vaktában bejárhatóak: a teljes gráfok, a körök és az ún. *teljes páros gráfok* közül azok, amelyeknél a csúcsok halmaza két azonos elemszámú részre osztható úgy, hogy két csúcs pontosan akkor van éllel összekötve, ha különböző részbe tartozik. Egyszerűen látható, hogy a felsorolt gráfok valóban vaktában bejárhatóak.

Tegyük fel ezután, hogy  $\mathcal{G}$  vaktában bejárható gráf, amelynek  $n \geq 4$  csúcsa van. Jelölje  $A_1 A_2 \dots A_n$  a gráf tetszőleges (az  $A_1$  csúcsból induló) Hamilton-újtját. Ha a gráf bejárását az  $A_2$  csúcsból kezdjük és az  $A_2 A_3 \dots A_{n-1}$  úton eljutunk  $A_{n-1}$ -be, akkor a vaktában bejárhatóság miatt el kell jutnunk  $A_1$ -be is, ami azt jelenti, hogy  $A_n$  és  $A_1$  is össze van éllel kötve, azaz létezik az  $A_1 A_2 \dots A_n A_1$  (Hamilton-)kör.

Megmutatjuk, hogy ha  $\mathcal{G}$  tartalmaz háromszöget, akkor teljes. Jelöljön  $ABC$  egy háromszöget, akkor a gráf bejárható egy  $ABCP_4 P_5 \dots P_n$  út mentén, és az előbbieket szerint itt  $P_n$  és  $A$  között is megy él. Ha valamelyik  $P_i$  csúcs nincs összekötve pl.  $B$ -vel, akkor induljunk el  $P_{i+1}$ -ből a  $P_{i+1} P_{i+2} \dots P_n A C P_4 P_5 \dots P_i$  út mentén. Itt megakadunk, nem tudunk  $B$ -be jutni, és ez ellentmondás. Tehát egy háromszög csúcsai a gráf minden csúcsával össze vannak kötve. Legyen  $X$  egy tetszőleges csúcsa  $\mathcal{G}$ -nek; az előbbieket szerint ekkor  $AXC$  is háromszög, ezért  $X$  minden csúccsal össze van kötve, azaz  $\mathcal{G}$  teljes.

A következőkben feltehetjük, hogy a gráfban nincs háromszög. Ha a – továbbiakban rögzített –  $A_1 A_2 \dots A_n A_1$  körön kívül nincsenek további élek  $\mathcal{G}$ -ben, akkor nincs mit bizonyítanunk; tegyük fel ezért, hogy létezik e kör éleitől különböző él is. Definiáljuk (e kör szerint) az  $A_i$  és  $A_j$  pontok *távolságát* a  $d(A_i, A_j) := \min(|i - j|, n - |i - j|)$  képlettel; egy él *hosszán* pedig értsük a végpontjainak a távolságát. Tekintsünk egy, az  $A_1 A_2 \dots A_n A_1$  körhöz nem tartozó olyan élt, amelynek a hossza minimális; feltehető, hogy ez  $A_n A_k$  alakú, alkalmas  $3 \leq k \leq \frac{n}{2}$ -re. Ekkor az  $A_1, A_2, \dots, A_{k-1}$  pontok között nem vezet a körön kívüli él, hiszen annak hossza az  $A_n A_k$  hosszánál kisebb lenne. Mivel a gráf háromszögmentes,  $A_{k+1}$  nincs összekötve  $A_{k-1}$ -gyel. Tegyük fel, hogy  $A_{k+1}$  nincs összekötve  $A_1$ -gyel sem; ekkor azonban  $A_{k+1}$  nem lehet összekötve az  $A_1, A_2, \dots, A_{k-1}$  pontok egyikével sem, hiszen egy ilyen él hossza kisebb lenne, mint  $A_n A_k$ -é. Induljunk el  $A_{k+2}$ -ből az  $A_{k+2} A_{k+3} \dots A_n A_k A_{k+1}$  út mentén. Iménti következtetésünk szerint innen az  $A_1, A_2, \dots, A_{k-1}$  csúcsok egyikére sem tudunk továbblépni, ami ellentmondás. Tehát  $A_{k+1}$  össze van kötve  $A_1$ -gyel. Ezzel beláttuk, hogy minimális hosszúságú él „egy egységgel való elforgatottja” is (minimális hosszúságú) él, azaz

(\*) *valamennyi  $A_j A_{j+k}$  is él, minden  $j$ -re.*

Hasonlóan tételezzük fel, hogy  $A_{k+2}$  nincs összekötve sem  $A_1$ -gyel sem pedig  $A_{k-1}$ -gyel; (\*) szerint ekkor szükségképpen  $k > 3$ . Így  $A_{k+2}$  az  $A_1, A_2, \dots, A_{k-1}$  közül legfeljebb csak az  $A_2$ -vel lehet összekötve. Akkor viszont az  $A_{k+3} A_{k+4} \dots A_n A_k A_{k+1} A_{k+2}$  utat vagy egyáltalán nem, vagy csupán az  $A_2$ -ig tudjuk folytatni, ott viszont vagy  $A_1$  felé továbbhaladva az  $A_{k-1}$ , vagy  $A_{k-1}$  felé továbbhaladva az  $A_1$  pontot kényszerülünk kihagyni; tehát  $A_{k+2}$  össze van kötve  $A_1$ -gyel vagy  $A_{k-1}$ -gyel. Az  $A_1$ -gyel azonban nem lehet összekötve, hiszen akkor  $A_{k+2} A_1 A_{k+1}$  háromszög lenne; így  $A_{k+2}$  az  $A_{k-1}$ -gyel van összekötve. Ebből következik, hogy a körön kívüli élek hosszának minimuma  $k = 3$ .

Megmutatjuk, hogy  $\mathcal{G}$  mindegyik csúcsa össze van kötve  $A_3$  és  $A_4$  valamelyikével. Ha ugyanis egy  $A_i$  ezek egyikével sincs összekötve, akkor az  $A_{i+1} A_{i+2} \dots A_n A_1 A_2 A_5 A_6 \dots A_i$  utat nem tudjuk befejezni.

A háromszögmentesség miatt  $A_6$  (az  $A_3$  és  $A_4$  közül) csak  $A_3$ -mal lehet összekötve, ezért  $A_7$  az  $A_4$ -gyel,  $A_8$  az  $A_3$ -mal,  $\dots$ ,  $A_{2t-1}$  az  $A_4$ -gyel,  $A_{2t}$  az  $A_3$ -mal, stb. Ugyanezt azonban (\*) szerint elmondhatjuk  $A_n A_3$  helyett bármelyik minimális hosszúságú  $A_j A_{j+3}$  élből kiindulva, és akkor  $A_3$  és  $A_4$  helyett általában az  $A_{j+3}$  és  $A_{j+4}$  csúcsokról mondható el, hogy minden csúcs ezek valamelyikével össze van kötve, éspedig  $A_{j+2t-1}$  az  $A_{j+4}$ -gyel,  $A_{j+2t}$  pedig az  $A_{j+3}$ -mal. Mivel itt  $j$  és  $t$  értéke tetszőleges, ez éppen azt jelenti, hogy  $n$  páros, és  $\mathcal{G}$ -ben két csúcs között pontosan akkor megy él, ha indexeik különböző paritásúak.

Frenkel Péter (Fazekas M. Főv. Gyak. Gimn. III. o.t.)