

I. megoldás. A fiúkat osztályozhatjuk aszerint, hogy ki hány lánnyal táncolt. Tartozzék F_1 azok közé a fiúk közé, akik a legtöbb lánnyal táncoltak. Minthogy F_1 sem táncolt minden lánnyal, van olyan L_1 lány, akivel F_1 nem táncolt. Van viszont olyan F_2 fiú, aki táncolt L_1 -gyel, hiszen L_1 is táncolt legalább egy fiúval.

F_1 megválasztása miatt F_2 nem táncolhatott több lánnyal, mint ahánnyal F_1 táncolt. Ebből következik, hogy F_2 nem táncolhatott mindazokkal a lányokkal, akikkel F_1 táncolt, mert az ellenkező esetben F_2 több lánnyal táncolt volna, mint F_1 , hiszen F_2 táncolt L_1 -gyel is, F_1 pedig nem. Van tehát olyan L_2 lány, akivel F_1 táncolt, de F_2 nem.

Az F_1 , F_2 fiúk és L_1 , L_2 lányok kielégítik a feladat követelményét, hiszen F_1 és L_1 , valamint F_2 és L_2 nem táncoltak egymással, viszont F_1 táncolt L_2 -vel és F_2 táncolt L_1 -gyel.

Megjegyzés. A feladat feltevései közül csak azt használtuk fel, hogy egyik fiú sem táncolt minden lánnyal, s hogy minden lány táncolt legalább egy fiúval. Ugyanígy persze elég lett volna csak arra támaszkodnunk, hogy egyik lány sem táncolt minden fiúval, s hogy minden fiú táncolt legalább egy lánnyal, hiszen a fiúk és a lányok szerepét a megoldásban is felcserélhetjük. Két lehetőséget találtunk tehát a feladat szövegének módosítására, feltevéseinek gyengítésére.

Bár közvetlenebb és egyszerűbb megoldást nem tudunk adni, mégis ismertetünk további megoldásokat, mert ezek révén további érdekes kapcsolatokra és általánosításokra mutathatunk rá. Az előző bekezdés észrevétele a további megoldásokra is vonatkozik.

II. megoldás. Válasszunk ki a résztvevők közül egy F_1 fiút és egy L_1 lányt, akivel F_1 nem táncolt. Legyen továbbá F_2 olyan fiú, aki táncolt L_1 -gyel, és L_2 olyan lány, akivel F_2 nem táncolt. Ezt a kiválasztást ugyanígy folytatjuk: F_i kiválasztása után ($i = 2, 3, \dots$) olyan L_i lányt választunk, akivel F_i nem táncolt, majd olyan F_{i+1} fiút, aki táncolt L_i -vel. Addig folytatjuk ezt, amíg nem kerülne sor olyannak a kiválasztására, akit korábban már kiválasztottunk. Minthogy a táncmulatságon véges sokan vesznek részt, ez előbb-utóbb bekövetkezik. Eszerint ki lehet választani k fiút és k lányt, és ezeket körbe lehet úgy állítani, hogy minden fiút két lány fogjon közre, és minden fiú táncolt a balján álló lánnyal, de nem táncolt a jobbán állóval. Azt kell bizonyítanunk, hogy ez már két fiúval és két lánnyal is megvalósítható.

Legyenek egy ilyen körben állók sorjában

$$F_1, L_1, F_2, L_2, \dots, F_k, L_k,$$

ahol tehát azt is tudjuk, hogy F_1 és L_k táncoltak egymással. Megmutatjuk, hogy ha $k > 2$, akkor kevesebb fiúból és lányból is tudunk ilyen kört alkotni. Ha ugyanis F_1 táncolt L_2 -vel, akkor

$$F_1, L_1, F_2, L_2,$$

ha pedig F_1 nem táncolt L_2 -vel, akkor

$$F_1, L_2, \dots, F_k, L_k$$

elégíti ki a követelményt. Eszerint a létszám mindig tovább csökkenthető, amíg csak két fiúhoz és két lányhoz el nem jutunk.

Megjegyzés. Ha a résztvevőket pontokkal ábrázoljuk, és az egymással táncolókat ábrázoló pontokat egy-egy vonallal kötjük össze, egy *gráf* szögpontjaihoz és éleihez jutunk. Ha a vonalak esetleg metszik egymást, metszéspontjukat nem mondjuk a gráf szögpontjának.

A kapott gráfot *páros gráfnak* mondjuk, mert szögpontjai két osztályba sorolhatók (ti. a fiúkat és a lányokat ábrázoló szögpontokéba) olyan módon, hogy minden él két más-más osztályba tartozó szögpontot köt össze. Kiegészíthetjük ezt a gráfot azáltal, hogy éllel kötünk össze minden más-más osztályba tartozó két szögpontot. Ennek az élei tehát kétféleképpen szerepeltek már az eredeti gráfban is, vagy csak utóbb csatoltuk hozzá. Ezt a kétféleséget azzal szemléltethetjük, hogy az éleket két színnel színezzük meg.

Mondhatjuk tehát, hogy feladatunk egy két színnel megfestett *teljes páros gráfról* szól. Bármelyik szögpontot tekintjük is, a belőle kiinduló élek a feladat feltevése szerint nem mindannyian ugyanolyan színűek. A feladat már bizonyított állítása szerint található az ilyen gráfban négy csatlakozó él által alkotott „négyyszög”, amelynek az élei váltakozva más-más színűek.

Ez az átfogalmazás már a bizonyítás során is alkalmazható lett volna. Az olvasóra hagyjuk, hogy ezt a valamivel szemléletesebb megfogalmazást végiggondolja. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a két szín között nincs semmiféle szerepkülönbség. Ez annak felel meg, hogy eredeti feladatunk tartalma mit sem változik, ha benne az „egymással táncolt” és „egymással nem táncolt” fogalmakat felcseréljük. Ha másodszer is összegyűlnek a résztvevők, de most csak azok táncolnak egymással, akik az első alkalommal nem táncoltak, akkor is ugyanazok elégítik ki a feladat állításának követelményeit.

Megoldásunk gondolatmenete változatlanul alkalmazható akkor is, ha nem teljes páros gráfról; hanem *teljes gráfról* beszélünk, azaz olyanról, amelyben minden szögpontpárt él köt össze. Ennek az ellenőrzését is az olvasóra hagyjuk. Megelégszünk azzal, hogy az így bizonyított állítást a következő szemléletes alakban adjuk elő: Egy társaságban egyesek ismerik egymást, mások nem; senki sem ismer mindenkit, de mindenkinek van ismerőse a társaságban; kiválasztható akkor a társaság négy tagja, s ezek leültethetők egy kerek asztal köré úgy, hogy két szomszédja közül mindenki csak az egyiket ismerje. Ehhez az eredményhez az első megoldás módszerével is könnyen eljuthattunk volna.

III. megoldás. Feltesszük, hogy a táncmulatság résztvevői közül nem választhatók ki négyen a követelményt kielégítő módon, s ebből a feltevésekből ellentmondásra következtetünk, ti. arra, hogy akkor a táncmulatságnak végtelen sok résztvevője van. Ezáltal a feladat állításának helyességét bizonyítjuk be.

Legyen L_1 az egyik lány és F_1 olyan fiú, aki táncolt L_1 -gyel. Legyen L_2 olyan lány, aki nem táncolt F_1 -gyel, és F_2 olyan fiú, aki táncolt L_2 -vel. Megállapíthatjuk, hogy F_2 táncolt L_1 -gyel, mert különben (L_1, F_1, F_2) kielégítené a feladat követelményét. Az eddig említett résztvevők közül eszerint csak L_2 és F_1 nem táncoltak egymással.

Tegyük fel, hogy már találtunk olyan

$$L_1, F_1, L_2, F_2, \dots, L_k, F_k$$

résztvevőket, akik közül ketten csak akkor nem táncoltak, ha a lány indexe a fiúnál nagyobb. Ez volt a helyzet $k = 2$ esetében. Megmutatjuk most, hogy a sorozat kiegészíthető L_{k+1}, F_{k+1} résztvevőkkel olyan módon, hogy a kiegészített sorozat is rendelkezze az eredeti sorozat tulajdonságával. Ebből majd valóban következik, hogy a kiegészítés minden határon túl folytatható, hogy tehát végtelen sok résztvevő van.

Mínt hogy F_k táncolt az L_1, \dots, L_k lányok mindegyikével, van olyan további L_{k+1} lány, akivel nem táncolt. Ez az L_{k+1} lány nem táncolt az F_1, \dots, F_{k-1} fiúkkal sem, pl. F_i -vel azért, mert különben (L_k, F_k, L_{k+1}, F_i) kielégítené a követelést. Mínt hogy L_{k+1} nem táncolt az F_1, \dots, F_k fiúk egyikével sem, van olyan további F_{k+1} fiú, akivel táncolt. Ez az F_{k+1} fiú táncolt az L_1, \dots, L_k lányokkal is, pl. L_i -vel azért, mert az ellenkező esetben $(L_i, F_i, L_{k+1}, F_{k+1})$ kielégítené feladatunk követelését. Ezek szerint a kiegészített

$$L_1, F_1, L_2, F_2, \dots, L_k, F_k, L_{k+1}, F_{k+1}$$

sorozat valóban rendelkezik a tulajdonsággal, hogy egy sorozatbeli lány és fiú csak akkor nem táncolt egymással, ha kettejük indexe közül a lányé a nagyobb.

Megjegyzés. Megoldásunk arra is rámutatott, hogy a feladat állítása végtelen sok résztvevő, pontosabban végtelen sok fiú és végtelen sok lány részvétele esetén már nem helyes. Egy ellenpéldát, talán még mindig szemléletesen, a következőképpen adhatunk elő: Egy végtelen nagy társaságban senkinek a magassága sem éri el a 180 cm-t, de bármily kevésse kisebb magasságot adunk is meg, már található olyan fiú is és olyan lány is, aki azt a magasságot eléri; minden fiú csak a nála kisebb lányokkal táncol. Könnyű ellenőrizni, hogy ekkor a feladat feltevései teljesülnek, viszont nem választható ki két fiú és két lány a feladat követelményét kielégítő módon.

Ez az ellenpélda természetesen megszővegezhető úgy is, hogy csak gráfokról szólunk. Felvetjük most a megfelelő kérdést végtelen teljes gráfokra is. Kérdezzük tehát, hogy ha egy végtelen sok szőgpontú teljes gráf éleit úgy színezzük meg két színnel, hogy egy szőgpontból se induljon ki csupa ugyanolyan színű él, vajon mindig igaz-e, hogy a gráf tartalmaz váltakozó színű négyszöget. Olyan példát adunk meg, amely mutatja, hogy ez sem igaz. Tartozzék a természetes számok mindegyikéhez egy-egy szőgpont; az a, b számokhoz tartozó szőgpontokat összekötő él legyen piros vagy kék aszerint, hogy a és b nagyobbika páros-e vagy páratlan. Könnyű ellenőrizni, hogy itt a feltételek teljesülnek, viszont váltakozó színű négyszög nem található.

IV. megoldás. Tudjuk, hogy minden fiúhoz található olyan lány, akivel nem táncolt. Lehetséges, hogy bármely két fiúhoz is található olyan, akivel egyikük sem táncolt. Talán bármely három vagy esetleg még több fiúhoz is található mindig ilyen lány. Van mindenesetre egy legnagyobb k érték, amelyre még igaz, hogy bármely k fiúhoz található olyan lány, akivel egyikük sem táncolt. Ez a k kisebb, mint a táncmulatságon résztvevő fiúk száma, hiszen minden lány táncolt legalább egy fiúval.

Mínt hogy $k + 1$ már nem rendelkezik k tulajdonságával, kiválasztható $k + 1$ fiú:

$$F_1, F_2, \dots, F_{k+1}$$

olyan módon, hogy minden lány táncolt valamelyikükkel. Ha közülük egyet, pl. F_1 -et elhagyjuk, a megmaradó k fiúhoz k tulajdonsága miatt található olyan L_1 lány, akivel egyikük sem táncolt, s ezért vele a $k + 1$ fiú közül csak F_1 táncolt. Ugyanígy okoskodhatunk, ha a $k + 1$ fiú közül nem F_1 -et, hanem egy másikat hagyunk el. Ilyen módon olyan

$$L_1, L_2, \dots, L_{k+1}$$

lányokhoz jutunk, akiknek mindegyike csak az ugyanolyan indexű fiúval táncolt a $k + 1$ fiú közül.

Mínt hogy $k \geq 1$, az F_1, F_2 fiúkról és az L_1, L_2 lányokról minden esetben szó lehet, s ezek kielégítik a feladat követelményét.

Megjegyzés. Valamivel rövidebb volna ez a megoldás, ha befejezésekor csak L_1 és L_2 létezésére következtetnénk, hiszen csak erre volt szükség. Így viszont a következő, a feladat állításánál többet mondó eredményhez is eljutottunk: Ha egy táncmulatságon minden lány táncol legalább egy fiúval, és bármely k fiúhoz található olyan lány, akivel egyikük sem táncolt, akkor kiválasztható a résztvevők közül k fiú és k lány úgy, hogy ezek mindegyike táncolt ezek valamelyikével, mégpedig mindenki csak egyvel.

Megoldásunk gondolatmenete ismét alkalmazható akkor is, ha nem egy teljes páros gráf, hanem egy teljes gráf két színnel való megszínezéséről van szó. Az olvasó könnyen ellenőrizheti, hogy így a következőképpen megfogalmazható eredményhez jutunk: Egy társaságban mindenkinek van ismerőse, de a társaság bármely k tagjához található olyan, akit egyikük sem ismer; ekkor kiválasztható a társaságnak $2k$ tagja, s ezek leültethetők egy asztal két oldalán olyan módon, hogy a szemközti oldalon ülők közül mindenki csak a vele szemben ülőt ismerje.