


I. megoldás. Helyezzük egymás mellé az $1/3^k$ oldalú négyzettől az $1/(3^{k+1} - 1)$ oldalúig valamennyit, ahol $k = 0, 1, \dots$. Közülük az első 3^k négyzet oldalának a hossza nem nagyobb $1/3^k$ -nál, a következő 3^k -é pedig $1/(2 \cdot 3^k)$ -nál, így a keletkező sor hossza nem nagyobb, mint

$$3^k \cdot (1/3^k + 1/(2 \cdot 3^k)) = 1,5.$$



Helyezzük a keletkező sorokat egymás fölé. Mindegyikben az első négyzet a legmagasabb, így az összes sorok magassága együtt

$$\frac{1}{3^0} + \frac{1}{3^1} + \frac{1}{3^2} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = 1,5.$$

II. megoldás. Helyezzük az 1 oldalú négyzet mellé az $1/2$ és $1/3$ oldalút, majd fölé az $1/4$, $1/5$, $1/6$ és $1/7$ oldalút, a továbbiakban pedig mindegyik négyzetre a fele akkora oldalút és a rákövetkezőt.

Az utóbbi kettő nyilván nem nyúlik túl az alattuk levő négyzeten, és

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} < 4 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

folytán az első négy négyzet sem az 1 oldalú négyzeten.

Az $1/k$ oldalú négyzet ($k = 4, 5, 6, 7$) és a ráhelyezettek felfelé nem nyúlnak magasabbra, mint

$$\frac{1}{k} + \frac{1}{2k} + \frac{1}{4k} + \frac{1}{8k} + \dots = \frac{2}{k} \leq \frac{1}{2},$$

így négyzeteinket elhelyeztük egy $1,5$ oldalú négyzetben.

Megjegyzés. A versenyzők nagy része először a négyzetek területösszegét becsülte meg felülről, sőt néhányan azt is tudták, hogy a területek alkotta végtelen sor összege¹ $\frac{\pi^2}{6}$. Az összeg megbecslése fölösleges már azért is, mert a négyzetek elhelyezése már ad egy ilyen felső becslést, hiszen a befoglaló négyzet területe, $2,25$, felső korlát.


A második megoldás érdekessége az, hogy meglepően jó felső korlátot lehet belőle leolvasni. Valóban, a megoldás végén azt nyertük, hogy az $1/k$ oldalú négyzet és a ráhelyezettek benne vannak egy $2/k$, $1/k$ oldalú téglalapban ($k = 4, 5, 6, 7$), így az összes négyzetek együttes területe nem nagyobb, mint

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + 2 \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \frac{1}{36} + \frac{1}{49} \right) < 1,663, \quad \text{míg} \quad \frac{\pi^2}{6} = 1,6449 \dots$$

b) Az 1 és a $0,5$ oldalú négyzet nem helyezhető el átfedés nélkül $1,5$ -nél kisebb oldalú négyzetben.

I. megoldás. Helyezkedjék el az 1 oldalú \mathbf{N}_1 és az $1/2$ oldalú \mathbf{N}_2 négyzet egy \mathbf{N} négyzetben úgy, hogy ne legyen közös belső pontjuk. Ekkor van olyan e egyenes, amelynek \mathbf{N}_1 és \mathbf{N}_2 ellenkező oldalán fekszik. Ha e párhuzamos \mathbf{N} valamelyik oldalával, akkor két téglalapra bontja azt, és mindegyiknek az e -re merőleges oldala legalább akkora, mint a sávban fekvő négyzet oldala. Ez esetben tehát \mathbf{N} oldala legalább akkora, mint \mathbf{N}_1 és \mathbf{N}_2 oldalának összege.

¹Lásd pl. *Skljarszkij-Cscencov-Jaglom*: Válogatott feladatok és tételek az elemi matematika köréből I. Aritmetika és algebra. Tankönyvkiadó, Budapest, 1965. 298–299. old.




1. ábra

Ha e metszi \mathbf{N} mindegyik oldalegyenesét, akkor vegyük mindkét oldalán \mathbf{N} -nek a tőle legtávolabbi C_1 , ill. C_2 csúcsát. A C_1 -en, ill. C_2 -n átmenő oldalegyenesek e -vel egy \mathbf{H}_1 , ill. \mathbf{H}_2 derékszögű háromszöget alkotnak, amelyek \mathbf{N}_1 -et, ill. \mathbf{N}_2 -t tartalmazza. Állításunk bizonyítására elég azt megmutatni, hogy *egy derékszögű háromszög tartalmazta négyzetek közül az a legnagyobb, amelyiknek két oldala a háromszög befogóin nyugszik, egy csúcsa pedig az átfogón van.*


Valóban, ha ez igaz, akkor a \mathbf{H}_1 -ben és \mathbf{H}_2 -ben elhelyezhető legnagyobb négyzet átlója, \mathbf{N} -nek a C_1C_2 átlójára esik, és mivel a négyzetek nem fedhetik át egymást, így átlóik összege \mathbf{N} átlóját, oldalhosszaik összege tehát \mathbf{N} oldalát adja, vagyis igaz a bizonyítandó állítás is.

A továbbiakban a fent megfogalmazott segédtevélt bizonyítjuk.

Az ABC derékszögű háromszögben levő tetszés szerinti $KL MN$ négyzetet elmozgathatjuk úgy, hogy két csúcsa, mondjuk K és L az AC , ill. BC befogón legyen – ha nem lett volna így eredetileg –, majd C -ből nagyítva, ha kell, elérhetjük, hogy egy csúcs az átfogóra kerüljön. Elég tehát az ilyen helyzetű négyzeteket vizsgálni. Ezek középpontja a háromszög derékszögének szögfelezőjén van. Forgassuk el ugyanis a négyzetet a középpontja körül derékszöggel úgy, hogy az AC -n levő csúcsa a BC -n levőbe menjen át. Ekkor az AC egyenes is átmegy BC -be, így a középpont e két egyenestől egyenlő távolságban van, tehát rajta van a köztük levő szög felezőjén.



2. ábra



3. ábra

Annak a négyzetnek, amelyiknek az egyik csúcsa C -be esik, az ezzel szemközti csúcsa nincs közelebb C -hez, mint a C -ből induló szögfelező MN -nel való P metszéspontja. Elég tehát megmutatnunk, hogy ha K és L különbözik C -től, akkor $CP > KM$.

Toljuk el CP -t párhuzamosan a KP_1 helyzetbe, ekkor a KP_1M háromszög két oldalát kell összehasonlítani. Ezt a velük szemben levő szögek közvetítésével fogjuk megtenni. A KM -mel, ill. KP_1 -gyel szemközti szög PP_1M -gel, ill. PMP_1 -gel nagyobb 45° -nál.

Jelöljük KP_1 és MN metszéspontját R -rel, R vetülete PP_1 -en legyen S . P_1RS háromszög derékszögű és egyenlő szárú, továbbá S a P és P_1 pont közt van, így

$$PRP_1 \sphericalangle > SRP_1 \sphericalangle = PP_1R \sphericalangle,$$

amiből következik, hogy

$$PP_1 > PR.$$

Azt is tudjuk, hogy CP felezi KM -et, így felezi MR -t is, mert KR és CP párhuzamos. Ezért

$$MP = PR < PP_1, \quad \text{tehát} \quad MP_1P \sphericalangle < PMP_1 \sphericalangle.$$

De ekkor egyszersmind

$$MP_1K \sphericalangle = MP_1P \sphericalangle + 45^\circ < PMP_1 \sphericalangle + 45^\circ = KMP_1 \sphericalangle,$$

amiből viszont

$$KM < KP_1 = CP$$

következik, és ezt akartuk bizonyítani.

Megjegyzés. Gyorsabban befejezhetjük a bizonyítást a kerületi szögek tételének felhasználásával: C , K , P és M egy körön van, mert KP 45° -os szögben látszik C -ből is, M -ből is. A kör középpontja a CP és KM húr felező merőlegesének metszéspontja. Mivel az előbbi húr átmegy az utóbbi felezőpontján, a húrok középponttól mért távolságai egy derékszögű háromszög befogója és átfogója. A KM húrtól mért távolság az átfogó, tehát a nagyobbik, így a KM húr a kisebb.

II. megoldás. Azt mutatjuk meg, hogy ha egy $K_0L_0M_0N_0 = \mathbf{N}_0$ négyzetet egy olyan $KLMN = \mathbf{N}$ helyzetbe mozdítunk el a síkban, hogy K és L csúcsa a K_0N_0 , ill. K_0L_0 félegyenesen maradjon, akkor \mathbf{N} tartalmazni fogja az M_0 csúcsot. Ez valóban azt jelenti, hogy ha \mathbf{N} benne van egy derékszögű háromszögben, amelyiknek derékszöge az $L_0K_0N_0 \sphericalangle$, akkor írható a háromszögbe \mathbf{N} -nél nagyobb négyzet, amelyiknek két oldala a befogókon nyugszik.

Forgassuk először el a négyzetet a középpontja körül \mathbf{N}_0 körüljárásával ellentétes irányba hegyes szöggel, a $K_1L_1M_1N_1 = \mathbf{N}_1$ helyzetbe, majd toljuk el a végleges helyére. K_1 és L_1 egyenlő távol van \mathbf{N}_0 megfelelő oldalától a forgatás következtében. Rajzoljunk olyan négyzeteket, amelyeknek egyik csúcsa K_1 , ill. L_1 , másik két csúcsa \mathbf{N}_0 legközelebbi oldalán van és K_1 -ből, ill. L_1 -ből induló átlója K_0M_0 -lal párhuzamos. Ekkor a kérdéses átlók egyenlők lesznek, így megadják a kívánt eltolás vektorát.

Azt kell még belátnunk, hogy az eltolás hossza nagyobb, mint a K_0M_0 szakasz \mathbf{N}_1 -en túlnyúló darabja. Azonban M_0 távolsága M_1N_1 -től ugyanakkora, mint K_1 -é K_0N_0 -tól, mert K_1N_1 és M_0N_0 , továbbá M_1L_1 és K_0L_0 a két négyzet közös beírt körének egymással átellenes érintőpárjai, így metszéspontjaik összekötő egyenesére tükrözve a két négyzetet egymásba mennek át. Rajzoljuk meg azokat a négyzeteket, amelyeknek egyik csúcsa M_0 és két-két csúcsuk M_1N_1 -en

van, ezek egyike tartalmazza a kérdéses szakaszt, az tehát nem nagyobb, mint a négyzet átlója, aminek hossza viszont éppen az eltolás hossza. Ezzel ismét igazoltuk a segéd-tétel állítását.

Megjegyzés. A bizonyításban nem használtuk ki, hogy a nagy négyzetben tartalmazott két négyzet oldalának hossza 1 és $1/2$ egység, így a b) részben azt bizonyítottuk be, hogy *ha egy N négyzetben elhelyezhető egy N_1 és N_2 négyzet úgy, hogy ne legyen közös belső pontjuk, akkor N oldalának hossza legalább akkora, mint N_1 és N_2 oldalhosszának az összege.* Ez lényegében megegyezik a P. 208. pontversenyen kívüli problémával², így a fentiekben annak is megoldását adtuk.

²Lásd KÖMAL 48. kötet 3. szám 126. oldal.