

Állapítsuk meg első sorban a másodfokú görbe nemét. Erre nézve a quadratikus tagok nyújtanak felvilágosítást. Ugyanis ezek

$$(I.) \quad 4(x^2 - 2xy + y^2) = 4(x - y)^2$$

szerint teljes négyzetet alkotnak, tehát parabolával – esetleg elfajuló parabolával<sup>1</sup> – van dolgunk, melynek a végtelenben két összeeső pontja van az  $x - y = 0$  egyenes által meghatározott irányban. Ezen irány azonban a parabola tengelyének iránya. Az  $x - y = 0$  egyenes irányhatározója  $\operatorname{tg} \alpha = 1$ .

Ha meghatározzuk a parabolának az  $X$ -, ill.  $Y$ -tengellyel való metszéspontjait, nyilvánvalóvá válik, hogy a parabola tengelye  $\alpha = 45^\circ$ -ú szöget zár be az  $X$  tengellyel.<sup>2</sup>

Állapítsuk meg most a görbe egyenletét oly derékszögű  $(x', y')$  koordinátarendszerben, mely az eredetiből, a kezdőpont körüli elforgatásból származik. Az elforgatás szöge pedig legyen  $\alpha = +45^\circ$ . Ha valamely pont koordinátái az eredeti rendszerben  $(x, y)$ , az új rendszerben  $(x', y')$ , akkor az új n. transzformációs összefüggések:

$$x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha = x' \cos 45^\circ - y' \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y')$$

$$y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha = x' \sin 45^\circ + y' \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y').$$

Helyettesítsünk ezek szerint a görbe egyenletébe; keletkezik:

$$2(x' - y')^2 - 4(x'^2 - y'^2) + 2(x' + y')^2 + 4\sqrt{2}(x' - y') - 8\sqrt{2}(x' + y') + 3 = 0.$$

Összevonás után:

$$8y'^2 - 4\sqrt{2}x' - 12\sqrt{2}y' + 3 = 0$$

vagy

$$(II.) \quad x' = \sqrt{2}y'^2 - 3y' + \frac{3}{4\sqrt{2}}$$

$$\frac{x'}{\sqrt{2}} = y'^2 - \frac{3}{\sqrt{2}}y' + \frac{3}{8} = \left(y' - \frac{3}{2\sqrt{2}}\right)^2 - \frac{3}{4} \dots$$

Ebből az egyenletből már világosan látjuk, hogy oly parabolával van dolgunk, melynek tengelye párhuzamos az új koordinátarendszer  $X'$ -tengelyével; csúcspontjának koordinátái

$$y'_0 = \frac{3}{2\sqrt{2}}, \quad x'_0 = -\frac{3}{2\sqrt{2}}.$$

A csúcspont koordinátái az eredeti rendszerben

$$x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}(x'_0 - y'_0) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(-\frac{3}{2\sqrt{2}} - \frac{3}{2\sqrt{2}}\right) = -\frac{3}{2},$$

$$y_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}(x'_0 + y'_0) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(-\frac{3}{2\sqrt{2}} + \frac{3}{2\sqrt{2}}\right) = 0,$$

azaz a parabola csúcspontja az  $X$ -tengelyen fekszik.

A parabola tengelyének egyenlete – az  $(x, y)$  rendszerben:

$$y = x + \frac{3}{2}.$$


A parabola megszerkesztéséhez ismernünk kell még a gyújtópont helyzetét. A II. egyenletből kiolvashatjuk, hogyha a parabola paramétere  $p$ , akkor

$$2p = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad p = \frac{1}{2\sqrt{2}}, \quad \frac{p}{2} = \frac{1}{4\sqrt{2}}.$$

<sup>1</sup>Két párhuzamos egyenesből álló egyenespár.

<sup>2</sup>Az  $X$ -tengellyel való metszéspontokra nézve  $y = 0$ , tehát ezek abszcisszái I. szerint a  $4x^2 + 8x + 3 = 0$  egyenlet gyökei:  $-\frac{3}{2}$  és  $-\frac{1}{2}$ .

Az  $Y$ -tengellyel való metszéspontokra  $x = 0$ ; ezek ordinátái I. szerint a  $4y^2 - 16y + 3 = 0$  egyenlet gyökei:  $2 - \frac{\sqrt{13}}{2}$  és  $2 + \frac{\sqrt{13}}{2}$ .



A gyújtópont az  $X'$  tengellyel párhuzamos egyenesen fekszik, a csúcstól  $\frac{p}{2}$  távolságban; ezért a gyújtópont koordinátái az  $(x', y')$  rendszerben:

$$x'_1 = -\frac{3}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{4\sqrt{2}} = -\frac{5}{4\sqrt{2}}, \quad y'_1 = \frac{3}{2\sqrt{2}}.$$

Az eredeti  $(x, y)$  rendszerben

$$x_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \left( -\frac{5}{4\sqrt{2}} - \frac{3}{2\sqrt{2}} \right) = -\frac{11}{8}, \quad y_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \left( -\frac{5}{4\sqrt{2}} + \frac{3}{2\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{8}.$$

A csúcspont és a gyújtópont meghatározzák a parabola vezérvonalának helyzetét is.  $\left( x + y = -\frac{7}{4} \right)$

*Csáki Frigyes* (Bolyai g. VIII. o. Bp. V.)