

I. Megoldás. a) Ha $\frac{x(x+1)}{x-1} > 3$, akkor

$$\frac{x(x+1)}{x-1} - 3 > 0, \quad \text{ill.} \quad \frac{x(x-1) - 3(x-1)}{x-1} = \frac{x^2 - 2x + 3}{x-1} > 0.$$

Azonban $x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2 > 0$ az x bármely értékénél és így akkor van kielégítve az egyenlőtlenség, ha

$$x-1 > 0, \quad \text{azaz} \quad x > 1.$$

b) Ebben az esetben $\frac{x(x+1)}{x-1} - 6 = \frac{x(x+1) - 6(x-1)}{x-1} = \frac{x^2 - 5x + 6}{x-1} > 0$.

Mint hogy $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$, kell, hogy legyen:

$$\frac{(x-2)(x-3)}{x-1} > 0 \quad \text{vagy} \quad (x-2)(x-3)(x-1) > 0.$$

Ez bekövetkezik akkor, ha a baloldali tényezők mindegyike pozitív, azaz ha $x > 3$, vagy pedig, ha egyik tényező pozitív, a másik kettő negatív. Utóbbi eset akkor áll elő, ha $1 < x < 2$.¹

Sándor Gyula (Kölcsey Ferenc rg. VI. o. Bp. VI.)

II. Megoldás. Ábrázoljuk az

$$y = \frac{x^2 + x}{x-1} = \frac{x(x+1)}{x-1}$$

függvényt. Ennek oly hiperbola felel meg, melynek egyik aszimptotája az $x = 1$ egyenes.

Ha $x = -\infty$, akkor $y = -\infty$. Mindaddig, amíg $x < -1$, $y < 0$, $x = -1$ és $x = 0$ helyeken $y = 0$. A $-1 < x < 0$ közben $y > 0$.


A $0 < x < 1$ közben $y < 0$ és ha x közeledik ezen közben az 1-hez, y a $-\infty$ felé tart.

Ha $x > 1$, akkor $y > 0$, még pedig $+\infty$ -től csökken egy bizonyos értékig, azután a $+\infty$ felé tart.

A függvény ábrázolására szolgáljon a következő értéktáblázat:

x	$-\infty$...	-3	-2	-1	-0,42	0	0,5	+1
y	$-\infty$	↗	-1,5	$-\frac{2}{3}$	0	0,17 max	0	-2,5	$-\infty$

+1		2	2,41	3	4	...	$+\infty$
$+\infty$	↘	6	5,83 min	6	$\frac{20}{3}$	↗	$+\infty$



¹ Ha $x < 1$, mindegyik tényező negatív.

Ha $2 < x < 3$, akkor $x-3 < 0$, a másik két tényező pozitív.

A grafikonból látjuk, hogy, ha $x > 1$, $y > 3$, mert hiszen y legkisebb értéke $3 + 2\sqrt{2}$.

$$y > 6, \quad \text{ha } 1 < x < 2 \quad \text{és ha } x > 3.$$

Amigo György (Izr. rg. VI. o. Debrecen).

Kiegészítés. x minden értékéhez – az $x = 1$ helyet kivéve – tartozik egy – és csakis egy y érték. Megfordítva: nem minden y értékhez tartozik x érték.

Rendezzük a függvény-kapcsolatot x szerint. A tört eltávolítása után keletkezik:

$$x^2 + (1 - y)x + y = 0.$$

Adott y értékhez akkor kapunk x értéket, ha ezen egyenlet discriminánása

$$D \equiv (1 - y)^2 - 4y \geq 0, \quad \text{ill.} \quad D \equiv y^2 - 6y + 1 \geq 0.$$

Ha $D = 0$, akkor $x_1 = x_2 = \frac{y - 1}{2}$.

Ha $D > 0$, akkor az egyenletnek két különböző valós gyöke van.

$D = 0$, ha $y = 3 \pm 2\sqrt{2}$. Ezen értékek mindegyikéhez egy x érték tartozik. Még pedig $y = 3 - 2\sqrt{2} \sim 0,17$, a függvény maximuma²; ez akkor áll elő, ha $x \sim -0,42$.

$y = 3 + 2\sqrt{2} \sim 5,83$, a függvénynek minimuma és ekkor $x \sim 2,41$.³

Ha már most $3 - 2\sqrt{2} < y < 3 + 2\sqrt{2}$, akkor x nem valós. Más szóval: ha az X -tengellyel párhuzamosan, tőle $3 - 2\sqrt{2}$, ill. $3 + 2\sqrt{2}$ távolságban egyeneseket húzunk, ezek a görbe egy-egy ágát érintik a felső, ill. alsó tetőpontjukban. E két egyenes közötti síkrészen a görbének nincs pontja. A görbe pontjai csak az $y \leq 3 - 2\sqrt{2}$ ill. $y \geq 3 + 2\sqrt{2}$ értékekhez tartoznak.

Az $(x = 1, y = 3)$ pont a görbe középpontja. Ezen ponton keresztül húzható a hiperbola másik aszimptotája, mely az X -tengelyhez 45° -ú szög alatt hajlik.

²Felső tetőpont a görbe azon ágán, mely az $x = 1$ egyenestől balra fekszik.

³Alsó tetőpont a görbe másik ágán.