


**I. megoldás.** Ha az  $ABCD$  négyszög paralelogramma, akkor a középvonala felezi a paralelogramma kerületét és területét is.

Tegyük fel, hogy az  $ABCD$  trapéz nem paralelogramma, mégis létezik az alapjaival párhuzamos  $EF$  szakasz, amely a trapéz kerületét és területét is felezi.

Húzzunk párhuzamost (az *ábra* szerint)  $C$ -n keresztül  $AD$ -vel, ez az  $EF$  szakaszt  $G$ -ben, az  $AB$  szakaszt  $H$ -ban metszi.



A  $HBC$  háromszög hasonló a  $GFC$  háromszöghöz. Legyen  $EF = x$ . A  $HBC$  háromszög magassága legyen  $M$ , a  $GFC$  háromszögé pedig  $m$ . A hasonlóság miatt

$$\frac{m}{M} = \frac{GF}{HB} = \frac{x - c}{a - c}.$$

Feltevésünk szerint  $EF$  felezi a trapéz területét:  $t_{EFCD} = \frac{1}{2}t_{ABCD}$ , azaz

$$\frac{x + c}{2}m = \frac{1}{2} \cdot \frac{a + c}{2}M, \quad (x + c)\frac{m}{M} = \frac{a + c}{2}.$$

A hasonlóságot felhasználva:  $(x + c)\frac{x - c}{a - c} = \frac{a + c}{2}$ , ezért

$$x^2 - c^2 = \frac{a^2 - c^2}{2}, \quad x^2 = \frac{a^2 - c^2}{2} + c^2 = \frac{a^2 + c^2}{2}, \quad x = \sqrt{\frac{a^2 + c^2}{2}}.$$

A  $HBC$  és  $GFC$  háromszög hasonlósága miatt  $\frac{CF}{b} = \frac{DE}{d} = \frac{x - c}{a - c}$ , ahonnan

$$CF = \frac{b(x - c)}{a - c} \quad \text{és} \quad DE = \frac{d(x - c)}{a - c}.$$

Tegyük fel ezután, hogy az  $EF$  szakasz a trapéz kerületét is felezi:

$$AB + BF + EA = FC + CD + DE,$$

$$a + b - CF + d - DE = FC + c + DE,$$

$$a - c + b + d = 2FC + 2DE,$$

$$a - c + b + d = 2\frac{b(x - c)}{a - c} + 2\frac{d(x - c)}{a - c},$$

$$a - c + b + d = \frac{2(b + d)(x - c)}{a - c} = \frac{2(b + d)\left(\sqrt{\frac{a^2 + c^2}{2}} - c\right)}{a - c},$$

$$(a - c)^2 + (a - c)(b + d) = (b + d)\left(\sqrt{2a^2 + 2c^2} - 2c\right),$$

$$(a - c)^2 = (b + d)\left(\sqrt{2a^2 + 2c^2} - a - c\right).$$

Fejezzük ki ebből  $(b + d)$ -t:

$$b + d = \frac{(a - c)^2}{\sqrt{2a^2 + 2c^2} - (a + c)}.$$

A nevező gyöktelenítése után:  $b + d = \sqrt{2a^2 + 2c^2} + a + c$ .

A fenti gondolatmenet lényegében megfordítható: ha a trapéz (nem paralelogramma) oldalaira teljesül a talált egyenlőség, akkor van olyan alapjaival párhuzamos egyenes, ami a kerületét és a területét is felezi, tehát a feladat kérdésére a válasz tagadó.

Ilyen trapéz valóban létezik: ha például  $a = 2$ ,  $c = 1$  és  $b = d$ , akkor a fenti egyenlőségbe behelyettesítve

$$b = d = \frac{3 + \sqrt{10}}{2} > \frac{1}{2} = \frac{a - c}{2},$$

tehát ezek egy létező szimmetrikus trapéznek az adatai.

*Poronyi Balázs* (Pécs, Janus Pannonius Gimn., 10. évf.)

**II. megoldás.** Legyenek a trapéz párhuzamos oldalai  $a + c$  és  $a$ , szárjai  $b$  és  $d$ . Ahhoz, hogy ilyen trapéz létezzen, szükséges és elegendő, hogy a  $b$ ,  $c$ ,  $d$  hosszúságok kielégítsék a háromszög egyenlőtlenségeket.

Tekintsünk egy  $e$  egyenest, ami párhuzamos a trapéz alapjaival, és a hosszabb és a rövidebb alap közötti távolságot  $x : (1 - x)$  arányban osztja. Az  $e$  egyenes pontosan akkor felezi a trapéz kerületét, ha  $2a + b + c + d = 2(a + c + bx + dx)$ , azaz  $(1 - 2x)(b + d) = c$ .

Annak a feltétele pedig, hogy az  $e$  egyenes felezze a trapéz területét is:  $2a + c = 2x[2a + (2 - x)c]$ , hiszen az  $e$  egyenesből a trapéz egy  $a + (1 - x)c$  hosszúságú szakaszt metsz ki.

A feltételt a következő alakban is írhatjuk:  $2a(1 - 2x) = (-2x^2 + 4x - 1)c$ .

Látható, hogy mind  $1 - 2x$ , mind  $-2x^2 + 4x - 1$  pozitív kell legyen, ehhez megfelelő például az  $x = \frac{1}{3}$  választás. Ebben az esetben feltételeink  $b + d = 3c$  és  $6a = c$  alakban írhatók fel.

Ha például  $a = 1$ ,  $c = 6$ ,  $b = 8$  és  $d = 10$ , akkor valóban létezik olyan trapéz, melynek alapjai 7 és 1, szárjai 8 és 10 egység hosszúak, és az alapok távolságát 1 : 2 arányban osztó egyenes a trapéz kerületét és területét is két egyenlő részre osztja. Tehát a feladat kérdésére a válasz nemleges.