


**I. megoldás.** Legyenek a háromszög szögfelezőinek a szemközti oldalszakaszokkal vett metszéspontja  $A'$ ,  $B'$ ,  $C'$ , a  $KN$  és  $BB'$  egyenes metszéspontja  $X$ . A megoldásunk során nem előjeles szakaszokkal dolgozunk.

A szögekre vonatkozó feltételből következik, hogy az  $AC$  egyenesen a pontok sorrendje  $A, P, B', Q, C$  (hiszen  $ABP\triangleleft < ABB'\triangleleft$ , valamint  $CBQ\triangleleft < CBB'\triangleleft$ ), valamint az, hogy a  $BB'$  nemcsak az  $ABC\triangleleft$ , hanem a  $PBQ\triangleleft$  szögfelezője is, hiszen

$$PBB'\triangleleft = ABB'\triangleleft - ABP\triangleleft = B'BC\triangleleft - QBC\triangleleft = B'BQ\triangleleft.$$



Mivel  $AA'$ ,  $BB'$ ,  $CC'$  szögfelezők, egy pontban metszik egymást, tehát a  $KM$ ,  $BX$  és  $NL$  egyenesek is egy pontban metszik egymást, hiszen azonosak az előbb felsorolt egyenesekkel. Így a  $BKN$  háromszögre felírható a Ceva-tétel:

$$\frac{KL}{LB} \cdot \frac{BM}{MN} \cdot \frac{NX}{XK} = 1.$$

Messe az  $LM$  és  $KN$  egyenes az  $AC$  oldalegyenesét a  $T_1$ , illetve a  $T_2$  pontban. A Menelaosz-tétel szerint a  $BPQ$  háromszögre és a  $BP$  és  $BQ$  oldalakat metsző  $LM$  egyenesre:

$$\frac{PL}{LB} \cdot \frac{BM}{MQ} \cdot \frac{QT_1}{T_1P} = 1,$$

a  $BPQ$  háromszögre és a  $BP$  és  $BQ$  oldalakat metsző  $KN$  egyenesre:

$$\frac{PK}{KB} \cdot \frac{BN}{NQ} \cdot \frac{QT_2}{T_2P} = 1.$$

Megmutatjuk, hogy  $\frac{QT_1}{T_1P} = \frac{QT_2}{T_2P}$ . Mivel

$$\frac{PL}{LB} \cdot \frac{BM}{MQ} \cdot \frac{QT_1}{T_1P} = \frac{PK}{KB} \cdot \frac{BN}{NQ} \cdot \frac{QT_2}{T_2P},$$

a bizonyítandó állítással ekvivalens a következő:

$$\frac{PL}{LB} \cdot \frac{BM}{MQ} = \frac{PK}{KB} \cdot \frac{BN}{NQ}.$$

Mivel a  $CC'$  az  $ACB$  szög felezője, a  $PCB\triangleleft$  szögfelezője is, tehát  $CL$  szögfelezője a  $PCB$  szögnek. Hasonlóan adódik, hogy  $AM$  a  $QAB\triangleleft$  szögfelezője,  $AK$  a  $PAB\triangleleft$  szögfelezője,  $CN$  pedig a  $QCB\triangleleft$  szögfelezője, azaz

$$\begin{aligned} \text{a } QAB \text{ háromszögre: } \frac{QM}{MB} &= \frac{QA}{PA}, \\ \text{a } PAB \text{ háromszögre: } \frac{PK}{PB} &= \frac{AB}{PB}, \\ \text{a } PCB \text{ háromszögre: } \frac{LB}{LN} &= \frac{CB}{CN}, \\ \text{a } QCB \text{ háromszögre: } \frac{LN}{NB} &= \frac{CB}{CN}. \end{aligned}$$

Tehát a bizonyítandó  $\frac{PL}{LB} \cdot \frac{BM}{MQ} = \frac{PK}{KB} \cdot \frac{BN}{NQ}$  állítás ekvivalens ezzel:

$$\frac{PC}{CB} \cdot \frac{AB}{QA} = \frac{PA}{AB} \cdot \frac{CB}{QC},$$

átrendezve:

$$\frac{AB}{CB} \cdot \frac{AB}{CB} = \frac{PA}{QC} \cdot \frac{QA}{PC}.$$

A szinusztételt felhasználva:

$$\frac{AB}{AP} \cdot \frac{QC}{BC} = \frac{\sin \angle APB \cdot \sin \angle QBC}{\sin \angle ABP \cdot \sin \angle BQC} = \frac{\sin \angle APB}{\sin \angle BQC},$$

hiszen  $\angle ABP = \angle QBC$ .

Hasonlóan:

$$\frac{BC}{CP} \cdot \frac{AQ}{AB} = \frac{\sin \angle BPC \cdot \sin \angle ABQ}{\sin \angle PBC \cdot \sin \angle AQB} = \frac{\sin \angle BPC}{\sin \angle AQB},$$

hiszen  $\angle PBC = \angle ABC - \angle ABP = \angle ABC - \angle QBC = \angle ABQ$ .

Mivel  $\angle APB = 180^\circ - \angle BPC$  és  $\angle BQC = 180^\circ - \angle AQB$ , így

$$\frac{AB}{AP} \cdot \frac{QC}{BC} = \frac{\sin \angle APB}{\sin \angle BQC} = \frac{\sin \angle BPC}{\sin \angle AQB} = \frac{BC}{CP} \cdot \frac{AQ}{AB}, \quad \text{azaz} \quad \frac{AB}{CB} \cdot \frac{AB}{CB} = \frac{PA}{QC} \cdot \frac{QA}{PC}.$$

Ezt kellett belátnunk. Így  $\frac{QT_1}{T_1P} = \frac{QT_2}{T_2P}$ .

A  $T_1$  pont nyilván nem lehet a  $PQ$  szakasz belső pontja. Ha  $\frac{QT_1}{T_1P} > 1$ , akkor  $QT_1 > T_1P$ , tehát  $T_1$  a  $PQ$  egyenes  $P$ -t nem tartalmazó félegyenesének eleme. Ha  $\frac{QT_1}{T_1P} < 1$ , akkor  $QT_1 < T_1P$ , tehát  $T_1$  a  $PQ$  egyenes  $Q$ -t nem tartalmazó félegyenesének eleme. Ha  $\frac{QT_1}{T_1P} = 1$  lenne, akkor  $\angle ABP = \frac{1}{2}\angle ABC$ , ami nem megengedett.

Legyen adott  $T_1$ . Ha  $T_1 = T_2$ , akkor nyilván teljesül, hogy  $\frac{QT_1}{T_1P} = \frac{QT_2}{T_2P}$ . Más  $T_1$  pontra pedig ez nem teljesül, hiszen  $T_2$  ugyanazon a félegyenesen van, mint  $T_1$  (tehát vagy a  $P$ -t vagy a  $Q$ -t nem tartalmazó  $PQ$  félegyenesen). Ekkor a  $P, Q, T_1$  pontok sorrendje adott, az általánosság megszorítása nélkül feltehető, hogy  $T_1$  a  $PQ$  félegyenes  $P$ -t nem tartalmazó félegyenesén van, tehát  $T_2P > QT_2$ . Ha  $T_2$ -t  $P$ -től (és egyben  $Q$ -tól) távolítjuk  $k$ -val, akkor

$$\frac{QT_2 + k}{T_2P + k} = 1 + \frac{QT_2 + k - T_2P - k}{T_2P + k} < 1 + \frac{QT_2 - T_2P}{T_2P} = \frac{QT_2}{T_2P},$$

tehát az arány csökken.


Hasonlóan látható, hogy ha közelítjük, akkor az arány nő, azaz

$$\frac{QT_2 - k}{T_2P - k} = 1 + \frac{QT_2 - k - T_2P + k}{T_2P - k} > 1 + \frac{QT_2 - T_2P}{T_2P} = \frac{QT_2}{T_2P},$$

tehát adott  $T_1$ -hez csak egy megfelelő  $T_2$  van. Ehhez hasonlóan belátható az is, ha a  $T_1$  (és egyben a  $T_2$ ) a  $PQ$  egyenes  $Q$ -t nem tartalmazó félegyenesén van, akkor is csak egy  $T_2$  van adott  $T_1$ -hez.

Ezzel a feladat állítását beláttuk.

**II. megoldás.** Azt fogjuk belátni, hogy az  $AL$  és  $CM$  egyenesek a  $B$ -ből induló szögfelezőn metszik egymást, ugyanis ez ekvivalens az eredeti állítással. Ha ugyanis ez valóban teljesül, akkor az  $AKL$  és  $CNM$  háromszögek egyenesre nézve perspektívek, tehát ekkor pontra nézve is perspektívek, vagyis az  $AC, KN, ML$  egyenesek is egy ponton mennek át (Desargues-tétel).



$AK, CN$  és  $BE$  szögfelezők. Írjunk fel a trigonometrikus Ceva-tételeket szögekre.

A  $BL, AL$  és  $CL$  egyenesek egy ponton mennek át, tehát

$$(1) \quad \frac{\sin \angle ABL \cdot \sin \angle BCL \cdot \sin \angle CAL}{\sin \angle BAL \cdot \sin \angle LCA \cdot \sin \angle LBC} = 1.$$

A  $CM, AM$  és  $BM$  egyenesek is egy ponton mennek át, tehát

$$(2) \quad \frac{\sin \angle ABM \cdot \sin \angle BCM \cdot \sin \angle CAM}{\sin \angle BAM \cdot \sin \angle CBM \cdot \sin \angle ACM} = 1.$$

Azt kell belátnunk, hogy

$$(3) \quad \frac{\sin \angle CAL \cdot \sin \angle ABE \cdot \sin \angle BCM}{\sin \angle EBC \cdot \sin \angle BAL \cdot \sin \angle ACM} = 1.$$

Vegyük észre, hogy  $\angle ABE = \angle ECB$ , mivel  $BE$  szögfelező, tehát szinuszuk is egyenlő, így (3)-ból a bizonyítandó állítás:

$$(4) \quad \frac{\sin \angle CAL \cdot \sin \angle BCM}{\sin \angle BAL \cdot \sin \angle ACM} = 1.$$

Mivel  $CL$  szögfelező,  $\angle BCL = \angle LCA$ , emiatt (1)-ből

$$(5) \quad \frac{\sin \angle ABL \cdot \sin \angle CAL}{\sin \angle BAL \cdot \sin \angle LBC} = 1.$$

Mivel  $AM$  szögfelező,  $\angle BAM = \angle CAM$ , emiatt (2)-ből

$$(6) \quad \frac{\sin \angle ABM \cdot \sin \angle BCM}{\sin \angle CBM \cdot \sin \angle ACM} = 1.$$

Tudjuk továbbá azt is, hogy  $\angle ABL = \angle CBM$  és  $\angle ABM = \angle CBL$ , tehát ezek szinusza is egyenlő.

Az (5) és (6) egyenleteket összeszorozzuk, ekkor megkapjuk (4)-et:

$$\begin{aligned} \frac{\sin \angle ABL \cdot \sin \angle CAL}{\sin \angle BAL \cdot \sin \angle LBC} \cdot \frac{\sin \angle ABM \cdot \sin \angle BCM}{\sin \angle CBM \cdot \sin \angle ACM} &= 1, \\ \frac{\sin \angle CAL}{\sin \angle BAL} \cdot \frac{\sin \angle BCM}{\sin \angle ACM} &= 1. \end{aligned}$$

Tehát teljesül a feladat állítása.

*Megjegyzés.* A feladat projektív geometriai eszközökkel is megoldható. Ha a beírt kör középpontja  $I$ , és a  $BA, BP, BI, BQ, BC$  egyeneseket rendre  $a, p, i, q, c$ -vel jelöljük, akkor

$$(I, A, K, M) = (i, a, p, q) = (i, c, q, p) = (I, C, N, L)$$

(ahol a zárójelek a megfelelő kettősviszonyokat jelölik). Az  $I, A, K, M$  és az  $I, C, N, L$  pontnégyesek tehát perspektívek, és ezért az  $AC, KN$  és  $ML$  egyenesek egy ponton mennek át.