


E szofista filozófusról nem tudunk sokat. Elisben született 460 körül Kr. e., Sokrates kortársa volt. Filozófiájának veleje az önmelegedés volt. Határtalan hiúsága által azonban nevetségessé tette magát; azt állította ugyanis, hogy mindent tud s arra is ajánlkozott, hogy minden kérdésre megfelel. Mit tudott és miként felelt meg esetleg a kérdésekre, azt nem tudjuk, de vannak adataink egy igen érdekes szerkesztésről, melyet Kr. e. 420 körül ő végzett. A gondolatot hozzá alkalmasint Pythagoras iskolája szolgáltatta. Ott ugyanis sokat foglalkoztak szabályos sokszögeknek a körbe való szerkesztésével; láttuk, hogy már a szabályos ötszöggel is foglalkoztak. A feladat az volt tehát: a 360° -ú szöget szerkesztés útján tetszőleges számú, egyenlő részekre felosztani.

Hippias nyilván e feladatból kiindulva, azt a még általánosabb feladatot tűzte ki magának célul: bármely szöget szerkesztés segélyével tetszőleges számú, egyenlő vagy pedig bizonyos arány szerint megadott részekre osztani. Ez általános feladat egyik speciális esete a szögnek három egyenlő részre való osztása, a triszekció; úgy látszik, ez a feladat foglalkoztatta előbb Hippiast és ennek a feladatnak a megoldása -már a mennyiben azt megoldásnak minősíthetjük- foglalta magában egyszersmind az általános feladat megoldását is. A feladat megoldására egy görbe vonalat szerkesztett, mely tulajdonképpen egy mozgási problémára vezethető vissza. Egy körnek OA sugara egyenletes sebességgel forog O körül OD helyzetbe (1. ábra).



Ugyanebben az időben a körnek A pontjában vont érintője szintén egyenletes sebességgel halad mindig párhuzamosan maga-magával OD helyzetbe. A két mozgás egyszerre kezdődjek és egyszerre végződjék. A forgó sugár és a mozgó egyenes metszés pontjai adják a Hippias-féle görbét. Egyes pontjait tehát megkapjuk, ha az AD körívet egyenlő részekre ($B_1, B_2, B_3, \dots$ pontokban) és az OA küllőt is ugyanennyi számú egyenlő részre ($C_1, C_2, C_3, \dots$ pontokban) felosztjuk, a körív pontjaihoz a sugarakat, a küllő pontjaihoz pedig az érintővel párhuzamos vonalakat meghúzzuk és e megfelelő sugarak és párhuzamosak metszés pontjait ($P_1, P_2, P_3, \dots$) megjelöljük. A görbe keletkezéséből tehát azt látjuk, hogy az A ponttól számított körívek mindig arányosak a sugárnak az A ponttól számított megfelelő részeivel:


$$AB_1 : AC_1 = AB_2 : AC_2 = AB_3 : AC_3 = \dots = AB_n : AC_n.$$

De arányosak a körívek és megfelelő sugárrészek D , illetőleg O ponttól számítva is:

$$DB_1 : OC_1 = DB_2 : OC_2 = DB_3 : OC_3 = \dots = DB_n : OC_n.$$

A Hippias-féle görbe segélyével tehát *körív*-nek bizonyos számú és arányú részekre való felosztását egy *egyenes vonal*-nak ugyanily számú és arányú részekre való felosztására vezethetjük vissza.

A triszekció feladatát pl. ennél fogva így végezhetjük: az adott és felosztandó CD ívet kiegészítjük derékszögű és ebbe belerajzoljuk a Hippias-féle görbét, melyen a C pontnak a P_1 pont felel meg és ennek ismét a sugáron a B_1 pont. Az OB_1 vonalat három egyenlő részre osztjuk B_2 és B_3 pontokban, melyeknek a Hippias-féle görbén a P_2 és P_3 pontok felelnek meg; ezeknek viszont a köríven a C_2 és C_3 pontok, melyek már is a körívnek keresett osztási pontjai.



Hippias eljárása kétségkívül matematikailag helyes, de mindazonáltal a felvetett problema szerkesztés által való megoldásának mégsem tekinthetjük. A matematikai szerkesztéseknél ugyanis *kizárólag* csak egyenes- és körvonalak használhatók, mert csak ezek oly vonalak, melyeknek *minden* pontja megrajzolható. Bármely más vonalnak csak tetszőszerinti *sok* pontja határozható meg, de nem minden pontja. Így pl. a Hippias-féle görbénél sem tudjuk a körívnek minden B_n pontjához az OA küllőn fekvő megfelelő C_n pontját meghatározni, mert nem ismerjük az AB_n körívnek arányát az AD negyed körívhez; ennél fogva a görbének sem rajzolhatjuk meg minden P_n pontját. Igaz ugyan, hogy szemünk látóképességének bizonyos határa és a rajzszerkesztés finomságának korlátoltsága miatt abszolút matematikai pontosságot a rajzban nem érhetünk el s így tulajdonképpen mindig csak relatív pontossággal érjük

be és valamely görbe elég sok pontjának meghatározása által mindig elérhetjük e relatív pontosságot; mindazonáltal ily közelítő szerkesztések az előbb említett szerkesztési elvek szempontjából nem tekinthetők szigorú matematikai szerkesztési megoldásoknak. Hiszen ha pl. a triszekció-nál elvileg a relatív pontossággal érjük be, akkor a szögnek három egyenlő részre való felosztására a próbálgatás is elég pontos.

Hippokrates.

Hippokrates életéről keveset tudunk; Chiosból való volt, születésének éve ismeretlen; eleinte kereskedő volt s mint ilyen elvesztette vagyonát, némelyek szerint byzanci vámszedők csalták meg, mások szerint atheni kalózok rabolták meg 440-ben a samosi háború alkalmával. Ezután Athenben telepedett le s itt Pythagoras iskolájának egyes tagjaival lépett érintkezésbe; ezeknek társaságában sok geometriai dolgot tanult; de mivel tudományát másoknak pénzért tanította, ezek kizárták körükből.

Hippokrates neve a matematika egyik legérdekesebb problémájával áll összefüggésben: a kör quadraturájával, mely probléma folyton kísértette a matematikával foglalkozókat. A praktikus érzékű egyiptomiak közelítő módszert kerestek és találtak (l. IV. évf. 6. lap), a teoriára hajlandóbb görögök matematikailag pontos megoldásra törekedtek. A kör quadraturájának feladata az: oly egyenes vonalú idomot, leginkább téglalapot vagy négyzetet találni, melynek területe szigorúan matematikailag (nemcsak bizonyos pontossáig) egyenlő egy kör területével. E feladattal együtt jár a kör rektifikációja: oly egyenes vonalat keresni, mely a kör kerületével egyenlő. Az egyik probléma megoldása a másiké is lenne, mert hiszen a kör területe oly háromszög területével egyenlő, mely háromszögnek alapja a kör kerülete, magassága a kör sugara. A két probléma lényege tulajdonképpen a π geometriai szerkesztése. Csak a legújabb időben sikerült kimutatni, hogy a π oly irracionális szám, mely semmiféle szerkesztés segélyével meg nem rajzolható. Így tehát nem csoda, hogy a legkiválóbb matematikusok teljes szellemi erejüket fordították e problémák megoldására a nélkül, hogy teljesen kielégítő eredményt értek volna.

A problémának megoldás nélkül való maradása miatt azonban semmi okunk sincsen a probléma felvetését hiábavalónak és a vele való foglalkozást haszontalannak tekinteni, mert e kérdés tárgyalása közben az egyes matematikusok éles elméje, leleményessége annyi gondolatot szült, annyi tételt fedezett fel és annyi tudást halmozott össze, hogy ezek nélkül a matematika még sokáig nem érte volna el azt a magas színvonalat, melyre ezek révén már akkor emelkedett.

Hippokrates előtt is foglalkoztak már a kör négyszögesítésével. Plutarchos felemlíti, hogy *Anaxagoras* (Kr. e. 500-428.) 434-ben börtönében a kör quadraturáját rajzolta. Valószínűleg ő is már a probléma szigorú matematikai megoldására törekedett és nem elégedett meg az egyiptomiakéhoz hasonló közelítő szerkesztéssel.

Antiphon körülbelül ugyanebben az időben foglalkozott a problémával. Egyik állítás szerint a körbe rendre négyzetet, szabályos nyolcz-, tizenhat stb. oldalú sokszöget, másik állítás szerint hat-, tizenkét stb. oldalú sokszöget rajzolt. Így kellene tovább haladni, míg a sokszög oldalai oly kicsinyek, hogy azok a körívvel esnek össze. Miután pedig bármely szabályos sokszöggel egyenlő területű téglalapot vagy akár négyzetet is lehet szerkeszteni, úgy tehát a kör is négyszögesíthető!

Antiphon evvel az eszmével csak utat jelölt ki, de maga ezen az úton, úgy látszik még annyira sem haladt, hogy a probléma nehézségeivel megismerkedett volna.

Bryson ugyancsak ebben az időben rövidebben végzett a problémával: a körhöz igen sokoldalú körülírt és beírt szabályos sokszöget kell rajzolni és ekkor a körterület e két sokszög területének számtani közepe.

Budapest.

Baumgartner Alajos.