

A május 7-én lefolyt II. (döntő) fordulóban az alábbi három feladat volt kitűzve:

1. Bizonyítsuk be, hogy tetszés szerinti 1-nél nagyobb a számra

$$\frac{1}{\frac{2}{\log a}} + \frac{1}{\frac{1}{\log 16}} \geq 1.$$

2. Egy háromjegyű számot egy kétjegyűvel elosztva, hányadosul az osztó számjegyeinek összegét kapjuk, a maradék pedig az osztó jegyeinek felcserélésével keletkező szám. Ha ezt a maradékot szorozzuk a hányadossal és hozzáadjuk az osztót, a keletkező szám az osztandó jegyeiből áll, de fordított sorrendben. Mi az osztandó és az osztó?

3. Egy sík egy szabályos négyoldalú gúla oldaléleit metszi. Bizonyítsuk be, hogy ha a gúla csúcsa S és a metszésidom az $ABCD$ négyszög, akkor

$$\frac{1}{SA} + \frac{1}{SC} = \frac{1}{SB} + \frac{1}{SD}$$

Öt órai munkaidő után 121 iskola tanulói beadtak összesen 320 dolgozatot.

A Bolyai János Matematikai Társulat által a Művelődésügyi Minisztériummal egyetértésben kiküldött Központi Bizottság (Hódi Endre, Horvay Katalin, Késedi Ferenc, Lőrincz Pál és Neukomm Gyula előadó) Surányi János, a Társulat főtítkárának elnökletével a május 24-i ülésen a következő jelentést fogadta el:

„A Bizottság megállapítja, hogy a versenyzők teljesítménye – ha el is marad a tavalyitól – teljesen kielégítő. Tavaly a feladatok pusztá megoldása csak jó rutin munkát követelt, az idén mindhárom feladat (egyenlőtlenség, számelmélet, térmértan) olyan volt, hogy ezek megoldásához a tanulók az iskolában jó rutint nem szerezhettek. Ennek megfelelően a tavalyi 44 helyett ez idén csak 23 versenyző oldotta meg mind a három kitűzött feladatot, és amíg tavaly 2 teljes megoldás sem volt elég helyezés eléréséhez, addig ez idén az összes versenyzők, akik 2 feladatot lényegében megoldottak, helyezéshez jutottak. Hogy a feladatok ez idén nehezebbek voltak, mint tavaly, azt az is mutatja, hogy a döntőben 177 versenyző (55,3%) egy feladattal sem tudott megbirkózni; igaz, hogy ez elsősorban – amint azt a Bizottság határozottan megállapította – annak tulajdonítható, hogy az I. fordulóban észlelt „kollektív” munka következményeként igen sok versenyző érdemtelenül került a döntőbe. A tanév csonkasága – legalábbis az élcsoporthoz – nem hagyott nyomot, ami bizonyára részben annak is köszönhető, hogy a Középiskolai Matematikai Lapok kiesés és redukció nélkül jelentek meg, és a 7. pontverseny teljes egészében folyik.

A dolgozatok elbírálásánál a Bizottság először a három feladat teljes, precíz megoldását követelte, – előnyben részesítve azokat, amelyek kevesebb előismeretet tételeznek fel – csak ez után vette figyelembe a többletmunkát.

Három helyes megoldáson felül többletmunkát mutatott fel 15 dolgozat.

Alapos megfontolás után a Bizottság *Frivaldszky Sándor*, *Rockenbauer Antal* és *Böröczky Károly* dolgozatát találta díjazásra érdemesnek. Az első kettő szabatos megoldást ad az 1. feladatra. A második feladatra Frivaldszky megoldása. precízebb, mint Rockenbaueré, viszont a 3. feladatra Rockenbauer egy hasonlóságon alapuló megoldáson kívül egy általánosítást is ad, míg Frivaldszky egyik megoldásában trigonometriai függvényt használ, egy második megoldásában pedig térbeli koordináta-geometriához folyamodik. A Bizottság úgy találja, hogy e két dolgozat között megnyugtatóan döntenem nem tud, és így azt javasolja, hogy mindkettő egy-egy I. díjban részesüljön. Böröczky a két első feladat szabatos megoldásán kívül az elsőre még egy kifogástalan második megoldást is ad. A 3. feladat állítását trigonometriai függvények nélkül bizonyítja némi többletmunkával. A Bizottság e dolgozatot 2. díjra javasolja.

A Bizottság 5 versenyzőt, akiknek dolgozata alig marad el a díjasokétól, I. dicséretre ajánl. Három feladat megoldásáért II. dicséretre ajánl a Bizottság 15 tanulót. Két feladat megoldásánál nagyobb teljesítményt ért el 9 résztvevő, két feladatot oldott meg, vagy ezzel egyenértékű teljesítményt nyújtott 21 tanuló és végül nem teljes két megoldást adott 28 tanuló. A Bizottság e három csoport tagjait rendre III., IV., ill. V. dicséretre javasolja.

A MM. a fenti javaslat alapján a következő döntést hozta:

1. *díj* (oklevél + 1000 Ft):

FRIVALDSZKY SÁNDOR (Bp. II., Rákóczi g. IV. o. t.)

ROCKENBAUER ANTAL (Bp. X., I. László g. IV. o. t.)

2. *díj* (oklevél + 500 Ft):

BÖRÖCZKY KÁROLY (Bp. XVIII., Steinmetz g. IV. o. t.)

I. dicséretben és nagyobb könyvjutalomban részesült:

Móricz Ferenc (Hódmezővásárhely, Bethlen G. g. IV. o. t.)

Pogány Eörs (Bp. V., Eötvös J. g. IV. o. t.)

Soós Tibor (Bp. I., Petőfi g. IV. o. t.)

Stahl János (Bp. VI., Kölcsey g. IV. o. t.)

Szatmáry Zoltán (Bp. VIII., Piarista g. IV. o. t.)

II. dicséretet és könyvjutalmat nyert:

Bergmann György (Bp. XIV., Abonyi u. ált. g. IV. o. t.), *Borsi László* (Bp. II., Rákóczi F. g. IV. o. t.), *Ellmann Gábor* (Bp. III., Arany J. g. III. o. t.), *Gáspár János* (Dombóvár, Göögös g. IV. o. t.), *Grell Mihály* (Bp. XVI., Corvin

Mátyás g. IV. o. t.), *Győry Kálmán* (Ózd, József A. g. III. o. t.), *Hargitai Csaba* (Bp. XXI., Jedlik g. IV. o. t.), *Király Endre* (Nagykőrös, Arany J. g. IV. o. t.), *Makkai Mihály* (Bp. V., Eötvös J. g. IV. o. t.), *Montvay István* (Bp. XIX., Landler g. III. o. t.), *Papp Kálmán* (Bp. IX., Fáy g. IV. o. t.), *Pödör Bálint* (Bp. II., Rákóczi F. g. III. o. t.), *Ruppenthal Péter* (Győr, Révai Miklós g. IV. o. t.), *Simon László* (Bp. XI., József A. g. III. o. t.), *Verhás József* (Bp. IV., Dózsa György g. IV. o. t.).

III. dicséretben és könyvjutalomban részesült:

Bácsy Ernő (Bp. VIII., Fazekas g. IV. o. t.), *Csertag István* (Bp. VIII., Széchenyi g. IV. o. t.), *Galambos János* (Veszprém, Lovassy L. g. III. o. t.), *Jókúti Ferenc* (Bp. VI., Kölcsey g. IV. o. t.), *Kristóf László* (Mosonmagyaróvár, Kossuth L. g. III. o. t.), *Meskó Attila* (Bp. VII., Madách g. III. o. t.), *Parlagh Gyula* (Kecskemét, Katona J. g. IV. o. t.), *Salát Péter* (Bp. XV., Dózsa György g. IV. o. t.), *Solt György* (Bp. VIII., Fazekas g. IV. o. t.).

IV. dicséretben és könyvjutalomban részesült:

Ádám Antal (Bp. VIII., Széchenyi g. IV. o. t.), *Argay Gyula* (Balassagyarmat, Balassa g. IV. o. t.), *Behringer Tibor* (Bp. III., Árpád g. IV. a. t.), *Dormány Mihály* (Kecskemét, Katona J. g. IV. o. t.), *Fekete Lajos* (Debrecen, Ref. g. IV. o. t.), *Főnyad Árpád* (Bp. XVIII., Steinmetz g. IV. o. t.), *Gáti Gyula* (Debrecen, 3. sz. vegyip. t. IV. o. t.), *Heinemann Zoltán* (Pécs, Cséti bányai. t. IV. o. t.), *Hoffmann György* (Bp. V., Eötvös J. g. IV. o. t.), *Kalmár Ágota* (Szeged, Ságvári g. III. o. t.), *Kanyó Zoltán* (Szeged, Radnóti g. III. o. t.), *Károlyi Gyula* (Zalaegerszeg, Zrínyi M. g. IV. o. t.), *Kovács László* (Bp., V., Eötvös J. g. IV. o. t.), *Máté Levente* (Szeged, Radnóti g. III. o. t.), *Nyulász István* (Bp., I., Petőfi g. IV. o. t.), *Szalay Zoltán* (Bp., VIII., Széchenyi g. III. o. t.), *Sebeni András* (Bp. I., Petőfi g. III. o. t.), *Tokai József* (Esztergom, I., István g. IV. o. t.), *Trón Tibor* (Debrecen, Fazekas g. III. o. t.), *Váczy Pál* (Debrecen, Ref. g. IV. o. t.), *Vámos Attila* (Bp. II., Rákóczi F. g. IV. o. t.).

V. dicséretet és könyvjutalmat nyert:

Agh János (Bp. XIV., Petrik vegyip. t. III. o. t.), *Baky Ágnes* (Baja, III. Béla g. IV. o. t.), *Csapody Miklós* (Bp. VIII., Piarista g. IV. o. t.), *Detre Mária* (Esztergom, Bottyán gépip. t. IV. o. t.), *Detrekői Ákos* (Szolnok, Verseghegy F. g. III. o. t.), *Fábry István* (Bp. VIII., Széchenyi g. IV. o. t.), *Fodor Lajos* (Bp. XIX., Landler g. III. o. t.), *Fuchs Péter* (Győr, Révai Miklós g. IV. o. t.), *Gergely Ervin* (Bp. IV., Könyves Kálmán g. IV. o. t.), *Glattfelder György* (Pannonhalma, Bencés g. III. o. t.), *Hank Zsombor* (Szolnok, Verseghegy F. g. III. o. t.), *Kovács Zoltán* (Szeghalom, Bolyai Farkas g. III. o. t.), *Leipniker Péter* (Makó, József A. g. III. o. t.), *Lénárd Ágoston* (Bp. IX., Puskás távközlési t. IV. o. t.), *Literáthy Péter* (Bp. XIV., Petrik vegyip. t. IV. o. t.), *Makay Attila* (Bp. IX., Fáy g. III. o. t.), *Mató Gyöngyi* (Bp. I., Szilágyi E. lg. IV. o. t.), *Nagy Balázs* (Eger, Dobó g. III. o. t.), *Nagy Sándor* (Szeghalom, Bolyai Farkas g. III. o. t.), *Pataki Árpád* (Nagyatád, ált. g. IV. o. t.), *Pulay Péter* (Bp. I., Petőfi g. III. o. t.), *Sárközy András* (Gyöngyös, Vak Bottyán g. III. o. t.), *Schipp Ferenc* (Mohács, Kísfaludy K. g. IV. o. t.), *Szokoly Pál* (Zalaegerszeg, Zrínyi M. g. IV. o. t.), *Ujváry Menyhért Zoltán* (Baja, 3. sz. építőip. t. III. o. t.), *Várallyay László* (Mosonmagyaróvár, Kossuth g. III. o. t.), *Veress Péter* (Pannonhalma, Bencés g. III. o. t.), *Veszely Gyula* (Kőszeg, ált. g. IV. o. t.).

*

A verseny részletes eredményét megyék, városok és iskolafajok szerint a 4. oldalon közölt táblázat mutatja.

Kimutatás 1957. évi országos Matematikai Tanulmányi Verseny II. Fordulójáról

Megyék és városok	Beadott dolgozatok száma						Eredmény											
	gimn.		ip. t.		összesen		Díj		Dicséret						Pontszám (nem hivatalos)			
	isk.	tan.	isk.	tan.	isk.	tan.	1.	2.	I.	II.	III.	IV.	V.	g.	i.t.	össz.		
1. Baranya	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1		
I. Pécs város	1	1	1	3	2	4	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2		
2. Bács–Kiskun . .	5	10	1	1	6	11	—	—	—	—	1	1	2	6	1	7		
3. Békés	4	6	—	—	4	6	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2		
4. Borsod	4	9	—	—	4	9	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4		
II. Miskolc város .	2	4	1	3	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
5. Csongrád	3	9	—	—	3	9	—	—	1	—	—	—	1	6	—	6		
III. Szeged város .	2	9	1	2	3	11	—	—	—	—	—	3	—	6	—	6		
6. Fejér	1	7	1	3	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
7. Győr–Sopron . .	6	25	—	—	6	25	—	—	—	1	1	—	4	11	—	11		
8. Hajdú–Bihar . .	1	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	v—	—	—	—	—		
IV. Debrecen város	2	9	3	4	5	13	—	—	—	—	—	4	—	6	2	8		
9. Heves	2	6	—	—	2	6	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2		
10. Komárom	3	9	1	2	4	11	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3		
11. Nógrád	1	3	—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2		
12. Pest	4	12	1	1	5	13	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4		
13. Somogy	3	5	—	—	3	5	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1		
14. Szabolcs	3	3	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
15. Szolnok	9	15	—	—	9	15	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2		
16. Tolna	2	2	—	—	2	2	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4		
17. Vas	4	5	—	—	4	5	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1		
18. Veszprém	7	14	—	—	7	14	—	—	—	—	1	—	—	3	—	3		
19. Zala	2	4	—	—	2	4	—	—	—	—	—	1	1	3	—	3		
Vidék	72	170	10	19	82	189	—	—	1	4	3	12	18	66	6	72		
V. Budapest . .	33	121	6	10	39	131	2	1	4	11	6	9	10	127	3	130		
Összesen . .	105	291	16	29	121	320	2	1	5	15	9	21	28	193	9	202		

* A gimnáziumokhoz sorolva 1 katonai középisk. 1 tanulóval.

A döntőben részt vett 320 tanuló közül 188 (58,8% – tavaly 55,8%) volt lapunk munkatársa; a 81 helyezést elért tanuló közül azonban már 76 (93,8% – tavaly 97,4%) volt feladatmegoldója lapunknak. (Részletes beszámoló – sokféle szempontból – a „Matematika tanítás”-ban jelenik meg.)

Alább közöljük a II. forduló feladatainak megoldását.

1. feladat.

I. megoldás: Kifejezzük a második tagot is 2 alapú logaritmussal. A logaritmus definíciója szerint, ha $a \neq 1$,

$$a^{\log_a 16} = 16.$$

Ennek 2 alapú logaritmusát véve

$$\log_a 16 \cdot \log_2 a = 4, \quad \text{vagyis} \quad \log_a 16 = \frac{4}{\log_2 a}.$$

Így az egyenlőtlenség bal és jobb oldalának, különbsége

$$\frac{1}{\log_2 a} + \frac{\log_2 a}{4} - 1 = \frac{4 + \left(\log_2 a\right)^2 - 4 \log_2 a}{4 \log_2 a} = \frac{\left(\log_2 a - 2\right)^2}{4 \log_2 a}$$

Ez nem negatív, ha $\log_2 a$ pozitív, azaz, ha $a > 1$, és ezt kellett bizonyítani.

Egyenlőség csak akkor áll fenn, ha $\log_2 a = 2$, azaz $a = 4$.

II. megoldás: Vizsgáljuk valamivel általánosabban az

$$\frac{1}{\frac{b}{\log a}} + \frac{1}{\frac{a}{\log c}}$$

összeget, ahol vagy $a, b, c > 1$ vagy $0 < a, b, c < 1$ áll fenn. Jelöljük a két nevezőt u -val és v -vel, akkor a feltevés szerint u és v pozitív, s így a számtani és mértani közép közti egyenlőtlenség szerint

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} \geq 2\sqrt{\frac{1}{uv}}.$$

Mivel a logaritmus értelmezése szerint

$$b^u = a, \quad a^v = c, \quad \text{ezért} \quad b^{uv} = (b^u)^v = a^v = c.$$

Innen

$$uv = \log_c b,$$

tehát azt nyertük, hogy a mondott feltételek esetén

$$\frac{1}{\frac{b}{\log a}} + \frac{1}{\frac{a}{\log c}} \geq \frac{2}{\sqrt{\log_c b}}.$$

Ez $b = 2$, $c = 16$ esetén a bizonyítandó egyenlőtlenséget adja.

2. feladat.

Megoldás: A háromjegyű osztandó és a kétjegyű osztó jegyeit x, y, z , ill. u, v -vel jelölve, a feltételek a következő alakban írhatók:

$$(1) \quad 100x + 10y + z = (10u + v)(u + v) + 10v + u,$$

$$(2) \quad 100z + 10y + x = (10v + u)(u + v) + 10u + v,$$

és mivel a maradék kisebb, mint az osztó, kell, hogy

$$(3) \quad u > v$$

legyen. Az (1)-ből levonva a (2)-t

$$(4) \quad 99(x - z) = 9(u - v)(u + v) + 9(v - u) = 9(u - v)(u + v - 1)$$

adódik, azaz

$$11(x - z) = (u - v)(u + v - 1).$$

A jobb oldal osztható 11-gyel. De $u - v$ nem lehet osztható 11-gyel, mert mint számjegyek különbsége, 10-nél kisebb, és (3) szerint pozitív. A 11 viszont prímszám, s így tudjuk, hogy ha osztója egy szorzatnak, akkor osztója valamelyik tényezőnek is. Így $u + v - 1$ osztható 11-gyel, de $2 \cdot 11$ -nél kisebb, mert u és v számjegyek, és 0 sem lehet, mert akkor – figyelembe véve (3)-at is – $10u + v = 10$ volna, ami nem megoldása a feladatnak. Így $u + v - 1 = 11$, azaz

$$(5) \quad u + v = 12,$$

és (1)-ből

$$100x + 10y + z = (10u + v) \cdot 12 + 10v + u = (9u + 12) \cdot 12 + 120 - 10u + u = 264 + 99u.$$

A bal oldal kisebb, mint 1000, tehát

$$99u \leq 999 - 264, \quad u \leq \frac{725}{99} = 7\frac{32}{99}.$$

A (3) egyenlőséget és (5)-öt figyelembe véve, innen $u = 7$, $v = 5$ adódik. Ezt beírva (1) és (2) jobb oldalába

$$(10u + v)(u + v) + 10v + u = 75 \cdot 12 + 57 = 957,$$

$$(10v + u)(u + v) + 10u + v = 57 \cdot 12 + 75 = 759.$$

Így azt kaptuk, hogy a feladatnak egy megoldása van, melyben az osztandó 957, az osztó 75.

Megjegyzés: Az (5) összefüggés birtokában közvetlenül meg tudjuk állapítani x, y és z -t is. Összeadva az (1) és (2) egyenlőségeket, és felhasználva (5)-öt

$$(6) \quad \begin{aligned} 101(x + z) + 20y &= 11(u + v)(u + v) + 11(u + v) = \\ &= 11(u + v)(u + v + 1) = 1716. \end{aligned}$$

A bal oldal 20-szal osztva $(x + z)$ -t, a jobb 16-ot ad maradékul, tehát e két szám csak 20 egy többszörösében különbözhet, de mivel x és z számjegyek azért

$$(7) \quad x + z = 16$$

kell, hogy legyen, és ezt (6)-ba írva

$$y = 5$$

adódik. (4)-ből és (3)-ból következik, hogy szükségképpen


$$x > z.$$

16 két különböző egyjegyű összeadandóra csak $9 + 7$ alakban bontható, tehát $x = 9$, $y = 5$, $z = 7$, ebből (1) vagy (2) és (5) alapján u és v is meghatározható. A fentebb követett gondolatmenet azonban gyorsabban vezetett el a megoldáshoz.

3. feladat.

Sok versenyző használt trigonometriát a feladat megoldásában. Bemutatunk egy ilyen megoldást.

I. megoldás. Kiszámítjuk az $SABCD$ gúla térfogatát egyrészt mint az $SABC$ és $SACD$, másrészt mint az $SABD$ és $SBCD$ tetraéderek térfogatának összegét (1. ábra).



1. ábra

Az $SA_0B_0C_0D_0$ gúla S -ből húzott testmagassága egyenlő α szögeket zár be a gúla oldaléleivel, és benne van két-két szemközti oldalél síkjában. Mivel az alaplap négyzet, a kérdéses testmagasság egyben merőleges vetülete is két szemközti oldalél síkjában a másik két oldalélnek. Így egy-egy ilyen síkkal a másik két oldalél α nagyságú szöget zár be.

Jelöljük az SA , SB , SC , SD élhosszúságokat a , b , c , d -vel.

Az $SABC$ tetraéder alaplapjának az SAC háromszöget választva, ennek S -nél levő szöge 2α , így az SA -ra C -ből bocsátott magasság hossza $SC \sin 2\alpha = c \sin 2\alpha$, az alaplap területe tehát $\frac{1}{2} ac \sin 2\alpha$. A B csúsból az alapra bocsátott magasság hossza viszont $b \sin \alpha$. Így a tetraéder térfogatát V_4 -gyel jelölve

$$V_4 = \frac{1}{6} a b c \sin 2\alpha \sin \alpha.$$

Az első bekezdésben szereplő másik három tetraéder V_2 , V_3 , V_1 térfogatára $V_2 = \frac{1}{6} a c d \sin 2\alpha \sin \alpha$, $V_3 = \frac{1}{6} a b d \sin 2\alpha \sin \alpha$, $V_1 = \frac{1}{6} b c d \sin 2\alpha \sin \alpha$. A $V_1 + V_3 = V_3 + V_4$ egyenletet $\frac{1}{6} a b c d \sin 2\alpha \sin \alpha$ értékkel osztva, a bizonyítandó

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$$

egyenletet kapjuk.

Megjegyzés: Ha a gúla alapja nem négyzet, hanem téglalap, akkor a fenti megfontolásban, csak annyi változik, hogy egy oldalél a két vele szomszédos oldalél síkjával, valamilyen α -tól különböző β szöget zár be, de ez az érték mind a négy oldalélre ugyanaz. Így a fentiekben a térfogatokban szereplő utolsó tényező $\sin \alpha$ helyett $\sin \beta$ lesz, ami a végkövetkeztetésen nem változtat. A feladat állítása tehát téglalap alapú egyenlő oldalélű gúlára is érvényes.


II. megoldás. A négyszögmetszet AC átlója benne van az SAC síkban, BD átlója pedig az SBD síkban, ezen átlók M metszéspontja tehát a két sík metszésvonalán van, az pedig az $SA_0B_0C_0D_0$ gúla S -ből induló testmagasságának egyenes, amely az oldalélekkel egyenlő α szögeket zár be (1. ábra). Így SM közös szögfelezője az ASC és BSD háromszögeknek, amelyeknek S -nél levő szöge egyaránt 2α .

Ha e két háromszöget SM körül egymásra forgatva képzeljük (ez az egymásra forgatás akkor is elvégezhető, ha az $A_0B_0C_0D_0$ alaplap téglalap), a feladat állítása a következő síkbeli állítássá fogalmazható át: *Ha egy szög felező egyenesének egy pontján át húzott két szelő a szög száraiból a csúcstól számítva a és c, illetőleg b és d hosszúságú szakaszokat metsz le, akkor*

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{1}{b} + \frac{1}{d}.$$

Ez még úgy is fogalmazható, hogy a szárazból lemetsett szakaszok reciprok értékeinek összege független a szelő irányától. Erre az állításra számos egyszerű, trigonometriát nem használó, megoldás adható.)¹

Legyen ASB a kérdéses szög, a szögfelező messe az AB szakaszt M -ben (2. ábra).



2. ábra

Húzzunk M -en át párhuzamost BS -sel. Messe ez az SA -t N pontban. Az SNM háromszög S -nél és M -nél fekvő szöge egyaránt α , így a háromszög egyenlőszárú. Az egyenlő SN és MN távolságokat jelöljük k -val. Ekkor $AN = a - k$, és a hasonló ASB és ANM háromszögekből

$$\frac{a}{b} = \frac{a - k}{k} = \frac{a}{k} - 1.$$

Mindkét oldalhoz 1-et adva és a -val osztva

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{k}.$$

Mivel k hossza csak az SM hosszától és α nagyságától függ, az AB szelő irányától nem, így állításunkat bebizonyítottuk.

Megjegyzések: 1. Ha tetszés szerinti egyenlő oldalélű gúlát veszünk, akkor az alapsokszög körbeírható, a testmagasság talppontja e kör középpontja, és az oldalélek egyenlő α szöget zárnak be a testmagassággal. Ha még az alapsokszög szimmetrikus is a kör középpontjára, vagyis a szemközti csúcsokat összekötő átlók egy ponton, a kör középpontján mennek keresztül, akkor egy síkkal elmetszve ez összes oldaléleket, a keletkező sokszögmetszet szemközti csúcsait összekötő átlók is egy ponton mennek keresztül, és ez a pont a testmagasságon van. Így kiválasztva egy szemközti élpárt a rajtuk átfektetett síkban egy háromszög keletkezik, melyben a 2α szög felezőjének hossza a testmagasságnak a metsző síkig terjedő darabja, vagyis mindegyik háromszögben ugyanakkora. Így a bebizonyított tételt alkalmazhatjuk az összes szemközti élpárra és azt kapjuk:

Ha egy egyenlő oldalélű gúla alapja centrálisan szimmetrikus sokszög (és így szükségképpen páros oldalszámú), akkor egy minden oldalélt metsző síkot véve, a szemközti élpárokból lemetsett darabok reciprok értékeinek összege minden élpárra ugyanakkora.

2. A II. megoldásban bizonyított síkbeli tétel következik az 1905. évi Eötvös-verseny 3. feladatának)² állításából is, mely szerint egy ABC háromszög csúcsain át párhuzamosan elmetszve a szemközti oldalegyeneseket, egy-egy A' , B' , C' pontban, de úgy, hogy C' A és B közt legyen (3. ábra) fennáll az

$$\frac{1}{AA'} + \frac{1}{BB'} = \frac{1}{CC'}$$

összefüggés.

¹A feladat az előbbi szövegezésben szerepelt 407. feladatként. Két megoldás található a IV. kötet 4–5. (1952. májusi) számában a 134–135. oldalon.

A második formában a feladat lényegében benne foglaltatik a 706. feladatban, amelynek megoldását lásd a XII. kötet 4. (1956. április) számában a 110–112. oldalon.


²Kürschák J.: Matematikai Versenyképek I. rész. 2. kiadás. 77–78. old.


$$\frac{a}{AA'} = \frac{b}{BB'} = r.$$
$$\frac{r}{a} + \frac{r}{b} = \frac{1}{CC'}, \quad \text{azaz} \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{r \cdot CC'}.$$

III. megoldás: A feladat állítását a testmagasság segítségével vétele nélkül is bebizonyíthatjuk.

4. ábra

$$\frac{e}{SA} = \frac{A_0 P + US}{US}.$$



6. ábra

Az A_0B_0 , AB , $A'B'$ egy ponton mennek keresztül. Megkeresve a B_0C_0 , C_0D_0 és D_0A_0 -n a megfelelő metszéspontokat, ezek egy egyenesen, a metszősík és az alapsík metszésvonalán sorakoznak. Könnyen látható, hogy az M_0 pontból a vesszős pontokig terjedő szakaszok közt is fennáll egy olyan összefüggés, amelyen a feladatban szerepel. (Erre vonatkozólag az olvasó a jövő számunkban talál egy kitűzött feladatot.)