

Tudnivalók. A sorozat első három része az 53. kötet 2. szám 49 – 52. oldalán, az 54. kötet 1. szám 1 – 3. oldalán és az 54. kötet 5. szám 193 – 197. oldalán található. A IV. rész az 55. kötet 2. szám 55 – 58. oldalán van.

A feladatok megoldására pontversenyt nem írunk ki, de a legjobb megoldók között könyvtalványokat sorsolunk ki. A megoldásokat kérjük a lap megjelenését *követő hónap* 20-ig a szerkesztőség címére (1443 Budapest, Postafiók 129) beküldeni. A borítékra írják rá megoldóink: Pell-féle egyenletek. A megoldásokat nem szükséges külön lapra írni, de mindig írják ki, hogy melyik feladat megoldása következik. Bár a feladatok egymásra épülnek, nem szükséges mindegyiket megoldani. Egyes feladatokat úgy is megoldhatunk, hogy elfogadjuk az előző feladatok állításának helyességét. Az új feladatok kitűzésénél figyelembe vesszük a beküldött megoldások tapasztalatait is; éppen ezért kérjük megoldóinkat, hogy a feladatokkal kapcsolatban minden véleményt, felmerült kérdést írjanak meg.

A IV. rész feladataira helyes megoldást küldtek be: Hajnal Péter, Szabó Sándor (részben), Varga Livia (részben).

A IV. részben kitűzött feladatok megoldása

15. feladat. Legyen $\alpha \in Z[\sqrt{D}]$, $\alpha \neq 1$ és $N(\alpha) = 1$. Jelölje ε az α , $\bar{\alpha}$, $-\alpha$, $-\bar{\alpha}$ számok közül a legnagyobbat. Bizonyítsuk be, hogy

$$-\varepsilon < -1 < -\bar{\varepsilon} < 0 < \bar{\varepsilon} < 1 < \varepsilon$$

Megoldás. A feltételekből azonnal következik, hogy α , $\bar{\alpha}$, $-\alpha$, $-\bar{\alpha}$ mind 0-tól és 1-től különbözők. Mivel $\alpha\bar{\alpha} = 1$, ezért $(-\alpha)(-\bar{\alpha}) = 1$ is teljesül, vagyis α és $\bar{\alpha}$, továbbá $-\alpha$ és $-\bar{\alpha}$ egyenlő előjelűek. Az α és $-\alpha$ a különböző előjelűek, ezért a négy számból 2 pozitív. Ezek 1-től különböznek és a szorzatuk 1, így közülük a nagyobb 1-nél nagyobb. Mivel a vizsgált számok közül a további kettő negatív, ezért a kiválasztott ε -ra $\varepsilon > 1$ teljesül. $\varepsilon \cdot \bar{\varepsilon} = 1$ miatt $\bar{\varepsilon} < 1$ és ε pozitivitásából $\bar{\varepsilon} > 0$ következik. Az egyenlőtlenségek negatív számmal való szorzási szabályából már következik a $-\varepsilon < -1 < \bar{\varepsilon} < 0$ összefüggés.

16. feladat. Legyen $\varepsilon = a + b\sqrt{D} \in Z[\sqrt{D}]$ olyan, amelyre $N(\varepsilon) = 1$. Bizonyítsuk be, hogy $\varepsilon > 1$ pontosan akkor teljesül, ha a és b mindegyike pozitív.

Megoldás. Ha $\varepsilon = a + b\sqrt{D} \in Z[\sqrt{D}]$ olyan, hogy $a, b > 0$, akkor nyilvánvalóan teljesül az is, hogy $\varepsilon > 1$. Tekintsük másrészt ε -nal együtt az $\bar{\varepsilon}$, $-\varepsilon$, $-\bar{\varepsilon}$ elemeket, ezek: $a + b\sqrt{D}$, $a - b\sqrt{D}$, $-a - b\sqrt{D}$, $-a + b\sqrt{D}$. Mivel a és $-a$, továbbá b és $-b$ valamelyike pozitív, ezért a négy szám valamelyike pozitív u és v egészekkel, $u + v\sqrt{D}$ alakú. Világos, hogy ezek között éppen ez a legnagyobb, és a 15. feladat állítása szerint ez közülük az egyetlen, amelyik 1-nél nagyobb, tehát ez éppen a kiválasztott ε . Így $\varepsilon = u + v\sqrt{D}$, ahol u, v pozitívak.

17. feladat. Bizonyítsuk be, hogy azok között a $Z[\sqrt{D}]$ -beli ε számok között, amelyekre $N(\varepsilon) = 1$, és $\varepsilon > 1$, van egy ε_1 legkisebb.

Megoldás. A feltételnek eleget tevő $a + b\sqrt{D}$ számok közül válasszuk ki az $a_1 + b_1\sqrt{D}$ -t úgy, hogy a_1 minimális legyen. Ilyen létezik, hiszen a csak pozitív egész lehet. Ekkor $a_1^2 - b_1^2 D = 1 = a^2 - b^2 D$ következtében $(b^2 - b_1^2)D = a^2 - a_1^2 > 0$, és mivel b_1 és b pozitív ezért $b_1 < b$. Így $a_1 + b_1\sqrt{D} < a + b\sqrt{D}$, vagyis $\varepsilon_1 = a_1 + b_1\sqrt{D}$ eleget tesz a kirótt feltételnek.

Megjegyzés. A feladat állítása egy sokkal általánosabb tételből is következik. Tekintsük az a_1, \dots, a_n szám- n -eseket, amelyeknek elemei pozitív egészek, és minden ilyen szám- n -eshez rendeljük hozzá a $\mu(a_1, \dots, a_n)$ valós számot úgy, hogy

1. Ha $b_1 \leq a_1, \dots, b_n \leq a_n$, akkor

$$\mu(b_1, \dots, b_n) \leq \mu(a_1, \dots, a_n).$$

2. $a_i \leq \mu(a_1, \dots, a_n)$ minden i -re ($1 \leq i \leq n$).

Ekkor a fenti szám- n -esek bármely H részhalmazában van olyan (b_1, \dots, b_n) , hogy tetszőleges H -beli (a_1, \dots, a_n) esetén $\mu(b_1, \dots, b_n) \leq \mu(a_1, \dots, a_n)$. [Pl. ilyen μ lehet $\mu(a_1, \dots, a_n) = a_1\alpha_1 + \dots + a_n\alpha_n$, 1-nél nem kisebb α_i valós számokkal. A feladat ennek speciális esete.]

Az állítást a következőképpen láthatjuk be. Legyen c_1, \dots, c_n a H tetszőleges eleme és legyen N egy, a $\mu(c_1, \dots, c_n)$ számnál nagyobb természetes szám. Ha mármost $\mu(a_1, \dots, a_n) \leq \mu(c_1, \dots, c_n)$, akkor az 1. és 2. feltételek szerint minden egyes a_i kisebb N -nél. Az a_i -k pozitivitása miatt ilyen (a_i, \dots, a_n) legfeljebb N^n van, mert minden egyes a_i -re legfeljebb N lehetőség van. Így a H halmazban is csak véges sok olyan (a_i, \dots, a_n) szám- n -es van, amelyre $\mu(a_1, \dots, a_n) \leq \mu(c_1, \dots, c_n)$. E véges sok között van tehát olyan (b_1, \dots, b_n) , amelyre $\mu(b_1, \dots, b_n)$ minimális. Ez a b_1, \dots, b_n viszont az egész H halmazban megfelelő lesz. Ha ugyanis a (d_1, \dots, d_n) szám- n -es nem tartozik a kiválasztottak közé, akkor $\mu(d_1, \dots, d_n) > \mu(c_1, \dots, c_n)$; ami, $\mu(b_1, \dots, b_n) \leq \mu(c_1, \dots, c_n)$ alapján bizonyítja az állítást.

18. feladat. Bizonyítsuk be, hogy a 17. feladatban szereplő ε_1 számra bármilyen k egész szám esetén $\varepsilon_k = (\varepsilon_1)^k$ eleme $Z[\sqrt{D}]$ -nek és $N(\varepsilon_k) = N(-\varepsilon_k) = 1$.

Megoldás. Ha k pozitív, akkor $(\varepsilon_1)^k \in Z[\sqrt{D}]$ abból következik, hogy $Z[\sqrt{D}]$ a szorzásra zárt. Ha k negatív egész szám, akkor $\varepsilon\bar{\varepsilon} = 1$ alapján $(\varepsilon_1)^k = \overline{(\varepsilon_1)^{-k}} \in Z[\sqrt{D}]$. A $k = 0$ esetén azt kell bizonyítani, hogy $1 \in Z[\sqrt{D}]$, ami igaz. A további állítás triviálisan következik abból, hogy $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$ és $N(-1) = 1$.

19. feladat. Bizonyítsuk be, hogy a 18. feladatban definiált

$$\begin{aligned} & \dots, \varepsilon_{-k}, \dots, \varepsilon_{-1}, \varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k, \dots \\ & \dots, -\varepsilon_{-k}, \dots, -\varepsilon_{-1}, -\varepsilon_0, -\varepsilon_1, \dots, -\varepsilon_k, \dots \end{aligned}$$

számok valamennyien különböznek egymástól.

Megoldás. A 17. feladat állítása szerint $\varepsilon_1 > 1$. Így pozitív k egész számra

$$1 = \varepsilon_0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \dots < \varepsilon_k \dots$$

E számok tehát különböznek egymástól. Mivel különböző számok reciproka is és negatívja is különböző, ezért az

$$\begin{aligned} & \varepsilon_{-1}, \dots, \varepsilon_{-k}, \dots \\ & -\varepsilon_0, -\varepsilon_1, \dots, -\varepsilon_k, \dots \\ & -\varepsilon_{-1}, \dots, -\varepsilon_{-k}, \dots \end{aligned}$$

sorozatok is csupa különböző számokból állnak. A 15. feladat állítása szerint pedig a különböző sorozatok sem tartalmazhatnak egyező számokat.

A Pell-féle egyenlet összes megoldásának a meghatározása

Mint beláttuk, léteznek olyan p és q egész számok, amelyek a

$$(P) \quad x^2 - Dy^2 = 1$$

Pell-féle egyenletnek nem triviális megoldását adják, ami azt jelenti, hogy $q \neq 0$ és $p^2 - Dq^2 = 1$. A IV. sorozatban azt is beláttuk, hogy a (P) egyenletnek végtelen sok megoldása van. Tekintsük ugyanis a 17. feladatban szereplő $\varepsilon_1 = p_1 + q_1\sqrt{D}$ számot. Az $\varepsilon_1 \in Z[\sqrt{D}]$ feltétel azt jelenti, hogy p_1 és q_1 egészek; az $N(\varepsilon_1) = 1$ összefüggés biztosítja, hogy p_1, q_1 a (P) egyenlet megoldásai; míg $\varepsilon_1 > 1$ következtében a kapott megoldás nem lehet triviális. Ebből még nem következne az, hogy a (P) egyenletnek végtelen sok megoldása van. A 19. feladat állításából viszont már ez is adódik. Az ott szereplő számok ugyanis a 18. feladat alapján mind a (P) egyenlet egy-egy megoldását adják (a $p + q\sqrt{D}$ által kapott megoldásban az $x = p, y = q$). E megoldások mind különbözőek; éppen a 19. feladat állítása szerint; továbbá közülük kettő, nevezetesen ε_0 és $-\varepsilon_0$, a triviális $(1, 0)$ és $(-1, 0)$ megoldást adja, a többiek nem triviális megoldást adnak. Világos azonban, hogy a végtelen sok megoldás meghatározásánál nem használtak ki a 17. feladat állítása szerint az ε_1 -re kirótt feltételt. Erre a feltételre éppen most lesz szükségünk, annak a kimutatására, hogy a 19. feladatban szereplő számok a (P) összes megoldását meghatározzák. E célt szolgálják a 20., 21. és 22. feladatok. Ebben a folytatásban azonban szeretnénk teljesíteni még egy ígéretünket is. Említettük ugyanis, hogy rögzített k mellett az $a^2 - Db^2 = k$ megoldásai bizonyos értelemben periodikusan következnek. Ezt fogjuk pontosan megfogalmazni a 23. és 24. feladatban.

V. sorozat (az összes gyök meghatározása)

Feladatok

20. Legyen $\varepsilon > 1$ a $Z[\sqrt{D}]$ -nek olyan eleme, amelyre $N(\varepsilon) = 1$. Bizonyítsuk be, hogy a 17. feladatban értelmezett ε_1 számhoz található olyan k természetes szám, amelyre

$$(\varepsilon_1)^k \leq \varepsilon < (\varepsilon_1)^{k+1}.$$

21. Bizonyítsuk be, hogy ha ε olyan eleme $Z[\sqrt{D}]$ -nek, amelyre $N(\varepsilon) = 1$, akkor valamilyen k egész számra teljesül az $\varepsilon = \varepsilon_k$ vagy az $\varepsilon = -\varepsilon_k$ egyenlőségek valamelyike, ahol ε_k a 18. feladatban adott definíció szerint egyenlő $(\varepsilon_1)^k$ -nal.

22. Legyen a 18. feladatban szereplő ε_k -ra $\varepsilon_k = p_k + q_k\sqrt{D}$; nem negatív k esetén. Bizonyítsuk be, hogy az

$$(P) \quad x^2 - Dy^2 = 1$$

Pell-féle egyenlet összes (egész) megoldásai:

$$x = \pm p_k, \quad y = \pm q_k.$$

23. Legyen az $\alpha = a + b\sqrt{D} \in Z[\sqrt{D}]$ számra $\alpha > 1$ és $N(\alpha) = k$. Bizonyítsuk be, hogy ekkor létezik olyan $\alpha_0 = a_0 + b_0\sqrt{D}$, amelyre $1 < \alpha_0 < \varepsilon_1$ és $\alpha = \alpha_0(\varepsilon_1)^k$ valamely nem negatív k egész számmal; ahol ε_1 a 17. feladatban definiált szám. (Igaz-e, hogy mind a_0 , mind b_0 pozitívak?)

24. Hogyan állítható elő az $x^2 - Dy^2 = k$ egyenlet összes egész (a, b) megoldása?