


**I. megoldás.** Jelöljük az alaplap (szabályos ötszög) csúcsait rendre  $A, B, C, D, E$ -vel, a gúla hatodik csúcsát  $F$  fel. Mivel az oldallapok leforgatásával szabályos csillagötszög keletkezik, azért  $F$ -nek az  $AE$  él körüli leforgatott helyzete az  $AB$  és  $ED$  oldalégyenesek metszéspontjába esik (1. ábra).



1. ábra

E szerint az oldallapok olyan egyenlő szárú háromszögek, amelyekben az alapon levő szög  $72^\circ$ , és az oldalélek hossza

$$AF = \frac{AE/2}{\cos \angle FAE} = \frac{1}{2 \cos 72^\circ} = \frac{1}{2 \sin 18^\circ} = \frac{2}{\sqrt{5} - 1} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2} (= 1,618 \text{ egység}).$$

Jelöljük az alaplap középpontját  $O$ -val – ez a magasság talppontja –, az  $AE$  él felezőpontját  $G$ -vel. A gúla előírt szabályosságából következik, hogy mindkét gömb középpontja az  $FO$  magasságvonalon (forgási szimmetriatengelyen) lesz, továbbá a beírt gömb az alaplapot  $O$ -ban érinti, az  $AEF$  lapot pedig a  $GF$  oldalmagasság egy pontjában.

Legyen még a beírt gömb középpontja  $K_b$ , és sugara  $\varrho$ , így  $KG_b$  felezi az  $\angle FGO = \gamma$  szöveget, és

$$\varrho = OK_b = GO \operatorname{tg} \frac{\gamma}{2} = GO \sqrt{\frac{1 - \cos \gamma}{1 + \cos \gamma}}.$$

Itt ismert goniometriai összefüggések alapján, valamint felhasználva  $18^\circ$ -nak és többszöröseinek a szabályos ötszögből kiszámítható szögfüggvényeit, egyrészt

$$GO = AG \operatorname{tg} 54^\circ = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5 + 2\sqrt{5}}{5}} = \frac{1}{2} \sqrt{1 + \frac{2}{\sqrt{5}}},$$

másrészt  $\cos \gamma = GO/GF$ , így a gyökjel alatti kifejezés:

$$\begin{aligned} \frac{1 - \cos \gamma}{1 + \cos \gamma} &= \frac{GF - GO}{GF + GO} = \frac{GA(\operatorname{tg} 72^\circ - \operatorname{tg} 54^\circ)}{GA(\operatorname{tg} 72^\circ + \operatorname{tg} 54^\circ)} = \frac{\sin 18^\circ}{\sin 3 \cdot 18^\circ} = \frac{1}{3 - 4 \sin^2 18^\circ} \\ &= \frac{2}{3 + \sqrt{5}} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}. \end{aligned}$$

Ezekkel

$$\varrho = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{5 + 2\sqrt{5}}{5}} \cdot \frac{3 - \sqrt{5}}{2} = \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{40}} (= 0,4253 \text{ egység}).$$

A körülírt gömb  $R$  sugarának számításához a  $COF$  háromszöget használjuk. Jelöljük a gömb középpontját  $K_k$ -val,  $FC$  felezőpontját  $H$ -val. Az  $FK_kH$  és  $FCO$  derékszögű háromszögek hasonlóságából

$$\frac{FH}{R} = \frac{FO}{FC}, \quad R = \frac{FC^2}{2 \cdot FO} = \frac{FC^2}{2\sqrt{FC^2 - OC^2}}.$$

Itt

$$OC = OA = \frac{AG}{\cos 54^\circ} = \frac{1}{2 \sin 36^\circ} = \frac{2}{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}} = \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{10}}.$$

A nevezőbeli négyzetgyökjel alatt

$$FC^2 - OC^2 = \left(\frac{\sqrt{5} + 1}{2}\right)^2 - \frac{5 + \sqrt{5}}{10} = \frac{1}{5 - 2\sqrt{5}}$$

áll, végeredményben tehát


$$R = \frac{1}{4} \sqrt{10 + 2\sqrt{5}} \quad (= 0,9511 \text{ egység}).$$

*Megjegyzés.* Két észrevételt teszünk számításaink alapján. Egyrészt  $R/\varrho = \sqrt{5}$ , másrészt

$$FO = \frac{FC^2}{2R} = \sqrt{1 + \frac{2}{\sqrt{5}}} = R + \varrho,$$

tehát  $K_b$  és  $K_k$  egybeesik.

**II. megoldás** (vázlat). Induljunk ki a szabályos ötszög eukleidészi szerkesztéséből (2. ábra).



2. ábra

Legyenek  $OA$  és  $OB$  a  $k$  kör merőleges sugarai,  $C$  az  $OA$  szakasz felezőpontja, és jelöljük a  $C$  középpontú,  $A$ -n, illetve  $B$ -n átmenő köröket  $k_0$ -lal, illetve  $k_1$ -gyel,  $k_1$ -nek az  $OA$  egyenesen levő pontjait  $D$ -vel,  $E$ -vel ( $D$  legyen közülük  $O$ -hoz közelebb). Az  $EBD$  derékszögű háromszögben  $BO$  a  $DO$ ,  $OE = OA + AE = OB + DO$  szakaszok mértani közepe, emiatt

$$DO : OB = OB : (OB + DO),$$

vagyis  $DO$  és  $OB$  aránya megegyezik a szabályos tízszög oldalainak és a köré írt kör sugarának az arányával. Így  $DO$  valóban a  $k$ -ba írt szabályos tízszög oldala, és

$$BE^2 = DE \cdot OE$$

miatt  $BE$  a  $k$ -ba írt szabályos ötszög átlója, végül  $DB : BE = DO : OB$  miatt  $DB$  a  $k$ -ba írt szabályos ötszög oldala.

Forgassuk meg ezt az ábrát a  $DE$  egyenes körül, és jelöljük a  $k_0$ ,  $k_1$  körök forgatásából keletkező gömböket  $G_0$  lal,  $G_1$ -gyel.  $G_1$ -ből a  $BO$  forgatásából származó sík  $k$ -val egybevágó kört metsz ki, tehát az ebbe írt szabályos ötszög

oldalai  $BD$ -vel egyenlőek, átlói pedig  $BE$ -vel. így ez az ötszög  $E$ -vel együtt épp a feladatban szereplő gúlát határozza meg, ha  $BD$  egységnyi.

A kapott gúlának  $G_1$  természetesen a köré írt gömbje, megmutatjuk, hogy  $G_0$  a beírt gömb. A konstrukció miatt  $G_0$  érinti az alaplapot, melyben például a  $B$  csúcsból induló átlók az oldallapokkal egybevágó háromszögeket zárnak közre. Mivel  $BC = EC$ , a  $G_0$ -hoz  $E$ -ből húzott érintősíkok is  $k$ -val egybevágó köröket metszenek ki  $G_1$ -ből, tehát a gúla oldallapjai valóban érintik  $G_0$ -t.

Ha  $OC = \rho$ , akkor  $BC = \rho\sqrt{5}$ ,  $DO = \rho(\sqrt{5} - 1)$ ,  $DB^2 = \rho^2(10 - 2\sqrt{5})$ . Ha tehát  $DB = 1$ , akkor


$$\rho^2 = \frac{1}{2} \frac{1}{5 - \sqrt{5}} = \frac{5 + \sqrt{5}}{40}.$$

Így a gúla köré írt gömb sugara  $\rho = \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{40}}$  és a gúla köré írt gömb sugara  $BC = \rho\sqrt{5} = \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{8}}$ .


### MEGJEGYZÉSEK

1. Az I. megoldás számításaira támaszkodva kapcsolatot írunk le gúlánk, a szabályos dodekaéder, valamint az utóbbinak magasabb fajú rokonai között.

Az  $FO$  és  $GO$  szakaszok kifejezése alapján a gúla alapéleinél keletkező lapszögekre  $\text{tg } FGO \sphericalangle = 2$ ,  $\cos FGO \sphericalangle = 1/\sqrt{5}$ . Ez azt jelenti – mint alább megmutatjuk –, hogy az oldallapok által a kiterítés közben „súrolt”  $FG(F)$  nagyságú lapszögek egyenlők a szabályosan dodekaéder szomszédos lapjai közti szögekkel (lásd a megoldás 1. ábráját). Ha tehát az egységnyi élű dodekaéder lapjaira 1–1 példányt illesztünk a vizsgált gúlából – természetesen az alapötszögüknél fogva –, akkor az  $ABCDE = L$  dodekaéderlapra állított gúla  $EAF$  oldallapja olybá vehető, mintha a szomszédos  $AED_1C_1B_1 = L_1$  dodekaéderlapra állított gúla  $EAF_1$  oldallapjának lenne a kiterítése az  $L_1$  alapsíkba (az 1-es index az  $AEO^*$  síkra való tükröképet jelöli, ahol  $O^*$  a dodekaéder középpontja). Ugyanez áll a 12 gúla együttvéve 60 oldallapjára (1. és 2. ábra a borító hátoldalán).




Azt is mondhatjuk tehát – a gúlat mellőzve –, hogy amit látunk, az a dodekaéder lapjaiból kiterjesztéssel keletkezett 12 csillagötszöglap együttese (2. ábra, egyező csíkozás-színezés az egy-egy csillaglapot alkotó 5–5 részen).



És ezzel előttünk áll egyike a 4, ún. Poinsof-féle (olvasd: poenzo) magasabb fajú szabályos poliédernek. A lapok 5-ösével új csúcsot alkotnak, 2-esével élben metszik egymást (gúlacsúctól gúlacsúcsig, az eredeti dodekaéder csúcsai már nem számítanak csúcsnak). Az új 12 csúcs „kis környezetei” konvex testszögletek.

Ezt a problémakört *L. Poinsof* (1777-1859) francia matematikus-fizikusnak egy, a szabályos csillagsokszögekről kimondott, algebrai jellegű állítására támaszkodva *A. Cauchy* dolgozta ki először. A csillagötszöglapokat *másodfajú*nak mondják, és ezen azt értik, hogy mialatt egy mozgó pont a megoldás 1. ábrájának bal felső *F*-jéből *G*-n át az alsó *F*-be megy, majd *C*-n át a jobb felsőbe, *E*-n át a bal alsóba, *B*-n át a jobb alsóba, végül *D*-n át visszatér, eközben a körülírt körön *O*-ból való vetítéssel előálló „vetülete” *kétszer* járja körül a kört. Másképpen: a csillagötszög oldalainak *O*-ból való vetületei kétszeresen fedik le a kört.

Hasonlóan, ha vetítjük az új poliéder 12 db csillagötszög lapját *O\**-ból egy, az *O\** körüli gömbfelületre, a vetületek 3-szorososan fedik le a gömböt. Erre utal új poliéderünk másik jelzője: *harmadfajú* (a borító 3. ábrája).




Szemléletesen azt mondjuk, hogy a *harmadfajú*, *csillaglapú*, *konvexcsúcsú szabályos dodekaéder* 12 csúcsának konvex burka szabályos ikozaéder.

2. További kettőt kapunk meg a Poinsof-poliéderek együtteséből a 4. ábra kiterjesztési terve szerint. Ez annak a 10 metszévonalnak az együttese, amelyekben a közönséges szabályos dodekaéder egy lapjának síkját a többi lapsík metszi (1 lap nem metszi, hiszen a 12 lap páronként párhuzamos). Tekintsük a belső kis konvex ötszöget felső lapnak, ennek oldalegyeneseit a vele szomszédos – a „felső kis kosarat” alkotó – lapok síkjai metszik ki, a nagyobbik csillagötszög oldalegyeneseit pedig az alsó kosár 5 lapjának síkjai.

Az első újabb poliédert úgy kapjuk, hogy az *ABCDE* lapot az *A\*B\*C\*D\*E\** konvex ötszög kerületéig terjesztjük ki (az első kiterjesztés az *A\*C\*E\*B\*D\** csillagötszögre történt), és ugyanezt végezzük a dodekaéder mindegyik lapján (5. ábra). A lapok most (ismét) elsőfajúak, a csúcsok a legutóbbiak, de a „kis környezetük” nem konvex, hanem csillag alapú testszöglet. Új élek jelentek meg, az eddigiek pedig eltűntek, pl. az *A\*C\** egyenes most nem él, mert nem határvonala lapnak. (Ahogyan a síkban pl. *A* nem csúcs, amikor *B\*D\**-ot tekintjük élnek.) Ez a poliéder a *harmadfajú*, *konvex lapú*, *csillagcsúcsú szabályos dodekaéder*.

Szemléletesen: a konvex burok még mindig az előbbi ikozaéder, de már nemcsak a csúcsait örökölte az új poliéder, hanem az éleit is; a lapjai helyén viszont kis gúlaszerű gödrök, völgyek alakultak ki az újabb lapkiterjesztésekből (6. ábra).



6. ábra

Végül az  $L$  lap (és minden lap) lehető legnagyobb kiterjesztésével az  $A^{**}C^{**}E^{**}B^{**}D^{**}(A^{**})$  csillagötszöglaphoz jutunk, ennek éleihez az alsó kosár lapjainak ugyanígy kiterjesztett lapjai csatlakoznak (6. ábra). A  $12 \cdot 5 = 60$  ék alakú kiterjesztési részháromszög 3-asával 20 új csúcsot alkot, és mintegy 3-oldalú gúlákkal fedik be az előbb említett völgyeket. Az élek ismét újak. Ez a poliéder a 7-edfajú, csillaglapú, konvex csúcsú szabályos dodekaéder. Konvex burka szabályos dodekaéder.


A 4-féle szabályos dodekaéder jellemzői

	A lapok			A csúcsok		A poli- éder faja
	alakja	faja	száma	alakja	összefutó élek száma	
Közönséges dodekaéder	konvex	1	20	konvex	3	1
1. kiterjesztés	csillag	2	12	konvex	5	3
2. kiterjesztés	konvex	1	12	csillag	5	3
3. kiterjesztés	csillag	2	20	konvex	3	7

A fentiekben csupán szemléletesen írtuk le ezt a 3 poliédert, a család negyedik tagjával nem is foglalkoztunk, mert az a közönséges ikozaéderből fejlődik ki. Persze azt sem bizonyítják a fentiek, hogy más ilyen poliéder nem létezik.

3. A dodekaéderlapok közti szöveget a Gy. 1757-ben is használt szerkesztő eljárásra<sup>1</sup> támaszkodva számítjuk ki (7. ábra).

<sup>1</sup>K. M. L. 57 (1978) 140. o.



7. ábra

Az  $A$  csúcsba összefutó 3 lap által alkotott testszöglet  $AD$  élét felvágjuk és a  $DAB$ ,  $DAC$  lapot az  $AB$ , ill.  $AC$  él körül beleforgatjuk az  $ABC$  lap síkjába. Ott az élek közti szögek valódi nagyságban látszanak. Majd ismét felhajtjuk a lapokat és a vetületükben kísérvük az újra egyesülő  $D$  pontok útját.

Legyen  $(D)_1$  vetülete  $AB$ -re  $D_0$ , így  $D$  a  $(D)_1D_0$  egyenes fölött fordul vissza, hasonlóan a másik a  $(D)_2$ -n átmenő,  $AC$ -re merőleges egyenes fölött, és e kettő metszése adja meg  $D$ -nek  $D'$  vetületét. Az  $AD'$  szakasz felezi az  $A(D)_1$  és  $A(D)_2$  közti szöget, így  $D'AD_0 \sphericalangle = 54^\circ$ , másrészt  $(D)_1AD_0 \sphericalangle = 72^\circ$ , ennél fogva  $\cos DD_0D' \sphericalangle = D'D_0/DD_0 = \text{tg } 54^\circ / \text{tg } 72^\circ = 1/\sqrt{5}$ , amint állítottuk.