

1996 október 25-én rendezte meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat hagyományos őszi tanulmányversenyét, az Eötvös versenyt. Budapesten kívül 14 vidéki városban zajlott egyidőben a verseny, amelyen az 1996-ban érettségizettek és középiskolai tanulók vehettek részt. Indulhattak Magyarországon tanuló külföldi diákok és külföldön tanuló magyar, illetve magyar anyanyelvű diákok is. Minden magukkal hozott segédeszközt – tankönyveket, jegyzeteket, zsebszámológépet – szabadon használhattak. Összesen 300 perc állt rendelkezésre a Versenybizottság által kitzűzött három feladat megoldására.

Ismertetjük a feladatokat, a feladat helyes megoldását, majd a verseny végeredményét.

**1. A földön vízszintes helyzetében egy 20 cm átmérőjű fatörzs fekszik. Legalább mekkora sebességgel kell elugorjon egy szöcske a földről, hogy át tudja ugrani a fatörzset? (A légellenállást hanyagoljuk el!)**

**Megoldás.** A légellenállást elhanyagolva állíthatjuk, hogy a szöcske pályája parabolaív lesz. Első gondolatunk az, hogy egy olyan parabola adja a kívánt megoldást, amely a hengert legfelül, egyetlen pontban érinti. (Éppen átcúsúzik a szöcske a fatörzs felett.) Ezt a sejtést azonban még be kell bizonyítani, mint ahogy az is kiderülhet, hogy nem is igaz. Ezért csak annyit tételezünk fel, hogy a kívánt pálya a fatörzs két oldalán, ugyanolyan magasságban érinti a fatörzset (1. ábra).

Az ábrán  $C$  és  $C^*$  jelöli az érintési pontokat. A szöcske az  $A$  pontból ugrik el,  $v_1$  kezdősebességgel, a vízszintessel  $\alpha$  szöget bezáró irányban. A fatörzs tengelyével azonos magasságban lévő  $B$  (és  $B^*$ ) pontban a szöcske sebessége  $v_2$ , a vízszintessel bezárt szög  $\beta$ . Az érintési pontokban a sebesség  $v_3$ , a vízszintessel bezárt szög  $\gamma$ . A parabolapálya legfelső ( $D$ ) pontjában a sebesség vízszintes irányú, nagysága  $v_4$ .

A feladatban  $v_1$  minimális értékét kell meghatározni. ( $v_1$  ismeretében  $v_2$ ,  $v_3$ ,  $v_4$  az energiatétel felhasználásával kapható meg, azonban ezek kiszámítása nem volt feladat.)

Mi legyen a független változó, aminek függvényében  $v_1$  szélsőértékét keressük? Lehetne az elugrás helye, vagyis például az  $AG$  távolság. Lehetne az elugrás szöge, amit az ábrán  $\alpha$ -val jelöltünk. De lehetne akár a  $\beta$ , akár a  $\gamma$  szög is: akármelyik szög meghatározza a másik kettőt. A független változó szerencsés megválasztása lerövidítheti a számításokat.

Válasszuk független változónak a  $\gamma$  szöget! Ezzel ugyanis  $v_3$  kifejezhető,  $v_3$  segítségével pedig felírható  $v_1$ . Lássuk először  $v_3$  és  $\gamma$  kapcsolatát.

A  $CD$  hajítási pályán  $t_3$ -mal jelölve az emelkedés idejét, a függőleges sebességkomponens a  $C$  pontban

$$v_3 \cdot \sin \gamma = gt_3,$$

a vízszintes irányú  $CF$  elmozdulás pedig

$$v_3 \cdot \cos \gamma \cdot t_3 = R \cdot \sin \gamma.$$

E két egyenlet összevetéséből kapjuk:

$$v_3^2 = \frac{gR}{\cos \gamma}.$$

Most írjuk fel az energiatételt az  $A$  és a  $C$  pont között:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_3^2 + mg(R + R \cos \gamma)$$

Ebből

$$v_1^2 = v_3^2 + 2gR(1 + \cos \gamma), v_1^2 = \frac{gR}{\cos \gamma} + 2gR(1 + \cos \gamma), v_1^2 = 2gR \left( 1 + \cos \gamma + \frac{1}{2 \cos \gamma} \right).$$

Mekkora  $\gamma$  szögnél lesz  $v_1$  a legkisebb? (Első sejtésünk szerint  $\gamma = 0$  esetben, amikor épp átcúsúzik a szöcske a fatörzs tetején. Ekkor  $\cos 0 + \frac{1}{2 \cos 0} = 1,5$ . A kérdés az, hogy lehet-e  $\cos \gamma + \frac{1}{2 \cos \gamma} < 1,5$ .)

Írjuk fel a számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenséget  $\cos \gamma$  és  $\frac{1}{2 \cos \gamma}$  esetén! (Feltéve, hogy egyik sem negatív, ami azért igaz, mert  $\cos \gamma$  nem negatív, ami viszont  $0 \leq \gamma \leq 90^\circ$ -ból következik.)

$$\frac{\cos \gamma + \frac{1}{2 \cos \gamma}}{2} \geq \sqrt{\cos \gamma \frac{1}{2 \cos \gamma}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$\cos \gamma + \frac{1}{2 \cos \gamma}$  legkisebb értéke tehát  $\sqrt{2}$ , ezt  $\gamma = 45^\circ$ -nál veszi fel. Azt a meglepő eredményt kaptuk tehát, hogy az optimális pálya a legfelső pontjában nem érinti a fatörzset, hanem fölé emelkedik. A szöcske helyzeti energiája a legmagasabb pontban nagyobb ugyan, mint az „éppen átcúsúzik” esetben, de a mozgási energiája – s az összenergiája is – kisebb! Az eredeti kérdésre a helyes válasz tehát:

$$v_{1\min} = \sqrt{2gR(1 + \sqrt{2})} \approx 2,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Az érdekesség kedvéért kiszámíthatjuk  $\alpha$  és  $\beta$  megfelelő értékeit is ebben az esetben:

$$\alpha = 67,5^\circ \left( = \frac{3\pi}{8} \right), \quad \beta = 60^\circ \left( = \frac{\pi}{3} \right);$$

az elugrási  $AG$  távolság pedig  $R \left( 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \approx 17$  cm. Az ábrán jelölt  $F$  pont a parabola fókuszpontja lesz.

**2.** Egy 3 dm magas, hengeres, zárt edényben 300 K hőmérsékletű,  $10^5$  Pa nyomású levegő van. Kívülről történő hűtéssel, illetve fűtéssel az alaplap hőmérsékletét 270 K-re csökkentjük, a fedőlapét 330 K-re növeljük, és a továbbiakban folyamatosan ezen a hőmérsékleten tartjuk. (Az edény oldal fala hőszigetelő.)

a) Megváltozik-e a gáz nyomása az eredeti állapothoz képest?

b) Becsüljük meg, hogy mennyivel tolódik el a bezárt gáz tömegközéppontja!

**Megoldás.** A gáz az edényben kezdetben egyensúlyi állapotban van. Hőmérséklete és nyomása is az edényben mindenütt ugyanannyi. (A nehézségi erőterben szükségképpen fellépő függőleges nyomásgradienstől eltekinthetünk: erre utal, hogy a feladat szövegében szerepel a mindenütt egyenlő nyomás konkrét értéke.)

A végállapot már nem egyensúlyi állapot. A nyomás ugyan most is ugyanannyi mindenütt az edényben, a hőmérséklet azonban nem: lentről felfelé 270 K-től 330 K-ig nő. A beállt végállapotban szerencsére a hőmérséklet bármely helyen időben már nem változik. Az ilyen – nem egyensúlyi – állapotot nevezik stacionárius állapotnak, amelyre azonban még fennáll az egyensúlyi állapotra bevezetett

$$E = \frac{f}{2} pV$$

összefüggés. Elveszti értelmét azonban a gáz egészére vonatkozólag a

$$pV = NkT$$

összefüggés, mivel nincs a gáznak egyetlen, jól meghatározott hőmérséklete.

Feltételezhetjük, hogy a stacionárius végállapot is mintegy egyensúlyi állapotban lévő vízszintes rétegekből tevődik össze. Egy-egy ilyen rétegen belül a hőmérséklet állandó; a magasabban lévő réteg hőmérséklete feladatunk esetében mindig nagyobb lesz.

Elfogadható („plauzibilis”) feltevésnek látszik, hogy a rétegek hőmérséklete a magasság lineáris függvénye. (Ez akkor igaz, ha a gáz hővezetőképessége nem függ a hőmérséklettől. A tapasztalat szerint a vizsgált hőmérséklettartományban ez jó közelítéssel teljesül.) Ezt felhasználva válaszolhatunk az a) kérdésre.

Hasonlítsunk össze két olyan ( $\Delta x$  vastagságú) réteget, amelyek az alap- és a fedőlaptól egyenlő ( $x \leq \frac{h}{2}$ ) távolságra vannak! A felső rétegben a hőmérséklet nagyobb, mint az alsóban, ezért itt kevesebb részecske hozza létre ugyanazt a nyomást, mint alul.

$$\Delta N_{\text{fent}} = \frac{pA\Delta x}{kT_{\text{fent}}} \Delta N_{\text{lent}} = \frac{pA\Delta x}{kT_{\text{lent}}} \left. \right\} \quad T_{\text{fent}} > T_{\text{lent}} \Rightarrow \Delta N_{\text{fent}} < \Delta N_{\text{lent}}$$

Az edény fele magasságában egyezik meg a hőmérséklet a kiindulási, egyensúlyi állapotbeli hőmérséklettel. Azt mondhatjuk, hogy az edény felső felében a gáz felmelegedett, az alsóban lehűlt. De az előbb beláttuk, hogy a felső rétegekben mindig kevesebb gázmolekula van, mint a megfelelő alsó rétegekben – így azt is mondhatjuk, hogy több gáz hűlt el, mint amennyi felmelegedett!

Így arra a következtetésre jutottunk, hogy az egész gáz belső energiája csökkent. Mivel  $E = \frac{f}{2} pV$  a stacionárius végállapotban is fennáll, a kisebb  $E$ -hez kisebb  $p$ -nek kell tartoznia ( $f$  és  $V$  változatlanok). Tehát a gáz nyomása is *csökkent*.

b) Becsüljük meg, mennyivel tolódott el a gáz tömegközéppontja!

A becslést úgy végezzük, hogy a gázt egyenlő vastagságú, vízszintes rétegekre osztjuk fel. Feltesszük, hogy egy-egy rétegen belül egyensúly van, a réteg hőmérséklete állandó. A felosztást finomítva kaphatunk egyre pontosabb becsléseket.

Példaképpen nézzük az első, durva becslést, amikor csupán két „rétegre” osztjuk fel a hengert: legyen az edény alsó felében 285 K, a felső felében 315 K a hőmérséklet. A két rétegben levő tömegek aránya:

$$\frac{m_{\text{fent}}}{m_{\text{lent}}} = \frac{285}{315} = \frac{7,5 \text{ cm} - \Delta h}{7,5 \text{ cm} + \Delta h}, \quad \text{ahonnan} \quad \Delta h = 0,4 \text{ cm.}$$

Második közelítésben osszuk három egyenlő részre a hengert; a középső réteg hőmérséklete legyen 300 K, a felsőé 330 K, az alsóé 270 K. Az előzőhöz hasonló gondolatmenettel a tömegközéppont süllyedésére  $\Delta h = 0,67$  cm adódik.

Harmadik közelítésben osszuk öt egyenlő vastag rétegre a hengert; az egyes rétegek hőmérséklete fentről lefelé legyen: 330 K, 315 K, 300 K, 285 K, 270 K. Ebben az esetben valamivel hosszabb számolás után  $\Delta h = 0,60$  cm-t kapunk.

Meddig folytassuk ezt? Becslésnek már az elsőnek kapott 0,4 cm is elfogadható. A pontos eredmény (amelynek meghatározását nem kérte a feladat!) integrálszámítással kapható, értéke  $\Delta h = 0,5$  cm.

**3.** *Szigetelő fonálon függő, 1 cm átmérőjű műanyag golyó felszínén  $10^{-8}$  C töltés helyezkedik el egyenletesen. A golyót egy széles, nagy tálnban lévő sós víz fölé engedjük úgy, hogy az alja 1 cm-re legyen a víztől. A víz felszíne a golyó alatt egy picit megemelkedik. Mekkora ez az emelkedés? (A felületi feszültség szerepét elhanyagolhatjuk, a sós víz sűrűségét vehetjük  $1000 \text{ kg/m}^3$ -nek.)*

**Megoldás.** A sós víz elektromosan jól vezető folyadék (elektrolit). Mind a pozitív, mind a negatív töltéshordozók (ionok) könnyen elmozdulnak benne. A közeledő, feltöltött golyó hatására az általa vonzott, vele ellentétes töltésű ionok igyekeznek a golyó felé elmozdulni, míg a golyóval azonos töltésű ionok a taszító erő hatására ellenkező irányban mozdulnak el. Ezáltal megszűnik a folyadék „térfogati semlegessége” úgy, hogy

1. az eredő elektromos tér erővonalai a golyó és a folyadék közötti térben merőlegesen futnak be a folyadék felszínére;
2. a folyadék belsejében a felszín alatti tartományokban zérus lesz az eredő télerősség.

Természetesen ekkor a golyó a vele ellentétes töltésű folyadékfelszínt magához akarja vonzani, fel akarja emelni. Fel is emeli egy picit; ezt a hatást akadályozza a folyadék felületi feszültsége, valamint a felemelt folyadék saját súlya. Feladatunkban a felületi feszültség szerepét elhanyagolhatjuk, így a folyadék felszíne a golyó alatt addig emelkedik fel, amíg a felületegységre ható elektrosztatikus emelő erő egyenlő nem lesz a felemelkedett folyadékréteg hidrosztatikai nyomásával.

Nem tudjuk, hogy milyen lesz pontosan a kialakuló folyadékfelület alakja. Biztos, hogy kevéssé tér el a síkfelülettől, erre utal a feladat szövege is („picit” megemelkedik) – tehát a levegőben kialakuló eredő elektromos tér meghatározásához alkalmazhatjuk a (sík) tükröltés módszerét. Másrészt elegendő lesz figyelmünket egyetlen pontra, a felemelkedő folyadékfelület legfelső  $P$  pontjára koncentrálni; ennek emelkedése az, amit ki kell számítanunk.

A 2. ábrán  $P$ -vel jelölt pontban a  $Q$  töltéstől származó télerősség

$$E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{(3r)^2}.$$

A folyadék felületén kialakuló töltéseloszlás hatását a felszín alatt  $3r$  mélységben elképzelt  $-Q$  nagyságú tükröltés hatásával helyettesítjük (3. ábra). A tükröltéstől származó télerősség a  $P$  pontban ugyanakkora és ugyanolyan irányú, mint  $E_1$ . Ezért az eredő télerősség:

$$E = 2E_1 = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{(3r)^2}.$$

A felületegységre jutó töltés a  $P$  pontban Gauss tétele alapján:

$$\sigma = \epsilon_0 E = \frac{1}{2\pi} \frac{Q}{(3r)^2}.$$

A folyadék felszínén a felületegységre ható erő a  $\sigma$  felületi töltéssűrűség és a golyótól származó  $E_1$  elektromos télerősség szorzata:

$$\frac{F}{A} = \sigma E_1.$$

Ez az a felületegységre jutó, függőlegesen felfelé emelő erő a  $P$  pontban, amely egyensúly esetén egyenlő lesz a  $P$  pontbeli  $h$  emelkedésből származó hidrosztatikai nyomással:

$$\frac{F}{A} = \rho gh.$$

A sós víz felszínének  $h$  emelkedését tehát az alábbi egyenletből számíthatjuk ki:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{(3r)^2} \cdot \epsilon_0 \cdot 2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{(3r)^2} = \rho gh.$$

A megadott, illetve ismert értékeket behelyettesítve az emelkedés magasságára kapjuk:

$$h \approx 0,29 \text{ mm}.$$

Ez az érték valóban „pici” a golyó sugarához, illetve a víztől mért távolságához képest, jogos volt a síktükröltés közelítés. (Hasonlóképp jogos volt a golyó töltését a középpontjába helyezett ponttöltéssel helyettesíteni: műanyag golyóról lévén szó, a víz felszínén kialakuló töltéssűrűség vonzása nem tudja átrendezni, megváltoztatni a szigetezőre felvitt egyenletes töltéseloszlást. Azt is be lehet látni, hogy a víz megemelkedéséből adódó görbületes nyomás a hidrosztatikai nyomásnál sokkal kisebb, a felületi feszültség szerepét tehát jogosan hanyagoltuk el.)

## A verseny végeredménye

*Első díjat* nyert

**Kurucz Zoltán**, az ELTE fizikus hallgatója, aki Szolnokon, a Varga Katalin Gimnáziumban érettségizett, mint *Vincze Gábor* tanítványa.

*Második díjat* nyertek egyenlő (2–4.) helyezéskben:

**Biró Domokos Botond** a Kolozsvári Műszaki Egyetem számítástechnika–automatizálás szakos hallgatója, aki Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban érettségizett, mint *Biró Tibor* tanítványa;

**Tóth Gábor Zsolt**, az ELTE fizikus hallgatója, aki Budapesten, az Árpád Gimnáziumban érettségizett, mint *Vankó Péter* tanítványa;

**Varga Tamás**, az ELTE fizikus hallgatója, aki Révkomáromban, a Selye János Gimnáziumban érettségizett, mint *Szabó Endre* tanítványa.

*Harmadik díjat* nyertek egyenlő (5–10.) helyezéskben:

**Gröller Ákos**, az ELTE matematikus hallgatója, aki Budapesten, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnáziumban érettségizett, mint *Horváth Gábor* tanítványa;

**Hochsteiger Ákos**, a szekszárdi Garay János Gimnázium IV. osztályos tanulója, *Pesti Gyula* tanítványa;

**Kovács András**, a BME műszaki informatika szakos hallgatója, aki Budapesten, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnáziumban érettségizett, mint *Horváth Gábor* tanítványa;

**Mátrai Tamás**, a budapesti, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium IV. osztályos tanulója, *Horváth Gábor* tanítványa;

**Négyesi Gábor**, az egi Szilágyi Erzsébet Gimnázium IV. osztályos tanulója, *Flaskay Miklós* és *Burom Mária* tanítványa;

**Sexty Dénes**, az egi Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium IV. osztályos tanulója, *Pecsenye Pálné* tanítványa.

Négyesi G., Sexty D., Gröller Á., Kovács A., Varga T., Kurucz Z., Biró D. B., Hochsteiger Á., Tóth G. Zs., Kálmán

B., Nagy Z., Nagy Sz., Nyakas P.

*Dicséretben* részesültek egyenlő (11–15.) helyezéskben:

**Kálmán Barnabás**, a BME műszaki informatika szakos hallgatója, aki Budapesten, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumában érettségizett, mint *Flórik György* tanítványa; **Nagy Szilvia**, a BME mérnök–fizikus hallgatója, aki Győrben, a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett, mint *Kolozsváry Ernőné* és *Székely László* tanítványa; **Nagy Zoltán**, a JATE fizikus hallgatója, aki Szegeden, a JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumában érettségizett, mint *Homolya Ernő* tanítványa; **Nyakas Péter**, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium IV. osztályos tanulója, *Vadvári Tibor* tanítványa; **Wagner Róbert**, a pannonhalmi Bencés Gimnázium IV. osztályos tanulója, *Hirka Antal* és *Rábai László* tanítványa.


Az ünnepélyes eredményhirdetésre 1996. november 29-én került sor. Itt nemcsak a feladatok helyes megoldásával ismerkedhettek meg a megjelent diákok és tanárok, de egy lézer fényének felhasználásával megfigyelhették a sós víz felszínének picicselemelkedését is.


Megemlékeztünk a 100 évvel ezelőtti Eötvös-verseny nyerteseiről: *Visnya Aladárról* és *Zemplén Győzőről*. A díjak átadására a Versenybizottság két volt Eötvös verseny nyertest kért fel; *Bakos Tibor* éppen 70 évvel ezelőtt, 1926-ban ismételte meg Teller Ede előző évi bravúráját: fizikából is és matematikából is megnyerte az I. díjat a Társulat őszi tanulóversenyén, és ugyanez sikerült 1940-ben *Hoffmann Tibornak* is. Az Eötvös Társulaton kívül a Nemzeti Tankönyvkiadó is hozzájárult a nyertesek jutalmazásához. A diákokat felkészítő tanárok három meghívott kiadó ajándékkönyveiből válogattak: a *Nemzeti Tankönyvkiadó*, a *Calibra* és a *Talentum* legújabb ismeretterjesztő és tankönyveit hozták el az eredményhirdetésre.

Két régi verseny-nyertes, *Hoffmann Tibor* és *Bakos Tibor*, valamint a versenybizottság elnöke (e cikk szerzője) gratulál az idei győztesnek, *Kurucz Zoltánnak*

A *Duna Televízió* most már harmadik éve saját híradójában tudósítja határainkon inneni és túli nézőit az ünnepi eseményről. Köszönet érte!

**Radnai Gyula**





•- $Q$