

1. Ha a munkások számának növekedése  $2p\%$ , akkor a termelés növekedése  $3p\%$ . Így

$$\left(1 + \frac{2p}{100}\right) \left(1 + \frac{3p}{100}\right) = 1,265.$$

Legyen  $\frac{p}{100} = x$ . Ekkor  $6x^2 + 5x - 0,265 = 0$ ,  $x_1 = 0,05$ ,  $x_2 = -\frac{10,6}{12}$ . Csak  $x_1$  ad megoldást, ekkor  $\frac{5}{100} = \frac{p}{100}$ ,  $p = 5$ . A munkások száma  $10\%$ -kal, az egy főre jutó termelés pedig  $15\%$ -kal nőtt.

2. Legyen  $B(b; 0)$ . Ekkor  $AB^2 = 6^2 + b^2$  és  $6^2 + b^2 = 10^2$ , ahonnan  $b = 8$  vagy  $b = -8$ ,  $B_1(8; 0)$ ,  $B_2(-8; 0)$ .

$A$  és  $S$  ismeretében a  $B_1C_1$  (illetve  $B_2C_2$ ) felezőpontja  $A'(6; 6)$ , így  $C_1(4; 12)$ ,  $C_2(20; 12)$ . Az  $AB_1C_1$  háromszög területét megkapjuk, ha az  $OBC\bar{C}$  trapéz területéből ( $\bar{C}$  a  $C_1$  merőleges vetülete az  $y$ -tengelyen,  $\bar{C}(0; 12)$ ,  $O$  az origó) kivonjuk az  $OB_1A$  és az  $AC_1\bar{C}$  derékszögű háromszögek területének összegét.

$$T_1 = \frac{8+4}{2} \cdot 12 - \frac{8 \cdot 6}{2} - \frac{4 \cdot 6}{2} = 36 \text{ területegység.}$$

Az  $AB_2C_2$  háromszög területét megkapjuk, ha a  $B_2OA$  háromszög területéhez hozzáadjuk az  $ODC_2A$  trapéz területét ( $D$  a  $C_2$  pont vetülete az  $x$  tengelyen,  $D(20; 0)$ ), és az összegből kivonjuk a  $B_2C_2D$  háromszög területét.

$$T_2 = \frac{8 \cdot 6}{2} + \frac{6+12}{2} \cdot 20 - \frac{28 \cdot 12}{2} = 36 \text{ területegység.}$$

3. a)  $x \neq 2$  és  $x \neq -2$ .  $\frac{x^4 - 16}{x^2 - 4} = x^2 + 4 > 0$  minden megengedett  $x$ -re, tehát  $x \in \mathbf{R} \setminus \{-2; 2\}$ .

b) Ha  $x > 2$ , akkor  $x + 2 - (x - 2) - x > 0$ ,  $x < 4$ , tehát  $2 < x < 4$ ;

ha  $-2 \leq x \leq 2$ , akkor  $x + 2 + x - 2 - x > 0$ ,  $x > 0$ , tehát  $0 < x \leq 2$ ;

ha  $x < -2$ , akkor  $-x - 2 + x - 2 - x > 0$ ,  $x < -4$ , tehát  $x < -4$ .

A kifejezés akkor pozitív, ha  $x < -4$  vagy  $0 < x < 4$ . (A kifejezés grafikonjának elkészítésével grafikusán is megoldható a feladat.)

c)  $\sin 2x > 0$  és  $\log_2 \sin 2x > -1$ , tehát  $\sin 2x > \frac{1}{2}$ . (Az  $x \mapsto \log_2 x$  függvény szigorúan monoton növekedő!)

$$\frac{\pi}{6} + 2k\pi < 2x < \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad \frac{\pi}{12} + k\pi < x < \frac{5\pi}{12} + k\pi, \quad x \in \mathbf{Z}.$$

4. a) Az  $(a_n)$  sorozat első  $(n-1)$  tagjának összege  $S_{n-1} = 2(n-1)^2 + 3(n-1)$ . Mivel  $a_n = S_n - S_{n-1}$ , azért

$$a_n = 2n^2 + 3n - (2(n-1)^2 + 3(n-1)) = 4n + 1.$$

Így  $a_{n-1} = 4(n-1) + 1$  és  $a_n - a_{n-1} = 4$ , azaz  $(a_n)$  valóban számtani sorozat. A  $(b_n)$  sorozat is számtani, hiszen

$$b_n - b_{n-1} = 4n - 1 - (4(n-1) - 1) = 4.$$

b) A  $(b_n)$  sorozat első tagja  $b_1 = 3$ , így első  $n$  tagjának összege

$$S'_n = \frac{3 + 4n - 1}{2} \cdot n, \quad S'_n = 2n^2 + n.$$

c)  $c_n = (4n + 1) + (4n - 1) = 8n$ ; a  $c_n$  sorozat első  $n$  tagjának összege  $S''_n$ .

$$S''_n = 8(1 + 2 + \dots + n) = 8 \cdot \frac{n(n+1)}{2}, \quad S''_n = 4n^2 + 4n.$$

5. Az egyenletnek nincs értelme, ha  $\sin 2x = -1$ , így  $2x \neq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ ,  $x \neq \frac{3\pi}{4} + k\pi$ ,  $k \in \mathbf{Z}$ .

Mivel  $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)$  és  $1 + \sin 2x = \sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cdot \cos x = (\cos x + \sin x)^2$ , azért a törtet egyszerűsíthetjük  $(\cos x + \sin x)$ -szel; szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát  $(\cos x + \sin x)$ -szel, majd nullára rendezés után alakítsunk szorzattá.

$$(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x) - (\cos x - \sin x) = 0, \quad (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x - 1) = 0.$$

Ha  $\cos x - \sin x = 0$ , akkor  $\operatorname{tg} x = 1$ ,  $x_n = \frac{\pi}{4} + n\pi$ ,  $n \in \mathbf{Z}$ , és ezek az adott egyenlet megoldásai,

ha  $\cos x + \sin x = 1$ , akkor az egyenlet mindkét oldalát elosztva  $\sqrt{2}$ -vel a  $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$  egyenlethez jutunk. Tehát

a további megoldások:  $x_k = 2k\pi$ ,  $k \in \mathbf{Z}$  és  $x_m = \frac{\pi}{2} + 2m\pi$ ,  $m \in \mathbf{Z}$ .

6. Mivel a feladat csak szöveget kérdez, vehetünk az adott alakzathoz hasonlót. Így a szóban forgó oldal két része legyen  $\sqrt{3}$  és 1 egység. A magasság a  $75^\circ$ -os szöveget két részre osztja,  $\alpha$  és  $75^\circ - \alpha$ ; a  $\sqrt{3}$ -résznél legyen az  $\alpha$  szög. Ekkor a szóban forgó magasság egyrészt  $\frac{\sqrt{3}}{\operatorname{tg}\alpha}$ , másrészt  $\frac{1}{\operatorname{tg}(75^\circ - \alpha)}$ , tehát  $\operatorname{tg}\alpha = \sqrt{3}\operatorname{tg}(75^\circ - \alpha)$ . Legyen  $\operatorname{tg}\alpha = t$ ;  $\operatorname{tg}75^\circ = 2 + \sqrt{3}$ .

$$t = \sqrt{3} \cdot \frac{2 + \sqrt{3} - t}{1 + (2 + \sqrt{3})t}, \quad (2 + \sqrt{3})t^2 + (1 + \sqrt{3})t - (2\sqrt{3} + 3) = 0.$$

Az egyenlet diszkriminánsa  $D = \dots = (5 + 3\sqrt{3})^2$ . Most  $t > 0$ , ezért  $\operatorname{tg}\alpha = \frac{-1 - \sqrt{3} + (5 + 3\sqrt{3})}{2(2 + \sqrt{3})}$ ,  $\operatorname{tg}\alpha = 1$ ,  $\alpha = 45^\circ$ ,  $75^\circ - \alpha = 30^\circ$ . A magasság a  $75^\circ$ -os szöveget  $45^\circ$  és  $30^\circ$ -ra osztja.

(Más módon is számolhatunk. Hogyan?)

7. Az egyenlet gyökei pontosan akkor valósak, ha a diszkriminánsa nemnegatív.

$$D = 16p^2 - 4(2p^2 + 3p - 1) = 8(p - 1) \left( p - \frac{1}{2} \right) \geq 0, \quad \text{ha } p \leq \frac{1}{2} \text{ vagy } p \geq 1.$$

a) A két gyök akkor egyenlő, ha a diszkrimináns nulla.  $D = 0$ , ha  $p = \frac{1}{2}$  vagy  $p = 1$ , az első esetben  $x^2 + 2x + 1 = 0$ ,  $x_1 = x_2 = -1$ , a második esetben  $p = 1$ ,  $x^2 + 4x + 4 = 0$ ,  $x_1 = x_2 = -2$ .

b)  $D \geq 0$  és  $x_1x_2 = 1$ ,  $2p^2 + 3p - 1 = 1$ ,  $p = -2$  vagy  $p = \frac{1}{2}$ ,  $x^2 - 8x + 1 = 0$ ,  $x_1 = 4 + \sqrt{15}$ ,  $x_2 = 4 - \sqrt{15}$ ;  $x^2 + 2x + 1 = 0$ ,  $x_1 = x_2 = -1$ .

c)  $x_2 = 2x_1$ ;  $x_1 + x_2 = -4p$ ,  $x_1x_2 = 2p^2 + 3p - 1$ , innen  $14p^2 - 27p + 9 = 0$ ,  $p = \frac{3}{2}$  vagy  $p = \frac{3}{7}$ .

Ha  $p = \frac{3}{2}$ , akkor  $x^2 + 6x + 8 = 0$ ,  $x_1 = -2$ ,  $x_2 = -4$ ,

ha  $p = \frac{3}{7}$ , akkor  $x^2 + \frac{12}{7}x + \frac{32}{7} = 0$ ,  $x_1 = -\frac{4}{7}$ ,  $x_2 = -\frac{8}{7}$ .

d) A  $p \mapsto 2p^2 + 3p - 1$  függvény minimumát keressük, ha  $p \leq \frac{1}{2}$  vagy  $p \geq 1$ .  $2p^2 + 3p - 1 \equiv 2 \left( p + \frac{3}{4} \right)^2 - \frac{17}{8}$ .

Mivel  $p = -\frac{2}{3} < \frac{1}{2}$ , azért a gyökök szorzata akkor minimális, ha  $p = -\frac{3}{4}$ , és ekkor  $x_1x_2 = -\frac{17}{8}$ .

8. A vágások száma legyen  $k$ , illetve  $n$ ,  $k \leq n$ . A „jó” darabok száma  $(k - 1)(n - 1)$ , a „rossz” darabok száma  $2(k + 1) + 2(n - 1) = 2k + 2n$ . (A rossz darabok száma más módokon is kifejezhető:  $2(k + 1) + 2(n + 1) - 4$  vagy  $(k + 1)(n + 1) - (k - 1)(n - 1)$ .)

A feltétel szerint:

$$\begin{aligned} (k - 1)(n - 1) &= 4(k + n), \\ kn - 5k - 5n + 1 &= 0, \\ k(n - 5) - 5(n - 5) &= 25 - 1, \\ (k - 5)(n - 5) &= 24. \end{aligned}$$

24 a következő egész számok szorzataként állítható elő:  $1 \cdot 24$ ;  $2 \cdot 12$ ;  $3 \cdot 8$ ;  $4 \cdot 6$  és  $(-24) \cdot (-1)$ ;  $(-12) \cdot (-2)$ ;  $(-8) \cdot (-3)$ ;  $(-6) \cdot (-4)$ .  $k - 5 \leq n - 5$  miatt csak ezek az esetek fordulhatnak elő. Mivel  $k$  és  $n$  pozitív egész szám, azért  $k - 5$  nem lehet sem  $-24$ , sem  $-12$ , sem  $-8$ , sem  $-6$ , mert akkor  $k$  nem lenne pozitív.

$k - 5 = 1$ ,  $k = 6$ ,  $n - 5 = 24$ ,  $n = 9$ , és ekkor 140 „jó”, 70 „rossz” sütemény keletkezik, az adagok száma 70; vagy

$k - 5 = 2$ ,  $k = 7$ ,  $n - 5 = 12$ ,  $n = 7$ , és ekkor 96 „jó”, 48 „rossz” sütemény keletkezik, az adagok száma 48; vagy

$k - 5 = 3$ ,  $k = 8$ ,  $n - 5 = 8$ ,  $n = 13$ , és ekkor 84 „jó”, 42 „rossz” sütemény keletkezik, az adagok száma 42; vagy

$k - 5 = 4$ ,  $k = 9$ ,  $n - 5 = 6$ ,  $n = 11$ , és ekkor 80 „jó”, 40 „rossz” sütemény keletkezik, az adagok száma 40.

Rábai Imre