

1. Egy téglalap oldalai 15,6 és 18 egység hosszúak. Írjunk a téglalapba olyan téglalapot, amelynek egyik oldala a másik oldal háromszorosa és az adott téglalap minden oldalára pontosan egy csúcsa illeszkedik a beírt téglalaphoz. Mekkora a beírt téglalap oldalai?

**Megoldás.** Legyen a beírt téglalap rövidebb oldala  $a$ , ekkor a másik oldal  $3a$ . A beírt téglalap oldalai 2-2 egybevágó háromszöget vágnak le, amelyek átfogói  $a$  illetve  $3a$  egység. Ezek a háromszögek egymáshoz hasonlóak. Így ha a kisebb háromszög befogói  $x$  és  $y$ , akkor a nagyobbaké  $3x$  és  $3y$ . Az eredeti téglalap oldalait  $x$ -szel és  $y$ -nal kifejezhetjük:  $x + 3y = 15,6$  és  $3x + y = 18$ , ahonnan  $x = 3,6$  és  $y = 4,8$  és  $a^2 = 3,6^2 + 4,8^2$ ,  $a^2 = 36$ ,  $a = 6$ . A beírt téglalap oldalai 6 és 18 egység hosszúak.

2. a) Igazoljuk, hogy minden háromszögben  $\operatorname{ctg} \alpha \sin \gamma + \cos \gamma = \frac{b}{a}$ , ahol  $\alpha$  az  $a$ ,  $\gamma$  a  $c$  oldallal szemközi szög.  
 b) Egy háromszögben  $b = 2a$  és  $\gamma = 60^\circ$ . Számítsuk ki a háromszög másik két szögét!

**Megoldás.** a) Vegyük figyelembe, hogy

$$\sin \beta = \sin (180^\circ - (\alpha + \gamma)) = \sin (\alpha + \gamma),$$

és alkalmazzuk a szinusztételt:

$$\frac{b}{a} = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha \cos \gamma + \cos \alpha \sin \gamma}{\sin \alpha} = \cos \gamma + \operatorname{ctg} \alpha \sin \gamma.$$

- b) Most  $\frac{b}{a} = 2$ ,  $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ,  $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ , így  $2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{ctg} \alpha$ , ahonnan  $\operatorname{ctg} \alpha = \sqrt{3}$ ,  $\alpha = 30^\circ$  és így  $\beta = 90^\circ$ .

3. Az  $(a_n)$  mértani sorozat tagjaira  $a_1 + a_3 + a_5 = 133$  és  $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_5} = \frac{133}{1296}$ . Írjuk fel a sorozat első öt tagját!

**Megoldás.** A feltételek szerint

$$a_1 + a_1 q^2 + a_1 q^4 = 133 \quad \text{és} \quad \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_1 q^2} + \frac{1}{a_1 q^4} = \frac{133}{1296}.$$

Ez utóbbi egyenletből az első egyenlet felhasználásával

$$\frac{a_1(q^4 + q^2 + 1)}{a_1(a_1 q^4)} = \frac{133}{1296}, \quad (a_1 q^2)^2 = 36^2.$$

Ha  $a_1 q^2 = 36$ , akkor az első egyenletből  $36q^4 - 97q^2 + 36 = 0$ , ha  $a_1 q^2 = -36$ , akkor hasonlóan  $36q^4 + 169q^2 + 36 = 0$ .

Az első esetben  $q^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2$ ,  $a_1 = 16$ , így az első öt tag 16, 24, 36, 54, 81 vagy 16, -24, 36, -54, 81, a második esetben

$q^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2$ ,  $a_1 = 81$ , így az első öt tag 81, 54, 36, 24, 16 vagy 81, -54, 36, -24, 16.

4. Egy bankba 3 évre elhelyeztünk 40 000 forintot kamatos kamatra. Az első évben a bank 10%-os kamatot számolt el, a második évben a kamatlábat  $p\%$ -kal növelte, a harmadik évben újabb  $p\%$ -kal növelte. Így módon a harmadik év végén 2939,20 Ft-tal többet fizettek ki, mint amennyit a három éven át a 10%-os kamatláb mellett kellett volna. Számítsuk ki  $p$  értékét!

**Megoldás.** A feltételek szerint

$$40\,000 \cdot 1,1 \cdot \left(1 + \frac{10+p}{100}\right) \left(1 + \frac{10+2p}{100}\right) = 40\,000 \cdot 1,1^3 + 2939,20.$$

Innen

$$\left(1,1 + \frac{p}{100}\right) \left(1,1 + \frac{2p}{100}\right) = 1,2768.$$

Legyen  $\frac{p}{100} = z$ , ekkor  $2z^2 + 3,3z - 0,0668 = 0$ . Mivel  $z > 0$ , ezért  $z = 0,02 = \frac{2}{100}$ , tehát  $p = 2$ .

5. Az  $(x, y)$  síkbeli  $ABCD$  négyszög  $A$  csúcsa az origóban van,  $B$  csúcsa az  $y$  tengelyen,  $C$  csúcsa az első síknegyedben,  $D$  csúcsa az  $x$  tengely pozitív felén helyezkedik el. A  $BC$  oldal egyenesének egyenlete:  $2x + y = 12$ . A  $CD$  oldal merőleges a  $BC$  oldalra. A négyszög területe 31 területegység. Határozzuk meg a  $B$ ,  $C$  és  $D$  csúcspontok koordinátáit!

**Megoldás.** A  $B$  pont koordinátái  $B(0; 12)$ . Legyen a  $D$  pont első koordinátája  $d$ , azaz  $D(d; 0)$ . A  $CD$  egyenes egyenlete  $x - 2y = d$ . A  $BC$  és  $CD$  egyenesek  $C$  metszéspontja koordinátái  $d$ -vel kifejezve  $x = \frac{1}{5}(24 + d)$ ,  $y = \frac{2}{5}(6 - d)$ . Mivel  $C$  az első síknegyedben van,  $d < 6$ . Legyen  $E$  a  $BC$  egyenes és az  $x$  tengely metszéspontja, ekkor  $E(6; 0)$ .

A  $BAD$  háromszög területe 36 területegység, a  $CDE$  háromszög területe  $d$ -vel kifejezve  $\frac{1}{2}(6-d) \cdot \frac{2}{5}(6-d)$ . Így

$$36 = 31 + \frac{1}{5}(d-6)^2, \quad (d-6)^2 = 5^2,$$

ahonnan  $d = 1$  vagy  $d = 11$ . Most csak a  $d = 1$  lehetséges, hiszen  $d < 6$ . Ha  $d = 1$ , akkor  $D(1; 0)$  és  $C(5; 2)$ .

**6.** Egy forgáscsonkakúp alap-, illetve fedőkörének sugara  $R$  illetve  $r$  ( $R > r$ ). Egy, az alapokkal párhuzamos sík két olyan részre osztja a csonkakúpot, hogy a nagyobb sugarú résznél keletkező csonkakúp térfogata harmada az eredeti csonkakúp térfogatának. Fejezzük ki  $R$ -rel és  $r$ -rel a síkmetszet sugarát!

**Megoldás.** Legyen a csonkakúp térfogata  $3V$ , a kiegészítő kúp térfogata  $V_1$ , a kimetszett kör sugara  $x$ . A hasonló testek térfogatának aránya egyenlő a megfelelő szakaszok köbének arányával. Ezért

$$\frac{V_1 + 3V}{V_1} = \frac{R^3}{r^3} \quad \text{és} \quad \frac{V_1 + 2V}{V_1} = \frac{x^3}{r^3},$$

$$1 + 3 \cdot \frac{V}{V_1} = \frac{R^3}{r^3} \quad \text{és} \quad 1 + 2 \cdot \frac{V}{V_1} = \frac{x^3}{r^3}.$$

Az egyenlő együtthatók módszerével  $\frac{V}{V_1}$  kiküszöbölhető:  $1 = \frac{3x^2 - 2R^3}{r^3}$ , ahonnan a kimetszett kör sugara

$$x = \sqrt[3]{\frac{r^3 + 2R^3}{3}}.$$

**7.** Igazoljuk, hogy a  $(\sin x - \sqrt{3} \cos x) \cdot \cos 4x = 2$  egyenletnek nincs megoldása a valós számok halmazán.

**Megoldás.** Az egyenlet mindkét oldalát 2-vel osztva

$$\left( \frac{1}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x \right) \cdot \cos 4x = 1.$$

Mivel  $\frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$  és  $\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \frac{\pi}{3}$ , ezért az egyenlet:

$$\sin \left( x - \frac{\pi}{3} \right) \cdot \cos 4x = 1.$$

Ez pontosan akkor teljesül, ha  $\sin \left( x - \frac{\pi}{3} \right) = 1$  és  $\cos 4x = 1$  vagy  $\sin \left( x - \frac{\pi}{3} \right) = -1$  és  $\cos 4x = -1$ , tehát

$$x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \text{és} \quad 4x = 2n\pi, \quad k, n \in \mathbb{Z}$$

vagy

$$x - \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \quad \text{és} \quad 4x = \pi + 2n\pi, \quad k, n \in \mathbb{Z}.$$

Innen  $6x = 5\pi + 12k\pi$  és  $6x = 3n\pi$  vagy  $12x = 22\pi + 24k\pi$  és  $12x = 3\pi + 6k\pi$ , azaz  $3n - 12k = 5$  vagy  $6n - 24k = 19$ , ahol  $k$  és  $n$  egészek.

Ezek az egyenletek egyetlen  $(n, k)$  egész számokból álló számpárra sem teljesülnek, hiszen az első esetben a bal oldal osztható 3-mal, a jobb oldal nem, a második esetben a bal oldal páros, a jobb oldal páratlan, tehát az egyenletnek nincs megoldása.

**8.** Tekintsük a  $4^x + 2(n+1) \cdot 2^x + n^2 = 8$  egyenletet, ahol az  $n$  paraméter egész szám ( $n \in \mathbb{Z}$ ).

a) Milyen  $n$  esetén van az egyenletnek két különböző megoldása a valós számok halmazán?

b) Milyen  $n$  esetén van az egyenletnek pontosan egy megoldása?

Adjuk meg a lehetséges gyökök értékét is!

**Megoldás.** a) A  $2^x$ -re másodfokú egyenletnek akkor van két különböző megoldása, ha az egyenlet diszkriminánsa pozitív, és mindkét megoldás pozitív, hiszen  $2^x > 0$ .

$$D = 4(n+1)^2 - 4(n^2 - 8) \equiv 4(2n+9) > 0, \quad n > -\frac{9}{2}.$$

Ha  $D > 0$ , akkor a másodfokú egyenlet két gyöke pontosan akkor pozitív, ha összegük is és szorzatuk is pozitív:  $-2(n+1) > 0$  és  $n^2 - 8 > 0$ . Ezek együtt akkor teljesülnek, ha  $-\frac{9}{2} < n < -\sqrt{8}$ , ezért  $n = -4$  vagy  $n = -3$ .

Ha  $n = -4$ , akkor  $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$ ,  $2^x = 4$  vagy  $2^x = 2$ ,  $x_1 = 2$ ,  $x_2 = 1$ .

Ha  $n = -3$ , akkor  $4^x - 4 \cdot 2^x + 1 = 0$ ,  $2^x = 2 + \sqrt{3}$  vagy  $2^x = 2 - \sqrt{3}$ ,  $x_3 = \log_2(2 + \sqrt{3})$ ,  $x_4 = \log_2(2 - \sqrt{3})$ .

b) Pontosán egy megoldás akkor van, ha  $D = 0$  és  $2^x > 0$ , vagy  $D > 0$  és  $2^x$  egyik értéke pozitív, a másik negatív, a szorzatuk,  $n^2 - 8$  tehát negatív. Az első eset nem lehetséges, hiszen  $D = 0$  akkor teljesül, ha  $n = -\frac{9}{2}$ , ami nem egész.

Ha  $D > 0$ , azaz  $-\frac{9}{2} < n$  és  $n^2 - 8 < 0$ , akkor  $-\sqrt{8} < n < \sqrt{8}$ , azaz  $n = -2$ ,  $n = -1$ ,  $n = 0$ ,  $n = 1$  vagy  $n = 2$ .

Ha  $n = -2$ , akkor  $2^x = 1 + \sqrt{5}$ ,  $x_6 = \log_2(1 + \sqrt{5})$ ; ha  $n = -1$ , akkor  $2^x = \sqrt{2}$ ,  $x_7 = \log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2}$ ; ha  $n = 0$ , akkor  $2^x = 2$ ,  $x_8 = 1$ ; ha  $n = 1$ , akkor  $2^x = -2 + \sqrt{11}$ ,  $x_9 = \log_2(-2 + \sqrt{11})$  végül ha  $n = 2$ , akkor  $2^x = -3 + \sqrt{13}$ ,  $x_{10} = \log_2(-3 + \sqrt{13})$ .