


1. Jelölje  $C_n$  és  $E_n$  az  $|x| + |y| \leq n$  egyenlőtlenség, illetve az  $|x| + |y| = n$  egyenlet egész megoldásainak a számát. Ekkor nyilván  $C_0 = E_0 = 1$  és  $C_i = E_i + C_{i-1}$ . Adjuk össze ezeket az egyenlőségeket az  $i = 1, 2, \dots, n$  értékekre:

$$C_1 + C_2 + \dots + C_n = E_1 + E_2 + \dots + E_n + C_0 + C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1},$$

azaz

$$C_n = E_1 + E_2 + \dots + E_n + C_0.$$

Az  $E_i$  halmaz elemei az  $|x| + |y| = i$  egyenlet egész megoldásai (ábra). Az  $x \geq 0, y \geq 0$  síknegyedben  $i + 1$  megoldást kapunk, ezek:  $(i; 0), (i-1; 1), \dots, (0; i)$ . A további három síknegyeddal együtt ez összesen  $4(i+1)$  megoldás, így azonban a tengelyeken lévő összesen 4 megoldás mindegyikét kétszer számoltuk. Eszerint  $E_i = 4i$ , ha  $i > 0$ .



Így  $C_n = 4(1 + 2 + \dots + n) + 1 = 2n^2 + 2n + 1$ . Behelyettesítve  $C_{1000} = 2\,002\,001$ .

2. Legyen  $\sqrt[3]{7 + 5\sqrt{2}} = u$  és  $u$  konjugáltját,  $\sqrt[3]{7 - 5\sqrt{2}}$ -t jelöljük  $v$ -vel. Ekkor

$$uv = \sqrt[3]{(7 + 5\sqrt{2})(7 - 5\sqrt{2})} = -1.$$

Próbáljuk kiszámolni  $u + v$  értékét. Az  $(u + v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v)$  azonosság felhasználásával  $(u + v)^3 = 7 + 5\sqrt{2} + 7 - 5\sqrt{2} - 3(u + v)$ , tehát  $t = u + v$  gyöke a  $t^3 = 14 - 3t$  egyenletnek. Némi próbálkozás után kapjuk, hogy az egyenletnek megoldása a 2, ennek megfelelően  $t^3 + 3t - 14 = (t - 2)(t^2 + 2t + 7)$ . A másodfokú tényezőnek nincsen valós gyöke, így ha  $t$  olyan valós szám, amelyre  $t^3 + 3t - 14 = 0$ , akkor  $t = 2$ .

$u$ -ra és  $v$ -re az  $uv = -1, u + v = 2$  egyenleteket kaptuk, a gyökök és együtthatók közti összefüggések szerint tehát  $u$  (és persze  $v$ ) gyökei az

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

egyenletnek.

*Megjegyzések.* 1. Némi próbálkozás után felismerhető, hogy a köbgyök alatt  $7 + 5\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^3$  áll. Így  $u = 1 + \sqrt{2}$ , ahonnan ugyancsak felírható a keresett egyenlet:

$$x = 1 + \sqrt{2} \Rightarrow x - 1 = \sqrt{2} \Rightarrow (x - 1)^2 = 2 \Rightarrow (x - 1)^2 - 2 = x^2 - 2x - 1 = 0.$$

2. Ha közvetlenül az  $x = \sqrt[3]{7 + 5\sqrt{2}}$  „egyenletre” alkalmazzuk az előbbi módszert, akkor köbre emelés után  $x^3 = 7 + 5\sqrt{2}$  adódik, amit rendezve és négyzetre emelve  $(x^3 - 7) = 50$ , azaz a hatodfokú  $x^6 - 14x^3 - 1 = 0$  egyenlet adódik. Ennek a polinomnak valóban osztója az  $x^2 - x - 1$  polinom.

3. Ha a három szomszédos páros szám közül a középső osztható 4-gyel, akkor a két szélső  $4k - 2$  és  $4k + 2$  alakú szám a 2-nek pontosan az első hatványával osztható, ebben az esetben a középső szám megfelelő. Ha pedig a középső páros szám nem osztható 4-gyel, akkor mindkét szélső páros szám a 4-nek többszöröse. Közülük pontosan egy 8-cal is osztható és így rendelkezik az előírt tulajdonsággal.

4. Ha a sorozat differenciája nulla, akkor  $\sqrt{a_i} = \sqrt{a_1}$ , a bal oldalon az  $n - 1$  egyenlő tagból álló összeg értéke  $\frac{n-1}{2\sqrt{a_1}}$ , ami egyenlő a jobb oldal értékével.

Ha  $d \neq 0$ , akkor gyöktelenítsük a nevezőket:

$$\frac{1}{\sqrt{a_i} + \sqrt{a_{i+1}}} = \frac{\sqrt{a_{i+1}} - \sqrt{a_i}}{a_{i+1} - a_i} = \frac{1}{d} (\sqrt{a_{i+1}} - \sqrt{a_i}).$$

A bal oldal értéke tehát

$$\frac{1}{d} (\sqrt{a_n} - \sqrt{a_{n-1}} + \sqrt{a_{n-1}} - \sqrt{a_{n-2}} + \dots + \sqrt{a_2} - \sqrt{a_1}) = \frac{\sqrt{a_n} - \sqrt{a_1}}{d}.$$

A jobb oldalon a nevezőt gyöktelenítve

$$\frac{(n-1)(\sqrt{a_n} - \sqrt{a_1})}{a_n - a_1}$$

adódik, ami  $a_n - a_1 = (n-1)d$  miatt valóban egyenlő a bal oldal értékével.

5.  $\overline{ababab} = \overline{ab} \cdot 10101 = \overline{ab} \cdot 3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 37$ . Ennek a számnak a legnagyobb prímosztója a 37-nél nagyobb  $\overline{ab}$  prím lehet. A legnagyobb kétjegyű prím a 97, így 979 797 esetén kapjuk a legnagyobb prímosztót, értéke 97.

6. A logaritmus értelmezése szerint  $x > 0$ ,  $x \neq 1$  és  $y > 0$ . A feltétel szerint  $x$  és  $y$  egész számok, így  $x \geq 2$ ,  $y \geq 1$ . Ekkor a bal oldal is értelmes. A jobb oldal  $\log_x xy$ , a logaritmusfüggvény kölcsönösen egyértelmű, tehát  $5\sqrt{xy} + 24 = xy$ .

$0 \leq \sqrt{xy}$ -ra nézve másodfokú egyenletet kaptunk, ennek nemnegatív gyöke 8, ahonnan  $xy = 64$ . Mivel  $x \geq 2$  egész, a  $64 = 2^6$ -nak 1-nél nagyobb osztói lehetnek  $x$  értékei és minden ilyen  $x$ -re  $y = \frac{64}{x}$  pozitív egész. Lépéseink megfordíthatók, így ezek a számpárok megoldásai az eredeti egyenletnek.

Az egyenlet tehát összesen hat pozitív egész számpárra teljesül.

7.  $0 < a_n < 2$  pontosan akkor teljesül, ha

$$3 < \log_2(n+4) < 5.$$

Az  $x \mapsto \log_2 x$  függvény szigorúan monoton növekvő, így a feltétel ekvivalens a

$$2^3 < n+4 < 2^5$$

egyenlőtlenséggel. A  $]2^3; 2^5[$  intervallumban  $2^5 - 1 - 2^3 = 23$  egész szám van.  $n+4$  ezek mindegyikét fölveszi és  $\log_2(n+4)$  ezek mindegyikére értelmes.

A sorozatnak tehát 23 olyan pozitív eleme van, amely kisebb 2-nél.

**8. I. megoldás.** Jelöljük a bal oldalon álló függvényt  $f(x)$ -szel és a második tagban alakítsunk teljes négyzetté a négyzetgyökök alatt:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 9} + \sqrt{(x-8)^2 + 9}.$$

Ekkor  $g(x) = f(x+4) = \sqrt{(x+4)^2 + 9} + \sqrt{(x-4)^2 + 9}$ , így elegendő  $g(x)$  minimális értékét keresni. Mivel  $g(x) > 0$ , azért  $g(x)$  akkor minimális, ha  $g^2(x)$  minimális.

$$\begin{aligned} g^2(x) &= 2(x^2 + 25) + 2\sqrt{(x^2 + 25 + 8x)(x^2 + 25 - 8x)} = \\ &= 2(x^2 + 25) + 2\sqrt{(x^2 + 25)^2 - 64x^2}. \end{aligned}$$

A második gyökjel alatt két pozitív mennyiség szorzata áll:

$$(x^2 + 25)^2 - 64x^2 = x^4 - 14x^2 + 25^2 \geq x^4 - 50x^2 + 25^2 = (x^2 - 25)^2,$$

és pontosan akkor van egyenlőség, ha  $x^2 = 0$ . Így

$$g^2(x) \geq 2(x^2 + 25) + 2\sqrt{(x^2 - 25)^2} = 2(x^2 + 25) + 2|x^2 - 25| = \begin{cases} 4x^2, & \text{ha } x^2 \geq 25 \\ 100, & \text{ha } x^2 < 25. \end{cases}$$


Ha  $x^2 \geq 25$ , akkor  $4x^2 \geq 100$ , így mindenképpen

$$g^2(x) \geq 100, \text{ azaz } g(x) \geq 10,$$

egyenlőség pedig pontosan akkor teljesül, ha  $x^2 = 0$ , azaz  $x = 0$ . Így  $f(x) = g(x-4) \geq 10$  és pontosan akkor van egyenlőség – azaz  $f(x)$  pontosan akkor minimális –, ha  $x = 4$ .

**II. megoldás.**  $f(x)$  két tagjának geometriai jelentés tulajdonítható.

Tekintsük a derékszögű koordináta-rendszerben az  $O(0;0)$ ,  $A(8;0)$  és az  $y = 3$  egyenesen mozgó  $P(x;3)$  pontokat (1. ábra).




1. ábra

Ekkor az ismert távolságformula szerint

$$PO = \sqrt{x^2 + 3^2} \quad \text{és} \quad PA = \sqrt{(x - 8)^2 + 3^2}.$$

A feladat kérdése tehát úgy fogalmazható, hogy az  $e$  egyenes mely  $P$  pontjára lesz minimális a  $PO + PA$  távolságösszeg.

A feladat jól ismert megoldását úgy kapjuk, hogy az egyik rögzített pontot – legyen ez az  $O$  – tükrözzük az  $e$  egyenesre (2. ábra). Ekkor az  $O'A$  szakasz  $e$ -vel való  $P$  metszéspontjában adódik a minimum.



2. ábra

Valóban, az egyenes tetszőleges,  $P$ -től különböző  $P_1$  pontjára  $OP_1 = O'P_1$  a tükrözés miatt, a háromszög-egyenlőtlenség szerint pedig  $O'P_1 + P_1A > O'P + PA = O'A$ .

Mivel az  $e$  egyenes most párhuzamos az  $OA$  szakasszal, az egyenes középvonala az  $AOO'$  háromszögnek, így  $P$  első koordinátája a két rögzített pont,  $O$  és  $A$  első koordinátájának a számtani közepe,  $x_P = \frac{x_O + x_A}{2} = 4$ . A  $PO + PA$  összeg tehát az  $e$  egyenes  $P(4; 3)$  pontjára lesz a legkisebb, így a kifejezés értéke akkor minimális, ha  $x = 4$ .

9. A. Szorozzuk  $\sin 15^\circ + \cos 15^\circ$  értékét  $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ -vel. Az ismert addíciós összefüggés szerint

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin 15^\circ + \cos 15^\circ) = \sin 15^\circ \cdot \cos 45^\circ + \cos 15^\circ \cdot \sin 45^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Így  $\sin 15^\circ + \cos 15^\circ = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ , azaz

$$A = \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right)^{2002} \cdot \frac{1}{3^{1001}} = \frac{1}{2^{1001}}.$$

B. Mivel  $97 + 56\sqrt{3} = (7 + 4\sqrt{3})^2$ , azért

$$B = \log_{7+4\sqrt{3}} \frac{1}{97 + 56\sqrt{3}} = \log_{7+4\sqrt{3}} (7 + 4\sqrt{3})^{-2} = -2.$$

C. Számoljuk  $2C$  értékét úgy, hogy a második alkalommal fordított sorrendben írjuk le az összeg tagjait. (Ahogyan a legenda szerint a kis Gauss összegezte a számtani sorozatot.) Ekkor

$$\begin{aligned} 2C &= \cos(1 \cdot 9^\circ) + \cos(2 \cdot 9^\circ) + \dots + \cos(19 \cdot 9^\circ) + \\ &+ \cos(19 \cdot 9^\circ) + \cos(18 \cdot 9^\circ) + \dots + \cos(1 \cdot 9^\circ). \end{aligned}$$

Az összesen  $2 \cdot 19$  tagú összeg egymás alatt álló tagjai

$$\cos(i \cdot 9^\circ) + \cos[(20 - i) \cdot 9^\circ] = \cos(9i^\circ) + \cos(180^\circ - 9i^\circ)$$

alakúak. Ismeretes, hogy ha  $\alpha + \beta = 180^\circ$ , akkor  $\cos \alpha + \cos \beta = 0$ , így az egymás alatt álló tagok összege 0, tehát  $2C = 0 = C$ .

A megfelelő sorrend tehát  $B < C < A$ .

10. Ha eredetileg  $b$  autóbust rendelték, akkor a feltétel szerint

$$\frac{n}{b-1} = \frac{n}{b} + 5, \quad \text{azaz} \quad n = 5(b^2 - b).$$

Ha  $300 \leq n \leq 400$ , akkor  $60 \leq b^2 - b \leq 80$ , tehát a

$$b^2 - b - 80 \leq 0 \leq b^2 - b - 60$$

egyenlőtlenségrendszerrel kell megoldanunk, ahol  $b$  pozitív egész.

Az első feltételből  $b \leq 9,46$ , a másodiktól pedig  $b \geq 8,26$  adódik. Így  $b = 9$  és  $n = 5 \cdot (9^2 - 9) = 360$ .

11. Ha  $a$  és  $b$  a derékszögű háromszög befogói,  $c$  pedig az átfogó, akkor Pitagorasz tétele szerint  $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ , a feltétel pedig azt jelenti, hogy

$$\frac{x+y}{2} = a+b \quad \text{és} \quad \sqrt{xy} = c = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Innen az

$$x+y = 2(a+b)$$

$$xy = a^2 + b^2$$

egyenletrendszert kapjuk.

A gyökök és együtthatók közti összefüggések szerint  $x$  és  $y$  gyökei a

$$t^2 - 2(a+b)t + a^2 + b^2 = 0$$


másodfokú egyenletnek, amit megoldva  $t_{1,2} = a+b \pm \sqrt{2ab}$ .

Az  $x$ ,  $y$  mennyiségek értéke tehát valamilyen sorrendben  $a+b - \sqrt{2ab}$  és  $a+b + \sqrt{2ab}$ .

*Megjegyzés.* Ha  $a$  és  $b$  pozitív számok, akkor  $a+b - \sqrt{2ab} > 0$ , a feladatnak tehát minden derékszögű háromszögre van megoldása.


12. I. **megoldás.** Vegyünk föl egy derékszögű koordinátarendszert az 1. ábra szerint. Ekkor  $M(6; 2,5)$  és  $F(3,5; -3,5)$ . Az  $MF$  szakasz hosszát a távolságformulával számolva

$$MF = \sqrt{2,5^2 + 6^2} = \sqrt{42,25} = 6,5.$$



1. ábra

II. **megoldás.** Oldjuk meg a feladatot általánosan, legyenek a háromszög befogói  $a$  és  $b$ , átfogója  $c$ . Induljunk ki egy  $a+b$  oldalú  $GSKR$  négyzetből (2. ábra). Ha a négyzet minden oldalát az ábra szerint osztjuk fel  $a$ ,  $b$  hosszúságú szakaszokra, akkor az osztópontok az  $AUTB$  négyzet csúcsai.




2. ábra

A két négyzet közös centruma a  $GK$  átló  $F$  felezőpontja (az  $F$  körüli  $90^\circ$ -os forgatás az ábrát önmagába viszi). Az  $AFB$  tehát egyenlő szárú derékszögű háromszög, a derékszögű csúcsot,  $F$ -et az  $AUTB$  négyzet  $AB$  oldalának  $M$  felezőpontjával összekötő szakasz hossza tehát a négyzet oldalának,  $AB$ -nek a felével egyenlő.

*Megjegyzés.* A feladat háromszögének átfogója  $c = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ , ennek fele  $6,5$ . A második bizonyításból az is kiderül, hogy  $FM$  merőleges  $AB$ -re.

13. A feltételből következik, hogy  $m \geq 3$ . A szoba összesen  $m \cdot n$  darab járólappal fedhető le, a fallal nem érintkező „belső” részen pedig  $(m-2)(n-2)$  járólappal van.



A feltétel szerint

$$mn = 2(m-2)(n-2) = 2mn - 4m - 4n + 8.$$

Rendezés után  $mn - 4m - 4n + 8 = 0$ , azaz

$$(m-4)(n-4) = 8$$

adódik. A bal oldalon  $m-4$  és  $n-4$  egész számok és  $3 \leq m \leq n$  miatt  $-1 \leq m-4 \leq n-4$ , ha tehát a szorzatuk 8, akkor mindkettő pozitív. A 8 pozitív egészek szorzataként  $1 \cdot 8$  vagy pedig  $2 \cdot 4$  alakban áll elő, ha a tényezők nagyságviszonyára is tekintettel vagyunk. Így két megoldást kapunk:

a)  $m-4 = 1$  és  $n-4 = 8$ , azaz  $m = 5$  és  $n = 12$ ;

b)  $m-4 = 2$  és  $n-4 = 4$ , azaz  $m = 6$  és  $n = 8$ .

Mindkét számpár megoldása a feladatnak.

14. Tegyük fel, hogy létezik ilyen mértani sorozat. Ekkor  $a_n \neq a_1$  miatt a sorozat hányadosa,  $q \neq 1$ . A sorozat elemeinek reciprokai is mértani sorozatot alkotnak, ennek hányadosa  $\frac{1}{q} \neq 1$ . Az ismert összefüggés szerint az elemek reciprokának összege

$$8 = \frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_1} \cdot \frac{\left(\frac{1}{q}\right)^n - 1}{\frac{1}{q} - 1} = \frac{1}{a_1} \cdot \frac{1 - q^n}{q^{n-1} - q^n}.$$

Használjuk fel, hogy  $q^{n-1} = \frac{a_n}{a_1}$ . Az elemek reciprokának összege így a következőképpen alakul:

$$8 = \frac{1 - \frac{a_n}{a_1} q}{a_n - q \cdot a_n}.$$

Behelyettesítve

$$8 = \frac{1 - \frac{13}{3}q}{13(1-q)}, \quad \text{ahonnan} \quad q = \frac{309}{299}, \quad \text{vagyis} \quad q^{n-1} = \left(\frac{309}{299}\right)^{n-1} = \frac{a_n}{a_1} = \frac{13}{3}.$$

Innen  $309^{n-1} \cdot 3 = 299^{n-1} \cdot 13$  következik. Mivel  $n \geq 3$  egész, a bal oldal osztható 3-mal, a jobb oldal pedig nem. Ez az egyenlőség tehát egyetlen pozitív egész  $n$ -re sem állhat fenn, a kérdéses mértani sorozat valóban nem létezik.

15. a) Ha  $p\%$  jelöli az átlagos évi hozamot, akkor

$$400\,000 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^2 = 521\,920, \quad \text{ahonnan} \quad 1 + \frac{p}{100} = \sqrt{\frac{521\,920}{400\,000}} \approx 1,1423,$$

az átlagos évi hozam tehát  $p \approx 14,23\%$ .

b) Ha  $q\%$  jelöli a tényleges első évi kamatlábat, akkor a második évi kamatláb  $(q+4,5)\%$ , befektetésünk a második év után  $\left(1 + \frac{q}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{q+4,5}{100}\right)$ -szorosára növekszik.

Így  $q$ -ra a másodfokú

$$\left(1 + \frac{q}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{q+4,5}{100}\right) = \frac{52\,192}{40\,000}$$

egyenletet kapjuk. Rendezés után kapjuk, hogy  $2q^2 + 409q - 5196 = 0$ .

Ennek az egyenletnek a pozitív megoldása  $q = \frac{-409 + 457}{4} = 12$ .

A tényleges kamatláb tehát az első évben 12%, a másodikban pedig 16,5% volt.

*Megjegyzés.* Az átlagos kamatláb *nem* az éves kamatlábak számtani közepe. Az éves szorzószámokat összehasonlítva

$$\left(1 + \frac{p}{100}\right)^2 = \left(1 + \frac{12}{100}\right) \cdot \left(1 + \frac{16,5}{100}\right),$$

azaz  $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$  az  $\left(1 + \frac{12}{100}\right)$  és az  $\left(1 + \frac{16,5}{100}\right)$  *mértani közepe*, valamivel kisebb a számtani közepükénél,  $\left(1 + \frac{12 + 16,5}{200}\right)$ -nál. Ennek megfelelően  $p \approx 14,23$  is valamivel kisebb, mint  $\frac{12 + 16,5}{2} = 14,25$ .

16. a)  $V = V_{\text{kúp}} + V_{\text{cs.kúp}}, \alpha = \frac{108^\circ}{2} = 54^\circ,$


$$r = 2 \sin 54^\circ \approx 1,62, \quad m = 2 \cos 54^\circ \approx 1,18,$$

$$h = \sqrt{4 - (r - 1)^2} \approx 1,9,$$

$$V_{\text{kúp}} = \frac{\pi r^2 m}{3} = \frac{8 \sin^2 54^\circ \cos 54^\circ}{3} \pi \approx 3,22 \text{ cm}^3,$$

$$V_{\text{csokakúp}} = \frac{\pi}{3} \cdot h(r^2 + r + 1) \approx 10,42 \text{ cm}^3,$$

$$V \approx 13,64 \text{ cm}^3.$$



A függőn tömege  $M = V \cdot \rho \approx 106,9$  g.

b) A minimális forgáshenger sugara  $r$ , magassága pedig  $m + h$ . A térfogata így  $V_H = r^2 \pi (m + h) \approx 25,25 \text{ cm}^3$ , így legalább  $V_H - V \approx 11,61 \text{ cm}^3$  hulladék keletkezik, ami a henger térfogatának közelítőleg 46%-a.


17.

$$\begin{aligned} AB^2 - BC^2 &= (AB^2 - BP^2) - (BC^2 - BP^2) = \\ &= AP^2 - PC^2 = (AD^2 - DP^2) - (DC^2 - DP^2) = \\ &= AD^2 - DC^2, \end{aligned}$$

azaz  $AB^2 - BC^2 = AD^2 - DC^2$ , vagy átrendezve

$$AB^2 + DC^2 = AD^2 + BC^2;$$

ha a négyszög átlói merőlegesek, akkor a szemközti oldalak négyzetösszege egyenlő.



Thalész tétele szerint  $AB = 2PF_1 = 30$ ,  $BC = 2PF_2 = 26$ ,  $CD = 2PF_3 = 10$ . Így  $AD^2 = AB^2 + DC^2 - BC^2 = 30^2 + 10^2 - 26^2 = 324 = 18^2$ .

Az  $ABCD$  négyszög kerülete  $30 + 26 + 10 + 18 = 84$ .

*Megjegyzés.* A megoldás során talált állításnak a megfordítása is igaz: ha egy négyszög szemközti oldalainak négyzetösszege egyenlő, akkor a négyszög átlói merőlegesek egymásra.

18. Mindkét négyzetgyök alatt teljes négyzet áll:

$$x - 1 - 2\sqrt{x-2} = (\sqrt{x-2} - 1)^2 \quad \text{és} \quad x + 2 - 4\sqrt{x-2} = (\sqrt{x-2} - 2)^2,$$

így a  $|\sqrt{x-2} - 1| + |\sqrt{x-2} - 2| \leq 3$  egyenlőtlenséget kell megoldanunk.

Az abszolút értéket felbontva:

$$|\sqrt{x-2} - 1| + |\sqrt{x-2} - 2| = \begin{cases} 3 - 2\sqrt{x-2}, & \text{ha } \sqrt{x-2} < 1; \\ 1, & \text{ha } 1 \leq \sqrt{x-2} < 2; \\ 2\sqrt{x-2} - 3, & \text{ha } 2 \leq \sqrt{x-2}. \end{cases}$$

Mivel  $\sqrt{x-2} \geq 0$ , azért a vizsgált egyenlőtlenség teljesül, ha  $\sqrt{x-2} < 2$ , ha pedig  $2 \leq \sqrt{x-2}$ , akkor  $2\sqrt{x-2} - 3 \leq 3$ , azaz  $\sqrt{x-2} \leq 3$ .

Összefoglalva: a feladat egyenlőtlensége akkor és csak akkor teljesül, ha  $\sqrt{x-2} \leq 3$ , azaz – figyelembe véve, hogy  $\sqrt{x-2}$ -nek értelmesnek kell lennie –, ha  $2 \leq x \leq 11$ .

19. A feltétel szerint az  $a_{n+1} - a_n$  különbségsorozat elemeire  $a_{n+1} - a_n = b_n = 2 + a_n$ , ahonnan

$$(*) \quad a_{n+1} = 2a_n + 2.$$

Innen  $a_2 = 2a_1 + 2$ ,  $a_3 = 2a_2 + 2 = 4a_1 + 6$ ,  $a_4 = 2a_3 + 2 = 8a_1 + 14$ . A feltétel szerint  $a_1 + a_2 + a_3 + 7 = a_4$ , azaz  $(7a_1 + 8) + 7 = 8a_1 + 14$ , ahonnan  $a_1 = 1$ .

Így  $a_2 = 4$ ,  $a_3 = 2 \cdot 4 + 2 = 10$ ,  $a_4 = 2 \cdot 10 + 2 = 22$ ,  $a_5 = 2 \cdot 22 + 2 = 46$ .

Mivel a bizonyításban eddig nem használtuk fel, hogy a  $b_n = a_{n+1} - a_n$  mértani sorozat, meg kell mutatnunk, hogy ez a feltétel is teljesül, egyébként a feladatnak nincsen megoldása.

A (\*) rekurzió felhasználásával a  $b_n$  különbségsorozatra azt kapjuk, hogy

$$b_n = a_{n+1} - a_n = (2a_n + 2) - (2a_{n-1} + 2) = 2(a_n - a_{n-1}) = 2b_{n-1}.$$

A  $b_n$  sorozat tehát valóban mértani sorozat, a hányadosa 2.


A  $b_n$  sorozat elemei tehát:  $b_1 = a_2 - a_1 = 3$  és így  $b_2 = 2 \cdot 3 = 6$ ,  $b_3 = 12$ ,  $b_4 = 24$ ,  $b_5 = 48$ .

*Megjegyzés.* A  $b_n$  sorozatra vonatkozó észrevétel lehetővé teszi, hogy felírjuk a (\*) rekurzióval értelmezett sorozat  $n$ -edik elemét:

$$\begin{aligned} a_n &= a_n - a_{n-1} + a_{n-1} - a_{n-2} + \dots + a_2 - a_1 + a_1 = \\ &= b_{n-1} + b_{n-2} + \dots + b_1 + a_1 = 1 + 3 \cdot (2^{n-1} - 1). \end{aligned}$$

Hasonlóan kapható meg az  $a_{n+1} = p \cdot a_n + q$  sorozat  $n$ -edik eleme is, ha az első elem,  $a_1$  értéke adott.


20. A tükrözés miatt  $\mathbf{v}' = \overrightarrow{P'Q'} + \overrightarrow{P''Q''}$  párhuzamos az  $e$  egyenessel és így az  $e$ -vel párhuzamos  $\mathbf{v}$  vektorral is (1. ábra).



1. ábra

Az eltolás miatt  $\overrightarrow{P'Q'} = \overrightarrow{PQ}$ , így  $\mathbf{v}' = \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{P''Q''} = (-1; 2) + (2; -1) = (1; 1)$ .

A tükrözés miatt  $\overrightarrow{P'P''}$  merőleges  $e$ -re és így  $\mathbf{v}$ -re is, az eltolás miatt pedig  $\overrightarrow{PP'}$  párhuzamos  $\mathbf{v}$ -vel (2. ábra).



2. ábra

Ha tehát a  $\overrightarrow{PP''} = (3; 1)$  vektort felbontjuk egy  $\mathbf{v}$ -vel párhuzamos és egy  $\mathbf{v}$ -re merőleges vektor összegére, akkor a vektorfelbontás egyértelműsége miatt a  $\mathbf{v}$ -vel párhuzamos összetevő éppen  $\overrightarrow{PP'} = \mathbf{v}$ , a  $\mathbf{v}$ -re merőleges összetevő pedig  $\overrightarrow{P'P''}$ .

Legyen  $\overrightarrow{PP'} = t \cdot \mathbf{v}' = (t; t)$ . Ez akkor lesz megfelelő, ha  $\overrightarrow{PP''} - t \cdot \mathbf{v}' = (3 - t; 1 - t)$  merőleges  $\mathbf{v}'$ -re, azaz skalárszorzatuk nulla:

$$(\overrightarrow{PP''} - t \cdot \mathbf{v}') \cdot \mathbf{v}' = 0.$$

A  $(3 - t; 1 - t) \cdot (1; 1)$  skalárszorzat értéke  $4 - 2t$ , ez pontosan akkor 0, ha  $t = 2$ .

Így  $\mathbf{v} = t \cdot \mathbf{v}' = (2; 2)$ , a  $P'$  pont koordinátái  $\overrightarrow{PP'} = \mathbf{v}$  miatt  $P'(1 + 2; 2 + 2)$ .

Az  $e$  egyenesnek  $\mathbf{v}$  egy irányvektora, egyenletéhez elég egyetlen pontja. A tükrözés miatt a  $P'P''$  szakasz felezőpontja  $\left(\frac{3+4}{2}; \frac{4+3}{2}\right)$  rajta van az  $e$  egyenesen, amelynek egyenlete így  $y - x = 0$ .