

I. rész

1. Határozza meg az a és b pozitív egész számok lehetséges értékeit, ha $a < b$, továbbá teljesül, hogy ha x és y eleme az $[a; b]$ intervallumnak, akkor $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ is eleme $[a; b]$ -nek! (12 pont)

Megoldás. Nem lehet $a > 1$, mert akkor $a \geq 2$ miatt $x \geq 2$ és $y \geq 2$ lenne, és így $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ lenne, ami ellenkezik $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq a \geq 2$ -vel. Tehát $a = 1$.

A b értéke csak 2 lehet, mert egyrészt $b > a$ miatt $b \geq 2$, másrészt $b > 2$ nem lehet. Ugyanis $b > 2$ esetén $x = 2,5$ és $y = 2,5$ az $[a; b]$ eleme, de

$$\frac{1}{2,5} + \frac{1}{2,5} = 0,8 < 1 = a$$

miatt $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ nem eleme $[a; b]$ -nek.

Az $a = 1$, $b = 2$ jó, mert $1 \leq x \leq 2$ és $1 \leq y \leq 2$ esetén $1 \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \leq 2$.

Tehát a keresett számok: $a = 1$ és $b = 2$.

2. a) Oldja meg a valós számok halmazán a

$$\sqrt{1 + x\sqrt{x^2 - 16}} = x - 1$$

egyenletet!

(5 pont)

b) Adja meg a fenti egyenlet alaphalmazát!

(7 pont)

Megoldás. Ha van az egyenletet kielégítő x , akkor az egyenlet két oldalának négyzete is egyenlő:

$$1 + x\sqrt{x^2 - 16} = x^2 - 2x + 1, \quad \text{azaz} \quad x\sqrt{x^2 - 16} = x^2 - 2x.$$

Az eredeti egyenletnek $x = 0$ nem megoldása, tehát a megoldásra $\sqrt{x^2 - 16} = x - 2$ is, így $x^2 - 16 = x^2 - 4x + 4$ is teljesül, ezért a megoldás csak $x = 5$ lehet.

Behelyettesítés mutatja, hogy ez valóban megoldás is.

b) Az alaphalmaz azokból az x valós számokból áll, amelyekre egyrészt $x^2 - 16 \geq 0$, és így $|x| \geq 4$ is, másrészt $x\sqrt{x^2 - 16} \geq -1$ is teljesül. Ez utóbbi nemnegatív x -re mindig teljesül. Negatív x -re pedig pontosan akkor, ha $|x|\sqrt{x^2 - 16} \leq 1$, azaz ha $x^4 - 16x^2 - 1 \leq 0$.

$x^4 - 16x^2 - 1 \leq 0$ megoldásai a $8 - \sqrt{65} \leq x^2 \leq 8 + \sqrt{65}$ egyenlőtlenséget teljesítő x értékek, tehát azok, amelyekre $-\sqrt{8 + \sqrt{65}} \leq x \leq \sqrt{8 + \sqrt{65}}$ teljesül. Ezek közül a negatívak: $-\sqrt{8 + \sqrt{65}} \leq x < 0$.

Tehát a keresett alaphalmaz:

$$[-\sqrt{8 + \sqrt{65}}; -4] \cup [4; \infty).$$

3. Egy autókereskedő ötfajta autót forgalmaz. Az egyes fajták darabját

2,3 2,8 3 3,1 3,5

Mft-ért adja el, és nyeresége (az eladási ár és a beszerzési ár különbsége) fajtánként a fenti sorrendben az eladási ár

3 2,5 2,4 2,1 2

százaléka. Ez a két adatsor a további vizsgálatok során nem változik. Az egyes fajtákból (fenti sorrendben)

2003-ban	25	32	27	38	19	darabot,
2004-ben	27	31	29	32	33	darabot

adott el.

a) Mennyi volt a nyeresége 2003-ban, és mennyi 2004-ben?

(5 pont)

b) Ha 2005-ben csak egy autófajta forgalmaz, akkor melyik autófajta (mennyi annak az egységára) érdemes forgalmaznia, és abból legalább hányat kell eladnia, ha a lehető legkevesebb autó eladásával akarja elérni a 2004-es nyereségét? (7 pont)

Megoldás. a) A nyereség 2003-ban:

$$2,3 \cdot 0,03 \cdot 25 + 2,8 \cdot 0,025 \cdot 32 + 3 \cdot 0,024 \cdot 27 + 3,1 \cdot 0,021 \cdot 38 + 3,5 \cdot 0,02 \cdot 19 =$$

$$= 9,7128 \text{ (MFt)}.$$

A nyereség 2004-ben:

$$2,3 \cdot 0,03 \cdot 27 + 2,8 \cdot 0,025 \cdot 31 + 3 \cdot 0,024 \cdot 29 + 3,1 \cdot 0,021 \cdot 32 + 3,5 \cdot 0,02 \cdot 33 =$$

$$= 10,5142 \text{ (MFt)}.$$

b) A legnagyobb nyereség egy autó eladásánál annál az autófajtánál van, amelynél az eladási ár százaléktéke a legnagyobb. Ezek a százaléktékek rendre

$$2,3 \cdot 0,03 = 0,069; \quad 2,8 \cdot 0,025 = 0,07; \quad 3 \cdot 0,024 = 0,072;$$

$$3,1 \cdot 0,021 = 0,0651; \quad 3,5 \cdot 0,02 = 0,07,$$

így a legnagyobb százalékték (a 0,072) a 3 MFt árú autófajtánál van.

Ebből az autófajtából legalább annyit kell eladnia, amennyivel a nyereség először nagyobb vagy egyenlő a 2004-es nyereségnél. Ez a szám:

$$\frac{10,5142}{0,072} = 146,03055\dots$$

miatt 147.

4. Az r és az R sugarú körök kívülről érintik egymást, és $r < R$. Közös külső érintőik szöge α .

a) Mennyi $\frac{R}{r}$, ha $\alpha = 60^\circ$? (5 pont)


b) Mennyi α , ha $\frac{R}{r} = \frac{5}{3}$? (5 pont)

c) Mennyi annak a négyszögnek a területe, amelynek két csúcsa a körök középpontja, további két csúcsa pedig az egyik közös külső érintőn levő két érintési pont, ha $R = 5$ és $r = 3$? (5 pont)

Megoldás. a) A c) részben említett négyszögben az egyik szárral párhuzamosan és a másik szár végpontján át húzott egyenes olyan $O_1B_1O_2$ derékszögű háromszöget jelöl ki, amelyből

$$\frac{R-r}{R+r} = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}.$$

Ebből $\frac{R}{r} = 3$.



b) A fenti egyenletet kissé átrendezve:

$$\frac{\frac{R}{r} - 1}{\frac{R}{r} + 1} = \sin \frac{\alpha}{2}.$$

Ebből $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{4}$, így a keresett érték: $\alpha \approx 29^\circ$.

c) A kérdéses négyszög olyan derékszögű trapéz, amelynek alapjai R és r , az ezekre merőleges szár a már említett derékszögű háromszögből Pitagorasz tételével számítható:

$$m = \sqrt{(R+r)^2 - (R-r)^2} = 2\sqrt{Rr}.$$

A keresett terület az adott sugárértékekkel:

$$\frac{5+3}{2} \cdot 2\sqrt{5 \cdot 3} = 8\sqrt{15} \approx 30,98.$$

II. rész

5. A H halmaz a 2005-nél nem nagyobb pozitív egész számok halmazának olyan részhalmaza, hogy tetszőleges két elemének összege nem osztható hárommal. Legfeljebb hány eleme van ennek a H halmaznak? (14 pont)

Megoldás. Vizsgáljuk a 2005-nél nem nagyobb pozitív egész számokat a hárommal való osztási maradékaik szerint. Az olyan számokból, amelyeknek az osztási maradéka 0, csak egy szerepelhet a H halmazban, mert két ilyen szám összege osztható hárommal.

Ha 1, vagy ha 2 az osztási maradék, akkor csak az egyik fajta szerepelhet H -ban, mert különböző fajták összege osztható hárommal. Egy fajtából viszont akármennyi lehet, és a 0 maradékot adó szám is ott lehet közöttük. A kérdés most már csak az, hogy melyik fajtából van több az adott halmazunkban.

2004 osztható hárommal, így 1-től 2004-ig ugyanannyi szám ad 1 maradékot, mint ahány 2 maradékot, és a számuk 668. Mivel 2005 maradéka 1, azért az 1 maradékot adókat és egy 0 maradékot adót választva a H halmazba, maximális elemszám érhető el, és ez a szám 670.

6. Egy dobozban öt piros golyó van.

a) Hány fehér golyót kell a dobozba tennünk, ha azt akarjuk, hogy ezután a dobozból a golyók közül egyet véletlenszerűen kihúzva (a golyók kihúzásának valószínűsége megegyezik) a kihúzott golyó 0,25 valószínűséggel piros legyen? (6 pont)

b) Legalább hány fehér és legalább hány fekete golyót kell a dobozba tennünk (mindegyikből legalább egyet teszünk), ha azt akarjuk, hogy ezután a dobozból a golyók közül egyet véletlenszerűen kihúzva, a kihúzott golyó 0,25 valószínűséggel ne fekete legyen? (10 pont)

Megoldás. a) Ha x darab fehér golyót teszünk a dobozba, akkor $\frac{5}{5+x}$ a valószínűsége annak, hogy a kihúzott golyó piros lesz. Az $\frac{5}{5+x} = 0,25$ egyenlet megoldása $x = 15$, tehát a keresett szám 15.

b) Ha x darab fehér és y darab fekete golyót teszünk a dobozba, akkor $\frac{5+x}{5+x+y}$ a valószínűsége annak, hogy a kihúzott golyó piros vagy fehér lesz, tehát nem lesz fekete. Az

$$\frac{5+x}{5+x+y} = 0,25$$

egyenlet átrendezve (x és y nem negatívok, a nevező nem 0): $y = 3x + 15$.

Tehát a keresett számok: $x = 1$, $y = 18$.

7. Oldja meg a valós számok halmazán az

$$\log_x(x^2 + x - 4) < 1$$

egyenlőtlenséget!

(16 pont)

Megoldás. Nyilvánvaló, hogy a logaritmus alapja miatt csak a pozitív x értékek jöhetnek számításba. Teljesülni kell $x^2 + x - 4 > 0$ -nak is, ami

$$x < \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{17}), \quad \text{valamint} \quad x > \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{17})$$

esetén igaz. Ez és $x > 0$ akkor teljesül, ha $x > \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{17})$.

Ekkor az alapszám 1-nél nagyobb, és ilyen alapszám esetén a logaritmus pontosan akkor kisebb 1-nél, ha a logaritmálandó mennyiség kisebb az alapszámnál, tehát a mi esetünkben, ha $x^2 + x - 4 < x$. Ez $-2 < x < 2$ esetén teljesül, tehát a feladat megoldása $\frac{1}{2}(\sqrt{17} - 1) < x < 2$.

8. Legyen A az a háromoldalú egyenes hasáb, amelynek alaplapja 2 oldalhosszúságú szabályos háromszög és oldal-élének hossza is 2. Az egyik oldallapjának középpontján áthaladó, a lapra merőleges egyenes körül forgassuk el az A testet 90° -kal, és jelöljük A' -vel az elforgatott testet!

Mennyi az $A \cup A'$ test


a) térfogata?

(8 pont)

b) felszíne?

(8 pont)

Megoldás. Könnyű belátni, hogy $A \cap A'$ olyan négyoldalú egyenes gúla, amelynek alapja a közös oldallap, magassága a hasáb alaplapjának magassága.



a) $A \cap A'$ térfogata:

$$2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,31.$$

$A \cup A'$ térfogata:


$$2 \cdot \sqrt{3} \cdot 2 - \frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{8\sqrt{3}}{3} \approx 4,62.$$

b) $A \cup A'$ felszínének meghatározásához elegendő azt észrevenni, hogy ez a felszín az A felszínénél a hasáb két párhuzamos lapjának területével nagyobb, mert egy oldallap közös, két-két oldallap megmaradó része pedig együtt adja ki A két oldallapját. Tehát a keresett felszín: $3 \cdot 4 + 4 \cdot \sqrt{3} \approx 18,93$.

9. a) Írja fel azoknak a paraboláknak az egyenletét, amelyek grafikonja a $P(1;0)$ pontban érinti az $y = 2 - 2x$ egyenletű egyenes grafikonját, és tengelye az y tengellyel párhuzamos! (9 pont)

b) Hol helyezkednek el ezeknek a paraboláknak a csúcspontjai? (9 pont)

Megoldás. a) A parabolák egyenletét $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) alakban keressük. Mivel a parabola illeszkedik a $P(1;0)$ pontra, $0 = a + b + c$, azaz $c = -a - b$.



Az adott egyenesnek és ennek a parabolának csak egy közös pontja lehet, ezért a

$$2 - 2x = ax^2 + bx - a - b$$

egyenletnek csak egy gyöke lehet.

A diszkriminánsa:

$$(b + 2)^2 + 4a(a + b + 2) = (b + 2 + 2a)^2 = 0,$$

így $b = -2a - 2$.

A parabolák egyenlete tehát

$$y = ax^2 - (2a + 2)x + a + 2,$$

ahol $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

b) A parabolák csúcspontját a szélsőérték helye és nagysága alapján határozzuk meg. Helye: $\frac{a+1}{a}$, nagysága:

$$a \left(\frac{a+1}{a} \right)^2 - (2a+2) \frac{a+1}{a} + a + 2 = -\frac{1}{a}.$$

($a \neq 0$, ezt az elején kikötöttük.) A csúcspontok paraméteres egyenlete: $x = \frac{a+1}{a}$, $y = -\frac{1}{a}$. Ez éppen az $x + y = 1$ egyenletű egyenes, ahol az $x \neq 1$, $y \neq 0$, tehát a P pont kivételével.

A csúcspontok tehát ezen az egyenesen vannak, és nyilvánvaló (bár ezt nem kérdezte a feladat), hogy az egyenes pontjai P kivételével csúcspontok.