

A következőkben a matematikának több ágában is fontos szerepet betöltő eszközeivel, a Baire kategória-tétellel és annak néhány alkalmazásával ismertetjük meg az Olvasót. A tárgyalásmód egyszerűségének érdekében a tétel egydimenziós esetével foglalkozunk részletesen, és minden felhasználásra kerülő fogalomra emlékeztetünk. A cikk első felében ismertetünk néhány klasszikus kérdést, amelyeket először a Baire-tétel nélkül válaszolunk meg. A bizonyításokban rejlő közös ötlet segítségével maga a tétel is könnyen fog adódni. Később alkalmazásként újra megoldjuk a feladatokat, és egy másik, a KöMaL idei első számában kitűzött feladatot is. Végül kitérünk a lehetséges általánosításokra is. A cikkben szereplő fogalmak és tételek részletes tárgyalását illetően ajánljuk a [2] könyvet, továbbá annak irodalomjegyzékét, ahol megtalálhatók a tételek eredeti forrásai.

Klasszikus példák

Nyílt, zárt halmazok. A halmazok geometriából általánosított tulajdonságait vizsgáló ága a matematikának a topológia. Ezek a tulajdonságok lehetnek lokális, azaz környezetbeli, és globális, azaz egy egész halmazra kiterjedők. E téma kör alapvető fogalma a halmazok nyílt, illetve zárt volta. A továbbiakban a valós számokra szorítkozunk, ekkor egy intervallum nyílt, ha egyik végpontját sem tartalmazza, és zárt, ha mindkettőt. E speciális eset segítségével definiálhatjuk tetszőleges halmaz nyíltságának, zártságának fogalmát.

1. definíció. A $G \subset \mathbb{R}$ halmazt *nyílt*nek nevezzük, ha minden $x \in G$ esetén létezik nyílt I intervallum úgy, hogy $x \in I \subset G$. Más szóval, G minden pontja körül létezik G -beli nyílt részintervallum. Egy $F \subset \mathbb{R}$ halmaz *zárt*, ha a komplementere, azaz $\mathbb{R} \setminus G$ nyílt. Az üreshalmaz a definícióból adódóan nyílt és zárt is egyben.

Világos, hogy megszámlálható¹ sok nyílt halmaz uniója is nyílt (ez valójában tetszőleges számosságú unióra is igaz). Valóban, ha $x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} G_i$, ahol a G_i halmazok nyíltak, akkor van olyan k index, hogy $x \in G_k$. Mivel G_k nyílt halmaz, ezért létezik x -et tartalmazó, G_i -beli nyílt I részintervallum. Ekkor viszont I része a G_i halmazok uniójának is.

Könnyen látható az is, hogy véges sok nyílt halmaz metszete is nyílt. Valóban, két nyílt intervallum metszete nyílt. Két tetszőleges nyílt halmaz egy közös pontját véve (ha ilyen nincs, akkor a metszetük az üreshalmaz, amely nyílt), mindkét halmazban van a pontot tartalmazó nyílt részintervallum. Ezek metszete nyílt, tartalmazza a pontot és része a két halmaz metszetének. Innen indukcióval adódik tetszőleges véges sok nyílt halmaz metszetének nyíltsága.

Zárt halmazokra analóg tulajdonságokat fogalmazhatunk meg, ha az előbbi érvelésekben a nyílt halmazokat „kicszeréljük” a komplementerükre, amelyek zárt

¹Megszámlálható sok halmaz kifejezésen röviden azt értjük, hogy a szóban forgó halmazok megszámozhatók a pozitív egész számokkal, beleértve a véges sok halmaz esetét is.

halmazok. Így kapjuk, hogy megszámlálható sok zárt halmaz metszete zárt, továbbá véges sok zárt halmaz uniója zárt.

Végtelen sok nyílt halmaz metszete azonban már nem feltétlenül nyílt. Tekintsük ehhez például a $\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ nyílt intervallumokat, minden pozitív egész n -re; ezzel megszámlálhatóan végtelen sok nyílt halmazt adtunk meg, amelyek metszete a csak nullából álló egyelemű halmaz, ami nem nyílt.

A fentiek alapján felvetődik a kérdés, hogy vajon melyek azok a halmazok, amelyek előállnak megszámlálható sok nyílt halmaz metszeteként, illetve melyek azok, amelyek előállnak megszámlálható sok zárt halmaz egyesítéseként. Speciálisan:

1. kérdés. Van-e megszámlálható sok nyílt halmaz, amelyek metszete a racionális számok halmaza?

Jegyezzük meg, hogy ha egy halmaz előáll megszámlálható sok nyílt halmaz metszeteként, akkor a komplementere felírható, mint megszámlálható sok zárt halmaz egyesítése. A racionális számok halmaza előáll megszámlálható sok zárt halmaz egyesítéseként, hiszen előáll egypontú, egy-egy racionális számot tartalmazó zárt halmazok uniójaként. Így az irracionális számok halmaza megegyezik az egy-egy racionális pont elhagyásával keletkező nyílt halmazok metszetével.

Folytonosság. A függvények tanulmányozása során előkerülő fogalmak közül az egyik legelső a folytonosság fogalma.

2. definíció. Egy $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény *folytonos* az $x_0 \in \mathbb{R}$ pontban, ha minden $\varepsilon > 0$ (általában elég kicsi) számhoz van olyan δ szám, hogy $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, valahányszor $|x - x_0| < \delta$. Más szóval, ha „elég közel vagyunk” x_0 -hoz, akkor a függvényértékek „elég közel lesznek” $f(x_0)$ -hoz.

Vannak nem folytonos függvények, sőt vannak olyanok is, amelyek „nagyon sok” pontban nem folytonosak. Dirichlet-től ered a következő függvény:

$$D(x) := \begin{cases} 1, & \text{ha } x \text{ racionális,} \\ 0, & \text{ha } x \text{ irracionális.} \end{cases}$$

Világos, hogy ez a függvény sehol sem folytonos, hiszen bármely intervallum tartalmaz racionális és irracionális számot is (ezt gondoljuk meg). Egy másik közismert függvény, amely (a nálunk elterjedt Riemann-függvény elnevezéssel ellentétben) *Carl Thomae*-től származik, a következő:

$$R(x) := \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{ha } x = \frac{m}{n}, \ n > 0, \ m, n \in \mathbb{Z} \text{ és a tört nem egyszerűsíthető,} \\ 0, & \text{ha } x \text{ irracionális.} \end{cases}$$

1. feladat. Igazoljuk, hogy a Thomae-függvény az irracionális pontokban és a 0-ban folytonos. (Útmutatás: egy irracionális számhoz „elég közel” lévő racionális számok nevezője nagy.)

Világos, hogy a Thomae-függvény 0-beli értékének tetszőleges módosításával olyan függvényt nyerünk, amely pontosan az irracionális pontokban folytonos. Ennek alapján felmerülhet a kérdés, hogy általában egy $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonossági pontjai milyen halmazt alkothatnak. Speciálisan (a Thomae-függvény mintájára):

2. kérdés. Van-e olyan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, amely pontosan a racionális pontokban folytonos?

Pontonkénti konvergencia. Függvényekből álló sorozatoknak többféle konvergenciáját értelmezhetjük, és az így kapott fogalmakkal kapcsolatban sok érdekes kérdés vetődik fel. Mi az alábbiakban a pontonkénti konvergencia fogalmára emlékeztetünk.

3. definíció. Adott az $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvényekből álló (f_n) függvénysorozat. Ekkor az (f_n) sorozat *pontonként konvergens*, ha létezik $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény úgy, hogy minden $x \in \mathbb{R}$ esetén $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Ekkor a sorozat határfüggvénye f (amely egyértelmű, ha létezik).

Adott tulajdonságú f_n függvényekből képezett pontonkénti sorozatok esetén általában érdekes, és nem mindig egyszerű kérdés, hogy a kapott határfüggvények milyen tulajdonságúak lehetnek. Például milyen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvények állnak elő valamilyen folytonos függvényekből álló sorozat pontonkénti határfüggvényeként? Speciálisan:

3. kérdés. Előáll-e a Dirichlet- vagy a Thomae-függvény folytonos függvények sorozatának pontonkénti határértékeként?

Egy KöMaL-feladat. Az idei januári számban volt kitűzve a következő feladat, amely az 1997 évi 1. szám feladatai között is szerepelt, és a megoldása az 1997. évi 5. szám 293–294. oldalán olvasható.

2. feladat. Az $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos, és tetszőleges $a > 0$ valós számra az $f(a), f(2a), f(3a), \dots$ sorozat 0-hoz tart. Igazoljuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0.$$

Válaszok

Ebben a szakaszban megválaszoljuk az előbbi részben feltett kérdéseket, amelyek, amint azt látni fogjuk, szoros kapcsolatban állnak egymással. A bizonyításuk hasonló ötleten alapulnak, amely látszólag kihasználja, hogy a racionális számokkal kapcsolatosak a kérdések. Később azonban a Baire-tételt is sikerül hasonló gondolatmenettel belátnunk.

1. állítás. Nem léteznek olyan $G_i \subset \mathbb{R}$ ($i = 1, 2, \dots$) nyílt halmazok, amelyekre $\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i = \mathbb{Q}$.

Bizonyítás. Indirekt bizonyítunk. Tegyük fel, hogy $\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i \supseteq \mathbb{Q}$. Megmutatjuk, hogy ekkor a G_i halmazok közös része szükségképpen tartalmaz irracionális számot is. Ehhez rekurzívan definiálunk három sorozatot, mégpedig (q_i) racionális, (N_i) pozitív egész és (I_i) intervallumsorozatot. Legyen a q_1 tetszőleges racionális szám, ekkor, mivel q_1 eleme a G_1 nyílt halmaznak, létezik $N_1 \in \mathbb{N}$ úgy, hogy $I_1 := [q_1 - 10^{-N_1}, q_1 + 10^{-N_1}] \subset G_1$. Tegyük fel, hogy adott i -re q_i és N_i már definiált. Legyen $q_{i+1} = q_i + 10^{-N_i-1}$. Mivel q_{i+1} racionális, benne van a $G_{i+1} \cap G_i \cap \dots \cap G_1$ nyílt halmazban, ebből következően létezik $N_{i+1} > 2N_i$ úgy, hogy $I_{i+1} := [q_{i+1} - 10^{-N_{i+1}}, q_{i+1} + 10^{-N_{i+1}}] \subset G_{i+1} \cap \dots \cap G_1$. Vegyük észre, hogy a (q_i) sorozat monoton nő, továbbá egy $\frac{1}{10}$ hányadosú mértani sor összegével felülről becsülhető, ezért konvergens, határértéke legyen q . Világos, hogy q tizedestört alakja csupa 0, 1 jegyekből áll, sőt gondoljuk meg, hogy az i -edik 1-est éppen $(N_i - 1 - N_{i-1})$ darab 0 számjegy követi. Ekkor az N_i -k választása miatt az egymást követő 0 számjegyek száma szigorúan monoton nő, így q tizedestört alakja nem periodikus, tehát q irracionális. Ezenkívül nyilvánvaló, hogy $q \in \bigcap_{i=1}^{\infty} I_i \subset \bigcap_{i=1}^{\infty} G_i$. Ezzel beláttuk, hogy a metszetben van irracionális szám is. \square

2. állítás. *Nem létezik olyan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, amely pontosan a racionális pontokban folytonos.*

A bizonyítás vázlata. Belátjuk, hogy ha f minden racionális pontban folytonos, akkor van olyan irracionális pont is, ahol folytonos. Rekurzívan két sorozatot definiálunk, mégpedig a (q_i) racionális és az (N_i) pozitív egész számokból álló sorozatot. Legyen $q_1 = \frac{1}{10}$. Mivel f folytonos q_1 -ben, létezik $N_1 \in \mathbb{N}$ úgy, hogy $|f(x) - f(q_1)| < 1$, ha $|x - q_1| < 10^{-N_1}$. Tegyük fel, hogy adott i -re q_i és N_i már definiált. Legyen ekkor $q_{i+1} = q_i + 10^{-N_i-1}$. Mivel f folytonos q_{i+1} -ben, létezik $N_{i+1} > 2N_i$ úgy, hogy $|f(x) - f(q_{i+1})| < \frac{1}{i+1}$ valahányszor $|x - q_{i+1}| < 10^{-N_{i+1}}$. A (q_i) sorozat határértékében f folytonos. \square

3. feladat. Fejezzük be a 2. állítás bizonyítását!

3. állítás. *A Dirichlet-függvény nem áll elő, mint folytonos függvények sorozatának pontonkénti határértéke.*

4. feladat. Lássuk be a 3. állítást! (Útmutatás: indirekt okoskodással definiáljunk rekurzívan három sorozatot, ezek közül az egyik legyen olyan (q_i) racionális számokból álló sorozat, amelynek határértékében nem fog teljesülni a pontonkénti konvergencia.)

4. állítás. *Létezik folytonos függvényekből álló pontonként konvergens függvény-sorozat, amelynek pontonkénti határfüggvénye a Thomae-függvény.*

5. feladat. Adjunk meg olyan folytonos függvényekből álló függvény-sorozatot, amely pontonként konvergál a Thomae-függvényhez. (Útmutatás: készít-

sünk először olyan sorozatot, amely az egész pontokban konvergál a függvényhez, a többi pontban 0-hoz tart; ezután készítsünk olyan sorozatot, amely a 2 nevezőjű törtekben – beleértve az egész számokat is – közelíti a függvényt; ezután már a 3 nevezőjű törtekben is konvergáljon a sorozat, és így folytassuk ezt az eljárást.)

Annak indokát, hogy a Dirichlet-függvény nem, a Thomae-függvény viszont előáll pontonkénti határfüggvényként, később a Baire-tétel alkalmazásaként fogjuk látni, most egyelőre fogadjuk el (és lássuk be) az állításokat.

Vegyük észre, hogy a fenti bizonyítások alap gondolata, hogy (hasonló érvelések alapján) rekurzív módon definiáltunk sorozatokat. Ezek után nem meglepő, hogy a 2. feladat bizonyítása is hasonló módon történhet. A megoldás előtt emlékeztetünk egy fontos összefüggésre.

4. definíció (Cantor-axióma). Ha adottak az (I_n) nemüres zárt intervallumok úgy, hogy $I_{n+1} \subset I_n$ minden n -re (azaz az intervallumok egymásba vannak skatulyázva), akkor a közös részük nemüres.

A 2. feladat megoldása. Indirekt bizonyítunk, tegyük fel, hogy $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \neq 0$.

Ez azt jelenti, hogy létezik $\varepsilon > 0$ szám és (x_i) végtelenhez tartó sorozat úgy, hogy $|f(x_i)| > \varepsilon$ minden i -re. Ekkor az f függvény folytonossága miatt minden i -re létezik $\delta_i > 0$ úgy, hogy minden $x \in I_n := [x_n - \delta_n, x_n + \delta_n]$ esetén $|f(x)| > \varepsilon$ (ezt gondoljuk meg). A továbbiakban rekurzíván definiálunk két sorozatot, egy nemüres, nem csak egy pontból álló zárt intervallumokból álló (J_i) , és egy pozitív egészekből álló (k_i) sorozatot úgy, hogy minden i -re $k_i J_i \subset I_n$ valamilyen n -re.

Legyen $J_1 = I_1$ és $k_1 = 1$. Tegyük fel, hogy $J_i = [c, d]$ és k_i már definiálva van. Tekintsük ekkor a $J_i, 2J_i, 3J_i, \dots$ intervallumokat (ahol $mI = [ma, mb]$, ha $I = [a, b]$). Ha $k > \frac{d}{d-c}$, akkor $kc < (k-1)d$, vagyis a $(k-1)J_i$ és kJ_i intervallumok egymásba érnek. Ez azt jelenti, hogy a $J_i, 2J_i, 3J_i, \dots$ intervallumok lefedik a $\left[\frac{cd}{d-c}, \infty\right)$ félegyenest, méghozzá úgy, hogy a félegyenes minden belső pontja valamelyik kJ_i -nek is belső pontja (azaz nem intervallumvégpont).

Válasszunk most egy n -et, amelyre $x_n > \max\left(id, \frac{cd}{d-c}\right)$ (ilyen van $x_i \rightarrow \infty$ miatt) és legyen k_{i+1} olyan pozitív egész, amelyre x_n belső pontja $k_{i+1}J_i$ -nek. Az $x_n > i \cdot d$ feltétel miatt $k_{i+1} \geq i + 1$. Végül legyen $J_{i+1} = J_i \cap \frac{1}{k_{i+1}}J_i$. Ekkor J_{i+1} nemüres és nem egy pontú, hiszen $\frac{x_n}{k_{i+1}}$ belső pontja J_i -nek és $\frac{1}{k_{i+1}}J_i$ -nek is. Világos, hogy $J_{i+1} \subset J_i$, továbbá $k_{i+1}J_{i+1} \subset I_n$ és $k_i \rightarrow \infty$.

A Cantor-axióma szerint a (J_i) egymásba skatulyázott intervallumok metszete nem üres, legyen ennek egy eleme a . Mivel tetszőleges m pozitív egészre $a \in J_m$, így $k_m a \in k_m J_m$, ezért $k_m a$ eleme valamelyik I_n -nek, következésképpen $|f(k_m a)| > \varepsilon$. Ez viszont ellentmond az $f(na) \rightarrow 0$ feltételnek. \square

A fenti bizonyítások alapján felvetődik a kérdés, hogy nem lehet-e megfogal-

mazni az érvelések közös gondolatát egy állításban. A válasz igen, ez az állítás a Baire-tétel, amelyet a következő szakaszban fogalmazunk meg.

A Baire-tétel

A tétel megfogalmazásához vezessük be a következő (Cantortól származó) fogalmat.

5. definíció. Egy $D \subset \mathbb{R}$ halmazt *sűrűnek* nevezünk, ha minden $x \in \mathbb{R}$ -hez és $\varepsilon > 0$ számhoz van olyan $y \in D$, amelyre $|x - y| < \varepsilon$. Más szóval, bármely valós számhoz „bármilyen közel” található D -beli elem.

Világos, hogy a racionális, és az irracionális számok halmaza is sűrű. A sűrű halmazokról szól a következő alapvető tétel.

1. tétel (Baire). *Megszámlálható sok sűrű nyílt halmaz metszete is sűrű.*

Bizonyítás. Legyen (G_i) sűrű nyílt halmazokból álló halmazsorozat \mathbb{R} -ben. Rögzítsünk egy x valós és egy $\varepsilon > 0$ számot. Be kell látni, hogy van olyan $y \in \bigcap_{i=1}^{\infty} G_i$, amelyre $|x - y| < \varepsilon$. Mivel G_1 sűrű halmaz, azért létezik olyan $x_1 \in G_1$, amely kisebb, mint $r_0 = \varepsilon$ távolságra van az $x_0 = x$ ponttól, azaz

$$x_1 \in G_1 \cap (x_0 - r_0, x_0 + r_0).$$

Továbbá, mivel G_1 nyílt, létezik $0 < r_1$ szám úgy, hogy

$$[x_1 - r_1, x_1 + r_1] \subset G_1 \cap (x - r_0, x + r_0).$$

Ha már adottak az x_i és r_i számok, akkor az előbbi gondolatmenet alkalmazásával kapjuk x_{i+1} -et és r_{i+1} -et, amelyekre

$$[x_{i+1} - r_{i+1}, x_{i+1} + r_{i+1}] \subset G_i \cap (x_i - r_i, x_i + r_i).$$

A rekurzióval egymásba skatulyázott nemüres zárt $[x_i - r_i, x_i + r_i]$ intervallumok sorozatát kapjuk. A Cantor-axióma szerint létezik $y \in \bigcap_{i=1}^{\infty} [x_i - r_i, x_i + r_i]$. Ekkor $|x - y| < r_0 = \varepsilon$. \square

A nyílt és zárt halmazok komplementer tulajdonságából adódik a következő, zárt halmazokra vonatkozó analóg állítás.

1. következmény. *Ha a valós számok halmaza előáll megszámlálható sok zárt halmaz egyesítéseként, akkor azok közül legalább az egyik tartalmaz nemüres nyílt halmazt (és így egy nemüres nyílt intervallumot is).*

Bizonyítás. Ha az F_n zárt halmazok egyesítése \mathbb{R} , és egyikük sem tartalmaz valódi (nyílt) intervallumot, akkor a komplementer G_n halmazok sűrűek és nyíltak (gondoljuk meg). Az 1. tétel szerint a G_n halmazok metszete sűrű,

tehát nem lehet üres, ekkor viszont az F_n halmazok nem fedhetik le az egész számegeyenest.

Az 1. tétel a nevét R. Baire-ről kapta, aki 1899-ben bizonyította. 2 évvel Baire előtt W. F. Osgood a következő tételt látta be (lásd a [4] monográfiát), amely a Baire-tétel előzményének tekinthető.

2. tétel. *Tegyük fel, hogy az $(a, b) \subset \mathbb{R}$ intervallumon folytonos függvényekből álló (f_n) sorozatra teljesül, hogy minden $t \in (a, b)$ esetén az $(f_n(t))$ valós sorozat korlátos (azaz a függvénysorozat pontonként korlátos). Ekkor (a, b) -nek van olyan (c, d) részintervalluma, amelyen a függvénysorozat korlátos, azaz létezik $K > 0$, hogy $f_n(t) \leq K$ minden $t \in (c, d)$ esetén (azaz a függvénysorozat egyenletesen korlátos (c, d) -n).*

6. feladat. Igazoljuk Osgood tételét! (Útmutatás: a korábbi bizonyításokhoz hasonló gondolatmenetet alkalmazzunk.)

Alkalmazás

Ebben a szakaszban a Baire-tétel alkalmazásaként újra megválaszoljuk a korábban feltett kérdéseket.

Az 1. kérdés egy másik bizonyítása. Vezessük be a következő két fogalmat.

6. definíció. Egy halmazt G_δ halmaznak hívunk, ha előáll megszámlálható sok nyílt halmaz metszeteként. Ha egy halmaz előáll megszámlálható sok zárt halmaz egyesítéseként, akkor F_σ halmaznak nevezzük.

Vegyük észre, hogy egy G_δ halmaz komplementere F_σ halmaz és fordítva. Ezenkívül megszámlálható sok G_δ halmaz metszete is G_δ halmaz, valamint megszámlálható sok F_σ halmaz uniója is F_σ halmaz. Ahogy korábban megjegyeztük, a racionális számok halmaza F_σ , az irracionális számok halmaza pedig G_δ halmaz. Ennek a fordítottja azonban nem igaz.

3. tétel. *A racionális számok halmaza nem G_δ , az irracionális számok halmaza pedig nem F_σ halmaz.*

Bizonyítás. Ha a racionális számok halmaza előállna megszámlálható sok nyílt halmaz metszeteként, akkor az irracionális számok halmaza előállna, mint megszámlálható sok zárt halmaz uniója. Ekkor viszont a racionális és irracionális számok halmazának uniója, az egész számegeyenes felírható lenne megszámlálható sok zárt halmaz uniójaként (hiszen a racionális számok is előállnak megszámlálható unióként). Az 1. következmény szerint ebben az esetben a zárt halmazok legalább egyike tartalmaz nemüres nyílt intervallumot. Ez viszont lehetetlen, mert sem az egy pontú halmazok, sem pedig az irracionális számok halmaza nem tartalmaz nyílt intervallumot (hiszen bármely nemüres nyílt intervallumban van racionális szám is).

A 2. kérdés egy másik bizonyítása. Meglepő módon egy $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonossági pontjainak halmaza általánosan jellemezhető az előző pontban bevezetett G_δ halmazok segítségével.

4. tétel. *Minden valós függvény folytonossági pontjainak halmaza előáll, mint megszámlálható sok nyílt halmaz metszete, tehát G_δ halmaz.*

Bizonyítás. Először jegyezzük meg, hogy egy valós f függvény folytonossága egy x_0 pontban a következőt is jelenti: minden $\varepsilon > 0$ -hoz létezik δ valós szám úgy, hogy $|f(x) - f(\tilde{x})| < \varepsilon$, valahányszor $|x - x_0| < \delta$ és $|\tilde{x} - x_0| < \delta$. Valóban, $\tilde{x} = x_0$ választással visszakapjuk a 2. definíciót. Másrészt, a 2. definícióban $\frac{\varepsilon}{2}$ -höz választva δ -t,

$$|f(x) - f(\tilde{x})| \leq |f(x) - f(x_0)| + |f(\tilde{x}) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Tekintsük most minden $\varepsilon > 0$ -ra a következő halmazt:

$$G_\varepsilon = \left\{ x_0 \in \mathbb{R}: \text{létezik } \delta > 0 \text{ úgy, hogy } |f(x) - f(\tilde{x})| < \varepsilon, \right. \\ \left. \text{valahányszor } |x - x_0| < \delta \text{ és } |\tilde{x} - x_0| < \delta \right\}.$$

A folytonosság előbbi átfogalmazásából adódóan $\bigcap_{\varepsilon > 0} G_\varepsilon$ éppen az f függvény folytonossági pontjainak a halmaza. Másrészt minden $\varepsilon > 0$ esetén G_ε nyílt halmaz. Valóban, ha $x_0 \in G_\varepsilon$ valamilyen $\varepsilon > 0$ -ra, akkor van olyan δ , hogy $|x - x_0| < \delta$ és $|\tilde{x} - x_0| < \delta$ esetén $|f(x) - f(\tilde{x})| < \varepsilon$. Ekkor $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset G_\varepsilon$, hiszen bármely $y \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ esetén elég kis $\tilde{\delta}$ -ra az y körüli $(y - \tilde{\delta}, y + \tilde{\delta}) \subset (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ intervallumban lévő pontokhoz rendelt függvényértékek ε -nál kevesebbel térnek el egymástól (δ választása miatt). Végül vegyük észre, hogy – mivel minden pozitív számhoz található nála kisebb pozitív racionális szám – a G_ε halmazok metszete ugyanaz marad, ha ε csupán a pozitív racionális számokat futja be. Így az f függvény folytonossági pontjainak halmaza előáll a nyílt G_ε ($\varepsilon > 0$ és ε racionális) halmazok metszeteként, tehát G_δ halmaz. \square

Jegyezzük meg, hogy egy $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény szakadási pontjainak (vagyis ahol nem folytonos) halmaza egy G_δ halmaz komplementere, tehát F_σ .

A 3. tételből tudjuk, hogy a racionális számok nem alkotnak G_δ halmazt, így nincs olyan függvény, amely pontosan a racionális pontokban folytonos. Ezzel az 1. kérdésre egy új bizonyítást nyertünk.

Az irracionális számok halmaza G_δ , és a Thomae-függvény egy módosítása pontosan az irracionális pontokban folytonos. Általában vajon minden G_δ halmaz előáll valamilyen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonossági pontjainak halmazaként? A válasz igen. Legyen $A = \bigcap_{i=1}^{\infty} G_i$, ahol G_i nyílt halmaz minden i -re, és

tekintsük az alábbi függvényt:

$$f_A(x) := \begin{cases} 0, & \text{ha } x \in A, \\ \frac{1}{n}, & \text{ha } x \text{ racionális, és } n \text{ a legkisebb egész, amelyre } x \notin G_n, \\ -\frac{1}{n}, & \text{ha } x \text{ irracionális, és } n \text{ a legkisebb egész, amelyre } x \notin G_n. \end{cases}$$

7. feladat. Mutassuk meg, hogy a fent értelmezett f_A függvény pontosan az A halmaz pontjaiban folytonos.

A 3. kérdés egy másik bizonyítása. Az előbbiek alapján már nem meglepő, hogy a folytonos függvényekből álló függvénytársaság határfüggvényeként előálló függvények bizonyos tulajdonságai kapcsolatban állnak a G_δ halmazokkal. Ez a bizonyos tulajdonság a következő fogalommal van összefüggésben.

7. definíció. Egy $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény *szinthalmazainak* az $\{x \in \mathbb{R}: f(x) = c\}$ alakú halmazokat nevezzük, ahol c valós szám. (Más szóval az ugyanazon függvényértékhez tartozó független változók alkotnak egy szinthalmazt.) Az *alsó szinthalmazok* az $\{x \in \mathbb{R}: f(x) \leq c\}$ alakú, a *felső szinthalmazok* az $\{x \in \mathbb{R}: f(x) \geq c\}$ alakú halmazok.

5. tétel. Ha egy $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény előáll folytonos függvényekből álló függvénytársaság pontonkénti határfüggvényeként, akkor a 7. definícióban értelmezett szinthalmazai G_δ halmazok.

Bizonyítás. Legyen c rögzített valós szám. Vegyük észre, hogy

$$\{x: f(x) = c\} = \{x: f(x) \geq c\} \cap \{x: f(x) \leq c\},$$

így elég belátni, hogy például az $\{x: f(x) \geq c\}$ halmaz G_δ . Gondoljuk meg, hogy ha egy adott x pontban $f(x) \geq c$, $\varepsilon > 0$ és $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ($n \rightarrow \infty$), akkor szükségképpen elég nagy n -re $f_n(x) > c - \varepsilon$ (ellenkező esetben mindig lesz $(c - \varepsilon)$ -nél nem nagyobb elem az $f_n(x)$ -ek között, és így a határérték nem lehet legalább c). Ennek alapján könnyen látható, hogy

$$\{x: f(x) \geq c\} = \bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcap_{n=j_i}^{\infty} \left\{x: f_n(x) > c - \frac{1}{i}\right\}. \quad (1)$$

Vegyük észre, hogy az $\left\{x: f_n(x) > c - \frac{1}{i}\right\}$ halmazok nyíltak minden n -re és i -re. Valóban, f_n folytonos függvény, így $f_n(x) > c - \frac{1}{i}$ esetén az x körüli elég kis intervallumban is $\left(c - \frac{1}{i}\right)$ -nél nagyobbak lesznek a függvényértékek. A fenti (1) előállítás alapján kapjuk, hogy az $\{x: f(x) \geq c\}$ szinthalmaz előáll megszámlálhatóan sok nyílt halmaz metszeteként, tehát G_δ halmaz. \square

Világos, hogy a Dirichlet-függvénynek az $\left\{x: D(x) \geq \frac{1}{2}\right\}$ felső színhalmaza a racionális számok halmaza, amely nem G_δ halmaz, vagyis nincs olyan folytonos függvényekből álló függvénysorozat, amely pontonként konvergálna a Dirichlet-függvényhez.

A folytonos függvényekből álló függvénysorozatok pontonkénti határértéké-
ként előálló nem folytonos függvények halmazát Baire 1 osztálynak szokás hívni.
Általában Baire n osztályú függvények azok, amelyek előállnak Baire $(n - 1)$
függvényekből álló függvénysorozat pontonkénti határfüggvényeként, és nincse-
nek a Baire $(n - 1)$ osztályban. Megmutattuk, hogy Baire 1 függvény színhal-
mazai G_δ halmazok, így a Dirichlet-függvény nem Baire 1. A Thomae-függvényt
viszont elő tudtuk állítani pontonkénti határfüggvényként.

A Baire 1 függvényeket az alábbi tétel jellemzi.

6. tétel. *Egy függvény pontosan akkor Baire 1 osztályú, ha bármely nemüres
nyílt intervallumra való leszűkítése tartalmaz folytonossági pontot.*

A bizonyításra nézve lásd a [3] jegyzetet, vagy az [1] könyv II. kötet VI. 9.
g szakasz 16. és 17. feladatait, de a tétel „akkor” irányával az Olvasó is megpró-
bálkozhat. A tétel alapján világos, hogy a Thomae-függvény Baire 1, a Dirichlet-
függvény nem. Belátható azonban, hogy a Dirichlet-függvény a Baire 2 osztály-
ban van.

8. feladat. Igazoljuk, hogy

$$D(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^{2n}(k! \pi x) \right).$$

Általában igazolható, hogy a Baire n osztályok nem üresek. A témáról bő-
vebben lásd a [3] jegyzetet.

A 2. feladat egy másik bizonyítása. Legyen $\varepsilon > 0$ és definiáljuk a kö-
vetkező halmazokat $n = 1, 2, \dots$ esetén:

$$H_n := \left\{ x \geq 0: |f(kx)| \leq \varepsilon \text{ minden } k \in \mathbb{N}, k \geq n \text{ esetén} \right\}.$$

Mivel f folytonos, így a H_n halmazok zártak (ezt gondoljuk meg). Másrészt a
tétel feltételéből következően $\bigcup_{i=1}^{\infty} H_i = \mathbb{R}$. Az 1. következmény miatt van olyan
 n index, amelyre a H_n halmazban van nemüres nyílt halmaz, és így legalább
egy nemüres (a, b) nyílt intervallum is. Ez azt jelenti, hogy $|f(kx)| \leq \varepsilon$ minden
 $x \in (a, b)$ és $k \geq n$ esetén. Az előző bizonyításban alkalmazott gondolatmenet
alapján elég nagy n esetén a $K_n := \{kx: x \in (a, b), k \geq n, k \in \mathbb{N}\}$ halmazok
egymásba metszenek, vagyis egyesítéseik lefednek egy (c, ∞) félegyenest, ahol c
alkalmas elég nagy szám. Ekkor $y \geq c$ esetén y eleme valamelyik K_n -nek, így
 $|f(y)| < \varepsilon$, más szóval $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. \square

Általánosítás

A Baire-tétellel kapcsolatban szokás bevezetni néhány fogalmat, amelyet az egyszerűség kedvéért a korábbiakban kihagytunk.

8. definíció. Egy $H \subset \mathbb{R}$ halmazt *seholsem sűrűnek* hívunk, ha minden $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumban létezik $x \in \mathbb{R}$, $x \notin H$ úgy, hogy alkalmas $r > 0$ számmal az $(x-r, x+r)$ intervallumban nincs H -beli elem. Más szóval a halmaz semmilyen nyílt intervallumban sem sűrű.

Seholsem sűrű például egy véges halmaz, vagy az egészek halmaza. A seholsem sűrű halmazokat bizonyos értelemben „kicsi” halmazoknak gondoljuk. Ha tekintjük megszámlálhatóan sok seholsem sűrű halmaz egyesítését, még mindig „élég kis” halmazt kapunk.

9. definíció. Egy halmazt *első kategóriájúnak* nevezünk, ha előáll megszámlálhatóan sok seholsem sűrű halmaz egyesítéseként. Ha egy halmaz nem első kategóriájú, akkor *második kategóriájúnak* hívjuk.

Baire tételét szokás kategória-tételnek is hívni, ugyanis az előbbi definíciókkal a következőképpen is megfogalmazható.

7. tétel. *A valós számok halmaza második kategóriájú.*

9. feladat. Mutassuk meg, hogy az 1. és 7. tételek ekvivalensek.

A tétel valójában sokkal általánosabb terekben is igaz (ún. teljes metrikus terekben), és a bizonyítás teljesen hasonlóan történik, mint az egydimenziós esetben. Az általános esettel, és a G_δ , F_σ és első-, második kategóriájú halmazokkal kapcsolatban ajánljuk a [3] jegyzetet.

A Baire-tétel a matematikának az n -dimenziós tér általánosítáival definiált terek közötti leképezések, más néven funkcionálok vagy operátorok elméletével foglalkozó ágában fontos eszközként kerül elő. 30 évvel Baire cikke után S. Banach vette észre, hogy az Osgood-tétel bizonyításának csekély módosítása révén fontos eredményre juthatunk az operátorok sorozatainak egyenletes korlátosságáról, amelyet azóta Banach–Steinhaus tételeként ismerünk.

Hivatkozások

- [1] Császár Ákos, *Valós analízis I–II*, Nemzeti Tankönyvkiadó (Budapest, 1999).
- [2] Komornik Vilmos, *Valós analízis előadások I–II*, Typotex (Budapest, 2003).
- [3] Laczkovich Miklós, *Valós függvénytan*, ELTE jegyzet (Budapest, 1995).
- [4] Riesz Frigyes–Szőkefalvi-Nagy Béla, *Funkcionálanalízis*, Tankönyvkiadó (Budapest, 1988).