

I. rész

1. Egy téglalap oldalainak aránya 1 : 2. Tudjuk, hogy a terület mérőszáma egyenlő a kerület és az átlók hosszának összegét jelölő mérőszámmal. Határozzuk meg a téglalap egy csúcsának távolságát a csúcsot nem tartalmazó átlótól. (11 pont)

Megoldás. A téglalap oldalai: a , $2a$, ekkor átlójának hossza: $a\sqrt{5}$. A téglalap területe: $2a^2$, a kerületének és az átlók hosszának összege: $2a(3 + \sqrt{5})$.

Tudjuk, hogy $2a^2 = 2a(3 + \sqrt{5})$. Mivel $a = 0$ nem lehet, így $a = 3 + \sqrt{5}$. A téglalap területét az átló, valamint egy csúcs és annak az átlótól

való m távolsága segítségével is kiszámíthatjuk: $2 \cdot \frac{a\sqrt{5} \cdot m}{2}$.

A kétféle módon felírt terület egyenlőségéből és az a kiszámolt értékéből kapjuk: $(3 + \sqrt{5})\sqrt{5} \cdot m = 2(3 + \sqrt{5})^2$. Ebből kifejezhető m értéke:

$$m = \frac{2(3 + \sqrt{5})}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5} + 10}{5}.$$

2. Oldjuk meg a következő egyenletrendszert:

$$\left. \begin{aligned} x^2 - y^2 - 8x + 8y &= 0, \\ xy - 3x - y &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (12 \text{ pont})$$

Megoldás. Az első egyenletet írjuk szorzatalakban: $(x - y)(x + y - 8) = 0$. Ebből következik, hogy $y = x$ vagy $y = -x + 8$. Mindkét esetben a második egyenletbe behelyettesítve x -re másodfokú egyenletet kapunk.

Az első esetben: $x^2 - 4x = 0$. Ekkor két megoldást kapunk: $x_1 = 0, y_1 = 0,$
 $x_2 = 4, y_2 = 4.$

A második esetben: $x^2 - 6x + 8 = 0$. Ebben az esetben is két megoldást kapunk, de az egyik már az előzőekben szerepelt: $x_3 = 2, y_3 = 6,$
 $x_4 = 4, y_4 = 4.$


Vagyis az egyenletrendszernek három megoldása van.

3. A térkövezéshez nagyon sokféle alakú és színű kő vásárolható. Az ábrákon az úgynevezett fodorkövet, és az ebből kialakítható mintasorozatot látjuk.



- Hány darab sötétszürke kő szükséges a hatodik mintához?
- Hányadik mintához kell pontosan 150 darab sötétszürke kő?
- Adjuk meg rekurzív képlettel a sötétszürke kövek számát az n -edik mintában.

(14 pont)



Megoldás. a) Az ábrasorozat tanulmányozásával látható, hogy a hatodik minta a negyedikből származtatható. Egy világos sáv kirakása után minden oldalon hat-hat sötétszürke követ kell leraknunk, de ekkor a sarkokat kétszer számoltuk. Mivel a negyedik minta 24 sötétszürke követ tartalmaz, ezért a hatodikhoz $24 + 6 \cdot 6 - 6$, azaz 54 darab sötétszürke kő kell.

b) Az előző gondolatot alkalmazva a sorozat egymást követő tagjai a következő módon alakulnak: 1, 6, 13, 24, 37, 54, 73, 96, 121, 150. Vagyis a sorozat 10. tagja a 150.

c) Tudjuk, hogy $a_1 = 1$, $a_2 = 6$. Az n -edik ábrán (ahol $n > 2$ és egész szám) a sötétszürke kövek száma: $a_n = a_{n-2} + 6 \cdot n - 6$.

4. Egy iskolai sakkbajnokságon mindenki pontosan egyszer játszott mindenkivel. 63 játszma után még mindenkinek négy játszmája hátravolt.

a) Hányan szerepeltek összesen a bajnokságon?

b) Ekkor két véletlenszerűen kiválasztott játékosal beszélgetett az iskolaújság egyik szerkesztője. Mekkora a valószínűsége, hogy ők még nem játszottak egymással? (14 pont)

Megoldás.

a) Legyen a csapatok száma n , ekkor az összes játszmák száma: $\frac{n(n-1)}{2}$. Mindenkinek négy játszmája volt még hátra, vagyis $\frac{4n}{2}$ játszmát kell még lejátszani.

A lejátszott mérkőzések száma:

$$\frac{n(n-1)}{2} - \frac{4n}{2} = 63,$$

amiből az $n^2 - 5n - 126 = 0$ másodfokú egyenletet kapjuk. Az egyenlet gyökei: $n_1 = 14$, $n_2 = -9$.

Vagyis a sakkbajnokságon 14-en szerepeltek.

b) Az összes játszmák száma: $\frac{14 \cdot 13}{2} = 91$. A kedvező esetek száma: $91 - 63 = 28$. A keresett valószínűség:

$$\frac{28}{91} = \frac{4}{13} \approx 0,31.$$

II. rész

5. a) Ha 2-vel csökkentjük az $ax^2 + bx + c = 0$ egyenlet gyökeit, akkor az $ax^2 + cx + b = 0$ egyenlet gyökeit kapjuk. Adjuk meg az eredeti egyenlet együtthatóit, ha tudjuk, hogy az összegük -3 .

b) Az $ax^2 + bx + c = 0$ egyenletben az együtthatók egy növekedő számtani sorozat három egymást követő tagjai, az

$$(a+2)x^2 + bx + (c+2) = 0$$

egyenletben az együtthatók pedig egy mértani sorozat három egymást követő tagjai. Van-e valós megoldása az első egyenletnek, ha az együtthatóinak összege 9?

c) Az $ax^2 + bx + c = 0$ másodfokú egyenlet két zérushelye x_1 és x_2 . Írjunk fel egy olyan harmadfokú egyenletet gyöktényezősz alakban, amelynek zérushelyei: x_1x_2 ; $x_1^2 + x_2^2$; $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

(16 pont)

Megoldás.

a) A második egyenlet gyökei: x_1 és x_2 , ez alapján: $x_1 + x_2 = -\frac{c}{a}$, $x_1x_2 = \frac{b}{a}$. Ekkor $x_1 + 2 + x_2 + 2 = -\frac{c}{a} + 4 = -\frac{b}{a}$, valamint

$$(x_1 + 2)(x_2 + 2) = x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 = \frac{b}{a} + 2 \cdot \left(-\frac{c}{a}\right) + 4 = \frac{c}{a}.$$

Vagyis a következő egyenletrendszert kell megoldanunk:

$$\left. \begin{aligned} a + b + c &= -3, \\ 4a + b - c &= 0, \\ 4a + b - 3c &= 0. \end{aligned} \right\}$$

A megoldás: $a = 1$, $b = -4$, $c = 0$.

b) A feladat szövege szerint most a következő egyenletrendszert kapjuk:

$$\left. \begin{aligned} 2b &= a + c, \\ b^2 &= (a+2)(c+2), \\ a + b + c &= 9. \end{aligned} \right\}$$

Az első és a harmadik egyenlet összevetésével azonnal kapjuk, hogy $b = 3$.

Ekkor az első és a második egyenlet a következő egyenletrendszert adja:

$$\left. \begin{aligned} a + c &= 6, \\ (a+2)(c+2) &= 9. \end{aligned} \right\}$$

A $c = 6 - a$ helyettesítéssel az $a^2 - 6a - 7 = 0$ egyenletet kapjuk. Ennek csak a $b = 3$ -nál kisebb megoldása elfogadható, mert az együttthatóknak egy növekedő számtani sorozatot kell alkotni, így $a = -1$. Ezek alapján: $c = 7$.

Az eredeti egyenlet együttthatóinak ismeretében meghatározzuk a diszkrimináns előjelét:

$$D = 3^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 7 > 0.$$

Vagyis van valós megoldása az első egyenletnek.

c) Mivel $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ és $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, ezért

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = \left(-\frac{b}{a}\right)^2 - 2 \cdot \left(\frac{c}{a}\right) = \frac{b^2 - 2ac}{a^2},$$

illetve

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{-\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}} = -\frac{b}{c}.$$

A következő harmadfokú egyenlet megfelel a feladat feltételeinek:

$$(x - x_1 x_2)(x - x_1^2 - x_2^2) \left(x - \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}\right) = \left(x - \frac{c}{a}\right) \left(x - \frac{b^2 - 2ac}{a^2}\right) \left(x + \frac{b}{c}\right) = 0.$$


6. Az $x^2 + y^2 = 25$ egyenletű kör, az

$$f(x) = \frac{|x+2| + |x-2| - 2}{2}$$

hozzárendeléssel megadott függvény képe és az abszcisszatengely egy síkidomot határoznak meg, amit az abszcisszatengely körül megforgatunk. Mekkora az így kapott forgástest térfogata?

(16 pont)

Megoldás. Készítsünk vázlatrajzot. Az origó középpontú 5 sugarú kör megrajzolása után ábrázoljuk az $f(x)$ függvényt is.



Ha $x \in]-\infty; -2]$, akkor $f(x) = \frac{-(x+2) - (x-2) - 2}{2} = -x - 1$.

Ha $x \in [-2; 2]$, akkor $f(x) = \frac{(x+2) - (x-2) - 2}{2} = 1$.

Ha $x \in [2; \infty]$, akkor $f(x) = \frac{(x+2) + (x-2) - 2}{2} = x - 1$.

Ezeket figyelembe véve kapjuk az ábrát.

Az $f(x)$ függvény és a kör metszéspontjainak koordinátái leolvashatók az ábráról, amiknek a helyességét visszahe-lyettesítéssel kapjuk: $A(4; 3)$ és $B(-4; 3)$.

A keletkezett forgástest térfogata:

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \left[\int_0^2 1 \, dx + \int_2^4 (x-1)^2 \, dx + \int_4^5 (25-x^2) \, dx \right] = \\ &= 2\pi \left[\int_0^2 1 \, dx + \int_2^4 (x^2 - 2x + 1) \, dx + \int_4^5 (25-x^2) \, dx \right] = \\ &= 2\pi [x]_0^2 + 2\pi \left[\frac{x^3}{3} - x^2 + x \right]_2^4 + 2\pi \left[25x - \frac{x^3}{3} \right]_4^5 = \\ &= 2\pi \cdot 2 + 2\pi \left(\frac{64}{3} - 16 + 4 - \frac{8}{3} + 4 - 2 \right) + 2\pi \left(125 - \frac{125}{3} - 100 + \frac{64}{3} \right) = \\ &= 4\pi + \frac{52}{3}\pi + \frac{28}{3}\pi = \frac{92}{3}\pi. \end{aligned}$$

7. a) Igazoljuk, hogy $\sqrt{31 + 8\sqrt{15}} + \sqrt{31 - 8\sqrt{15}}$ egész szám.
 b) Oldjuk meg a következő egyenletet a valós számok halmazán:

$$\sqrt{(31 + 8\sqrt{15})^x} + \sqrt{(31 - 8\sqrt{15})^x} = \frac{10}{3}. \quad (16 \text{ pont})$$

Megoldás. a)

$$\sqrt{31 + 8\sqrt{15}} + \sqrt{31 - 8\sqrt{15}} = \sqrt{(4 + \sqrt{15})^2} + \sqrt{(4 - \sqrt{15})^2} = 4 + \sqrt{15} + 4 - \sqrt{15} = 8.$$

Tehát valóban egész szám.

b) Alakítsuk az egyenletet:

$$\sqrt{(4 + \sqrt{15})^{2x}} + \sqrt{(4 - \sqrt{15})^{2x}} = \frac{10}{3},$$

$$(4 + \sqrt{15})^x + (4 - \sqrt{15})^x = \frac{10}{3}.$$

Legyen $(4 + \sqrt{15})^x = a$, ekkor $(4 - \sqrt{15})^x = \frac{1}{a}$.

Ekkor az $a + \frac{1}{a} = \frac{10}{3}$ egyenletet kapjuk,

amiből a $3a^2 - 10a + 3 = 0$ másodfokú egyenlet adódik. A gyökök: $a_1 = 3$, $a_2 = \frac{1}{3}$.

A $(4 + \sqrt{15})^x = 3$ egyenletből: $x_1 = \log_{4+\sqrt{15}} 3$.

A $(4 + \sqrt{15})^x = \frac{1}{3}$ egyenletből: $x_2 = \log_{4+\sqrt{15}} \frac{1}{3}$.


8. Egy szabadtéri színpad hátsó részén egy 12 m magas oszlop áll, melynek a sугólyuktól a teteje 16° -os emelkedési szögben látszik. Az oszlop talppontját és a sугólyukat összekötő egyenes fölött van egy emelvény, amelyről a 180 cm magas színész 22° -os emelkedési szögben látja az oszlop tetejét. A sугólyuktól a színész feje búbja 10° -os emelkedési szögű.

a) Igazoljuk, hogy a színész feje egyenlő távolságra van az oszlop tetejétől és a sугólyuktól.

b) Milyen magas a színpadon felépített emelvény?

(16 pont)

Megoldás. A feladat szövege alapján készítsünk vázlatrajzot.



a) Az ábrán a színpad eleje C , az oszlop teteje F , az emelvény tetején álló színész fejeteteje E . Tudjuk, hogy $AF = 12$ m, $\angle ACE = 10^\circ$, $\angle ACF = 16^\circ$, $\angle DEF = 22^\circ$.

Az ACF derékszögű háromszögben $FC = \frac{FA}{\sin 16^\circ}$. $\angle ECF = \angle ACF - \angle ACE = 6^\circ$, $\angle CFE = \angle CFA - \angle EFD = 74^\circ - 68^\circ = 6^\circ$.

Vagyis EFC egyenlőszárú háromszög, valóban $EC = EF$.

b) Az ACF derékszögű háromszögben: $CF = \frac{12}{\sin 16^\circ}$. Mivel EFC egyenlőszárú háromszög, azért G a CF felezőpontja, így $GC = \frac{6}{\sin 16^\circ}$. Az EGC derékszögű háromszögben:

$$EC = \frac{GC}{\cos 6^\circ} = \frac{6}{\cos 6^\circ \sin 16^\circ}.$$

Végül az EBC derékszögű háromszögben:

$$EB = EC \cdot \sin 10^\circ = \frac{6}{\cos 6^\circ} \cdot \sin 10^\circ = \frac{6 \cdot \sin 10^\circ}{\cos 6^\circ \cdot \sin 16^\circ} \approx 3,8.$$

Mivel a színész testmagassága 1,8 m, azért az emelvény kb. 2 méter magas.

9. a) Egy dobozba 100 darab piros és zöld építőköcköt raktak, méretük alapján kicsiket és nagyokat is. Kis piros kocka véletlenszerű kihúzásának ugyanannyi a valószínűsége, mint annak, hogy nagy pirosat vagy kis zöldet húzunk a dobozból. A zöldek és a kicsik aránya 7 : 11. A nagyok 20 -szal kevesebben vannak, mint a pirosok. Hány kocka van az egyes fajtákból?

b) Egy dobozba 93 darab piros és zöld építőköcköt raktak, méretük alapján kicsiket és nagyokat is. Mindegyik fajtából különböző prímszám darab van. A piros kockák száma osztható héttel. A kis zöld kockákból van a legkevesebb. Nagy pirosból ötvennel több van, mint kis pirosból. Hány kocka van az egyes fajtákból?

(16 pont)

Megoldás. a) A következő táblázatból kiolvashatjuk a négy különböző fajta darabszámát jelölő betűket.

	nagy	kicsi
piros	a	b
zöld	c	d

A szöveg és a táblázat alapján a következő egyenletrendszer írható fel:

$$\left. \begin{aligned} a + b + c + d &= 100, \\ a + d &= b, \\ \frac{c + d}{b + d} &= \frac{7}{11}, \\ a + c &= a + b - 20. \end{aligned} \right\}$$

Az egyenletrendszer megoldása megadja a kérdésre a választ: $a = 25$ (nagy piros), $b = 40$ (kis piros), $c = 20$ (nagy zöld), $d = 15$ (kis zöld).

b) Mivel négy különböző prímszám összege páratlan, azért az egyik a 2. A szöveg alapján ez a kis zöld kockák száma. A pirosak és a nagy zöldek darabszáma ezek szerint 91. Tudjuk, hogy a piros kockák száma osztható héttel, így a nagy zöldek száma is osztható lesz héttel. Ilyen prímszám csak egy van, ez a 7. Azaz a nagy zöld kockák száma 7. Most már tudjuk, hogy a pirosak száma 84. A feladat állítása szerint nagy piros kockákból ötvennel több van, mint kis piros kockákból. Ezek szerint a nagy pirosból 67 darab, a kis pirosból pedig 17 darab van a dobozban.

Számadó László