

A 2010. évi Kürschák József Matematikai Tanulmányverseny feladatainak megoldása

Fleiner Tamás

1. feladat. Adott n lezárt bőrönd és n kulcs úgy, hogy a bőröndök mindegyikét pontosan egy kulcs nyitja és mindegyik kulcs pontosan egy bőröndöt nyit. Célunk az, hogy az összes bőröndről megállapítsuk, melyik kulcs nyitja. Egy próbálkozás abból áll, hogy valamelyik kulccsal megpróbálunk kinyitni egy bőröndöt. Határozzuk meg azt a legkisebb $p(n)$ számot, amelyhez létezik olyan eljárás, hogy azt végrehajtva legfeljebb $p(n)$ próbálkozás után bizonyosan ismerni fogjuk az n összetartozó bőrönd–kulcs párt.

Megoldás. Megmutatjuk, hogy $n \geq 1$ esetén $p(n) = \binom{n}{2}$. Az alábbi eljárás legfeljebb $\binom{n}{2}$ próbálkozásból oldja meg a feladatot, azaz $p(n) \leq \binom{n}{2}$. Legyenek a kulcsok $k_1, k_2, \dots, k_n$, és jelölje b_i azt a bőröndöt, amit k_i nyit. Célunk a b_i megtalálása minden i -re. A k_1 kulcsot próbáljuk bele az első néhány bőröndbe, amíg ki nem derül, melyik a b_1 . Ehhez legfeljebb $n - 1$ próbálkozás kell, mert amint már $(n - 1)$ -szer sikertelenül próbálkoztunk, azonnal tudjuk, hogy k_1 bizonyosan az utolsó, ki nem próbált bőröndöt nyitja. A k_2 kulccsal is tegyük ugyanezt, azzal a megszorítással, hogy a b_1 bőrönddel semmiképp se próbálkozzunk. Hasonló okból legfeljebb $n - 2$ próbálkozást végzünk addig, amíg meg nem találjuk b_2 -t. Általában, a $b_1, b_2, \dots, b_{i-1}$ bőröndök megtalálása után a b_i -t keressük meg úgy, hogy a k_i kulcsot sorra belepróbáljuk a lehetséges $n - (i - 1) = n - i + 1$ bőröndbe. Világos, hogy legfeljebb $n - i$ próbálkozás után megtaláljuk b_i -t. Összességében tehát nem több, mint $\sum_{i=1}^n (n - i) = \binom{n}{2}$ próbálkozást végzünk.

Megmutatjuk másrészt, hogy $p(n) \geq \binom{n}{2}$, azaz $\binom{n}{2}$ -nél kevesebb próbálkozást megengedve nem lehetünk bizonyosak afelől, hogy mindig megtaláljuk az összetartozó bőrönd–kulcs párokat. Tegyük fel, hogy egy olyan módszer szerint próbáljuk a kulcsokat a bőröndökhöz, amely beazonosítja az összetartozó bőrönd–kulcs párokat, másrészt az ehhez felhasznált próbálkozásszámok lehetséges legnagyobbika is a lehető legkisebb. Világos, hogy ezen stratégia szerint eljárva sosem fogunk belepróbálni egy kulcsot egy bőröndbe akkor, ha már a próba előtt bizonyosak lehetünk afelől, hogy az adott kulcs nyitja a szóban forgó bőröndöt. Ez azt jelenti, hogy fel kell arra készülnünk, hogy csupa sikertelen próbálkozás alapján kell megbizonyosodnunk az összes összetartozó (b_i, k_i) bőrönd–kulcs párról.

Ha ez megtörtént, és valamely $1 \leq i < j \leq n$ esetén nem próbáltuk bele sem a k_i kulcsot a b_j bőröndbe, sem a k_j kulcsot a b_i bőröndbe, akkor az elvégzett próbálkozásaink alapján nem zárhatjuk ki azt a lehetőséget, hogy a k_i kulcs a b_j bőröndöt, a k_j kulcs pedig a b_i bőröndöt nyitja, míg a többi kulcs ahhoz a bőröndhöz tartozik, amelyekhez eddig gondoltuk. Ez pedig azt jelentené, hogy mégsem tudjuk bizonyosan összepárosítani a kulcsokat és bőröndöket. Tehát tetszőleges $1 \leq i < j \leq n$ esetén a $k_i - b_j$ és a $k_j - b_i$ próbák valamelyikét el kell végeznünk. Mivel különböző (i, j) párokhoz ezen próbák különböznek, legalább annyi próbálkozásra van szükség, ahányféleképpen különböző i -t és j -t tudunk választani, vagyis legalább $\binom{n}{2}$ -re. Ezzel megmutattuk, hogy $p(n) \geq \binom{n}{2}$, és ezt összevetve a korábban igazolt $p(n) \leq \binom{n}{2}$ egyenlőtlenséggel éppen a bizonyítani kívánt $p(n) = \binom{n}{2}$ állítás adódik. $\square$

Megjegyzések. 1. A fenti bizonyítás kulcslépése az alsó becslés bizonyítása, azon belül is az „ellenség módszer” alkalmazása, amikor is azt indokoljuk, hogy csupa negatív próba után is össze kell tudnunk párosítani a kulcsokat a bőröndökkel.

2. Ez az alsó becslés gráfelméleti nyelven is elmondható. Tekintsük azt a G gráfot, amelynek csúcsai a bőröndök és a kulcsok, él pedig az összetartozó párok között fut. Világos, hogy minden egyes próbálkozás egy-egy lehetséges bőrönd–kulcs él G -beliségének „lekérdezését” jelenti, célunk pedig a G gráf meghatározása. Az ellenség-módszert (adversary method) használó érv azt indokolja, hogy akkor is meg kell tudnunk határozni G -t, ha minden értelmes lekérdezéskor az derül ki, hogy az adott él nincs G -ben. A fent közölt bizonyítás úgy is elmondható, hogy ha G -t sikerült így meghatároznunk, akkor tetszőleges $i \neq j$ -re le kellett kérdeznünk a $k_i b_j$ és $k_j b_i$ élek közül legalább az egyiket.


Máshogyan is igazolhatjuk az alsó becslést. Ha a lekérdezések negatív eredményei egyértelműen meghatározzák G -t, akkor a le nem kért $k - b$ élek nem alkothatnak alternáló kört a G gráf eleivel. Ekkor ugyanis nem lenne az kizárható, hogy e körnek a G -n kívüli élei mentén tartoznak össze a kulcsok és bőröndök. (A fenti bizonyításban 4 hosszú alternáló körrel dolgoztunk.) Innen könnyen igazolható, hogy valamelyik bőrönd vagy kulcs legalább $n - 1$ próbálkozásban szerepelt. Feltehető, hogy ez a k_n vagy b_n valamelyike. Ugyanígy megfontolással látható, hogy a $b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$ bőröndök, illetve a $k_1, k_2, \dots, k_{n-1}$ kulcsok valamelyike (mondjuk az $n - 1$ indexű) legalább $n - 2$ olyan próbálkozásban szerepelt, amelyben nem szerepelt sem b_n , sem k_n . A gondolatmenetet folytatva meg lehet mutatni, hogy az összetartozó $b_i k_i$ bőrönd–kulcs párokat el tudjuk látni indexszel úgy, hogy minden $1 \leq i \leq n$ esetén a b_i vagy a k_i legalább $i - 1$ olyan próbálkozásban vett részt, amelyben $b_{i+1}, \dots, b_n$ és $k_{i+1}, \dots, k_n$ egyikét sem használtuk.

3. Többen próbálkoztak a fentihez hasonló érveléssel. Volt, aki elkövette azt a hibát, hogy a le nem kért élek gráfjának körmentességét próbálta igazolni. Sajnos ez általában nem igaz. Valójában ez a gráf a G eleivel alternáló kört nem tartalmazhat. Szerencsére, ahogy azt az előző megjegyzésbeli bizonyítás vázlat mutatja, már ez is elég az alsó becsléshez.

2. feladat. Az ABC háromszög AB oldalának belsejében adottak a C_1 és C_2 pontok, a BC oldal belsejében az A_1 és A_2 pontok, végül a CA oldal belsejében a B_1 és B_2 pontok úgy, hogy $AC_1 < AC_2$, $BA_1 < BA_2$ és $CB_1 < CB_2$ teljesül. Az AB_1C_1 és AB_2C_2 körök A -tól különböző metszéspontját jelölje A^* , a BC_1A_1 és BC_2A_2 körök B -tól különböző metszéspontja legyen B^* , végül a CA_1B_1 és CA_2B_2 körök C -tól különböző metszéspontját nevezzük C^* -nak. Mutassuk meg, hogy az AA^* , BB^* és CC^* egyenesek egy ponton mennek át.

Megoldás. A jól ismert Ceva-tétel trigonometrikus alakját fogjuk használni, amely szerint az AA^* , BB^* és CC^* egyenesek pontosan akkor mennek át egy ponton, ha

$$\frac{\sin BAA^*}{\sin CAA^*} \cdot \frac{\sin ACC^*}{\sin BCC^*} \cdot \frac{\sin CBB^*}{\sin ABB^*} = 1.$$



Az első tört kiszámításához figyeljük meg, hogy $AB_2A^*C_2$ húrnégyszög, ezért $AC_2A^* = A^*B_2B_1$; továbbá $AB_1A^* = A^*C_1C_2$, hiszen $AB_1A^*C_1$ is húrnégyszög.

A megfelelő szögek egyenlősége miatt tehát $A^*C_1C_2\Delta \sim A^*B_1B_2\Delta$, így a megfelelő oldalak aránya megegyezik a hozzájuk tartozó magasságok arányával, vagyis

$$\frac{|B_1B_2|}{|C_1C_2|} = \frac{|A^*T_B|}{|A^*T_C|},$$

ahol rendre T_B , illetve T_C jelöli az A^* -ból az AB , illetve AC egyenesekre bocsátott merőlegesek talppontjait. Tudjuk még, hogy

$$\sin BAA^* = \frac{|A^*T_B|}{|AA^*|}, \quad \text{illetve} \quad \sin CAA^* = \frac{|A^*T_C|}{|AA^*|},$$

ezért

$$\frac{\sin BAA^*}{\sin CAA^*} = \frac{|A^*T_B|}{|A^*T_C|} = \frac{|B_1B_2|}{|C_1C_2|}.$$

Hasonlóan látható be, hogy

$$\frac{\sin ACC^*}{\sin BCC^*} = \frac{|A_1A_2|}{|B_1B_2|}, \quad \text{illetve} \quad \frac{\sin CBB^*}{\sin ABB^*} = \frac{|C_1C_2|}{|A_1A_2|}.$$

A Ceva-tételben szereplő szorzatra tehát

$$\frac{\sin BAA^*}{\sin CAA^*} \cdot \frac{\sin ACC^*}{\sin BCC^*} \cdot \frac{\sin CBB^*}{\sin ABB^*} = \frac{|B_1B_2|}{|C_1C_2|} \cdot \frac{|A_1A_2|}{|B_1B_2|} \cdot \frac{|C_1C_2|}{|A_1A_2|} = 1$$

adódik, és nekünk pontosan ezt kellett bizonyítanunk. $\square$

3. feladat. Mely n és k pozitív egész számokra léteznek $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_k$ egész számok úgy, hogy az $a_i b_j$ szorzatok ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq k$) páronként különböző maradékot adnak nk -val osztva?

Megoldás. Azt állítjuk, hogy pontosan akkor léteznek a kívánt a_i és b_j számok, ha n és k relatív prímek. Ehhez elsőként igazoljuk, hogy az állítás elégséges. Tegyük fel tehát, hogy $(n, k) = 1$. Legyen $1 \leq i \leq n$ és $1 \leq j \leq k$ esetén $a_i = ik + 1$, illetve $b_j = jn + 1$. Az $a_i b_j = ijnk + ik + jn + 1$ szám n -nel osztva $ik + 1$, k -val osztva pedig $jn + 1$ maradékot ad. Az n és k relatív prím volta miatt $1 \leq i \leq n$ esetén az $ik + 1$ számok páronként különböző maradékot adnak n -nel osztva, $1 \leq j \leq k$ esetén pedig a $jn + 1$ számok páronként különböző maradékot adnak k -val osztva. Ha ugyanis mondjuk $ik + 1$ és $i'k + 1$ ugyanazt a maradékot adják n -nel osztva, akkor $n \mid ik + 1 - (i'k + 1) = (i - i')k$, ahonnan $n \mid (i - i')$ következik, hiszen n -nek és k -nak nincs közös prímosztója. Ez utóbbi oszthatóság és $1 \leq i, i' \leq n$ miatt $i = i'$.

Azt kaptuk tehát, hogy bárhogyan is veszünk két különböző $a_i b_j$ szorzatot, azok n -nel vagy k -val osztva különböző maradékot adnak. Nem lehetséges tehát, hogy két különböző szorzat nk -val osztva azonos maradékot adjon, nekünk pedig éppen erre van szükségünk.

A szükségesség bizonyításához azt tesszük fel, hogy az a_i és b_j számok rendelkeznek a feladatban leírt tulajdonsággal. Ez azt is jelenti, hogy valamelyik, mondjuk $a_1 b_1$ szorzat nk -val osztva 0 maradékot ad, azaz $nk \mid a_1 b_1$. Legyen $a = (a_1, nk)$ és $b = (b_1, nk)$. Világos, hogy $nk \mid ab$, ezért $nk \leq ab$.

Figyeljük meg, hogy a k db $a_1 b_j$ szorzat mindegyike osztható a -val. Márpedig az nk szerinti osztási maradékok között pontosan $\frac{nk}{a}$ olyan van, amely a -val osztható. Ez azt jelenti, hogy $k \leq \frac{nk}{a}$, azaz $a \leq n$. Hasonló gondolatmenet igazolja a $b \leq k$ becslést. Ezek szerint $ab \leq nk$, amit a korábbi $nk \leq ab$ megfigyeléssel összevetve azt kapjuk, hogy $ab = nk$. Ez utóbbi pedig csak úgy lehetséges, ha $a = n$ és $b = k$.

Jelölje d az n és k legnagyobb közös osztóját. Ekkor n és k legkisebb közös többszöröse $M = \frac{nk}{d}$. Számoljuk meg, hány olyan osztási maradék van nk szerint, amely n -nel vagy k -val osztható. Világos, hogy k maradék osztható n -nel és n maradék k -val, ám azokat a maradékokat, amelyek n -nel és k -val is oszthatók, kétszer számoltuk meg. Ezek éppen az M -mel osztható maradékok, számuk tehát $\frac{nk}{M} = d$. Ezért pontosan $n + k - d$ olyan nk szerinti maradék van, amely n -nel vagy k -val osztható. Azonban $n \mid a_1$ és $k \mid b_1$ miatt az $a_1 b_j$, illetve $a_i b_1$ szorzatok oszthatók n -nel, illetve k -val. Az ilyen szorzatok száma pedig $n + k - 1$, ezért $n + k - 1 \leq n + k - d$, azaz $1 \geq d = (n, k)$. Ezek szerint n és k valóban relatív prímek, ezzel pedig a feltétel szükségességét is igazoltuk. $\square$

Megjegyzés. A szükségességet igazoló gondolatmenet Dankovics Attila megoldásából származik.