


**Megoldás: I. 1.** A földfelszín egy  $P$  pontjának az Egyenlítő  $E$  síkjától, ill. a forgástengelytől való távolsága  $P$  hosszúsági körének síkjában az  $R$  sugárból és a  $\varphi$  szélességből  $z = R \sin \varphi$ , ill.  $d = R \cos \varphi$  (1. ábra felső része).




1. ábra

A Földet a szokásos állásban rajzolva és ennek megfelelően a déli szélességeket negatívnak véve  $z$  is előjellel értendő.  $B$ -re  $z_1 = 4696$ ,  $d_1 = 4304$ ;  $A$ -ra pedig  $z_2 = 3233$ ,  $d_2 = 5488$  (minden távolságot km-ben adunk meg, így sehol sem lépünk túl a 4-jegyű táblázatokkal elérhető pontosságon).

2. A  $0^\circ$ -os hosszúsági kör  $H_1$  síkjától való távolság  $P$  szélességi körének síkjában az előbbi  $d$ -ből és a  $\lambda$  hosszúságból  $y = d \sin \lambda$ . (1. ábra alsó része). A nyugati hosszúságokat negatívnak véve, más szóval ha  $-180^\circ < \lambda \leq 180^\circ$ ,  $y$  is előjellel adódik. Hasonlóan a  $\pm 90^\circ$ -os délkörök  $H_2$  síkjától való távolság  $x = d \cos \lambda$ .  $-B$ -re  $y_1 = 1408$ ,  $x_1 = 4066$ ;  $A$ -ra  $y_2 = -915$ ,  $x_2 = 5411$ .

(A pontokat így tulajdonképpen egy az ábrázoló geometriából ismert, térbeli derékszögű koordinátarendszerben adtuk meg, ennek origója a Föld  $O$  középpontja,  $X$ -,  $Y$ -tengelye az Egyenlítő  $\lambda = 0^\circ$ , ill.  $\lambda = +90^\circ$  hosszúságú pontján lép ki (Accrától, ill. Kalkuttától délre),  $Z$ -tengelye pedig az Északi-sarkon).

3. Eredményeinkből megkaphatjuk annak a  $T$  téglatestnek az  $a$ ,  $b$ ,  $c$  éleit, amelynek két csúcsa  $A$  és  $B$ , lapsíkjai pedig átmennek ezeken és párhuzamosak  $E$ ,  $H_1$ ,  $H_2$ -vel; az élekből pedig folytatólag a húron mért  $AB = h$  távolságot, ugyanis  $AB$  a  $T$ -nek testátlója. Éspedig  $a = x_2 - x_1 = 1345$ ,  $b = y_1 - y_2 = 2323$ ,  $c = z_1 - z_2 = 1463$ , és így  $h = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = 3057$  km.



2. ábra

4. A Föld felszínén a legrövidebb  $AB$  ívet az  $ABO$  sík metszi ki. A metszet főkör (2. ábra), így sugara  $R$ . Legyen  $\angle AOB = \vartheta$ , ekkor az  $AOB$  háromszögből a koszinusz tétellel

$$\cos \vartheta = 1 - h^2/2R^2.$$

Innen  $\vartheta = 27,78^\circ$ , ívmértékben 0,4848, és így a felszínén mérve  $AB = R\vartheta = 3088$  km.

5. Az  $AB$  húr legmélyebben, vagyis  $O$ -hoz legközelebb fekvő pontja az  $F$  felezőpont, mélysége  $m = R(1 - \cos \vartheta/2) = 187$  km.

**II.** A kívánt általános képletet a fentiek alapján adjuk meg, a  $\vartheta$  szög kiszámítására. Ebből az ív egyszerűen megkapható.  $T$  éleinek hossza – esetleg ellentett előjellel, ez azonban a további négyzetreemelésre tekintettel nem lényeges:

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &= d_1 \cos \lambda_1 - d_2 \cos \lambda_2 = R(\cos \varphi_1 \cos \lambda_1 - \cos \varphi_2 \cos \lambda_2), \\y_1 - y_2 &= d_1 \sin \lambda_1 - d_2 \sin \lambda_2 = R(\cos \varphi_1 \sin \lambda_1 - \cos \varphi_2 \sin \lambda_2), \\z_1 - z_2 &= R(\sin \varphi_1 - \sin \varphi_2).\end{aligned}$$

Ezekkel, mindjárt átcsoportosítva, majd ismert trigonometrikus azonosságok felhasználásával

$$\begin{aligned}(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 &= R^2 [\cos^2 \varphi_1 (\cos^2 \lambda_1 + \sin^2 \lambda_1) + \cos^2 \varphi_2 (\cos^2 \lambda_2 + \\&+ \sin^2 \lambda_2) - 2 \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 (\cos \lambda_1 \cos \lambda_2 + \sin \lambda_1 \sin \lambda_2)] = \\&= R^2 [\cos^2 \varphi_1 + \cos^2 \varphi_2 - 2 \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos(\lambda_1 - \lambda_2)],\end{aligned}$$

tehát

$$\begin{aligned}h^2 &= (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 = R^2 [(\cos^2 \varphi_1 + \sin^2 \varphi_1) + \\&+ (\cos^2 \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2) - 2 \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 - 2 \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos(\lambda_1 - \lambda_2)] = \\&= 2R^2 [1 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 - \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos(\lambda_1 - \lambda_2)],\end{aligned}$$

végül (1) alapján

$$\cos \vartheta = \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 \cos(\lambda_1 - \lambda_2).$$

Innen  $\vartheta$  egyértelműen kiszámítható – ugyanis nyilván  $0 < \vartheta \leq 180^\circ$ .

*Székely Jenő* (Pécs, Nagy Lajos g. III. o. t.)

*Megjegyzés.* Általános eredményünk a gömbi trigonometria ún. oldal–koszinusz tételének az  $\vec{E}AB$  gömbháromszögre való alkalmazásával is megkapható, ahol  $\vec{E}$  az Északi–sark. Több dolgozat csak a végeredményre törekedve mindjárt ezt írta fel és ezt tekintette megoldásnak, ill. második megoldásnak. Itt a számpéldán felül annak beláttatása volt a cél, hogy a képlethez a gömbi trigonometria tételeinek rendszeres kiépítése nélkül is el lehet jutni.