

$\sqrt{2} = 1,414\,213\dots$  és  $\sqrt{51} = 7,141\,428\dots$ , tehát az állítás igaz. Eszerint fennáll a következő közelítő egyenlőség:

$$(1) \quad \sqrt{51} \approx 7 + \frac{\sqrt{2}}{10},$$

amiből négyzetre emeléssel és rendezéssel

$$(2) \quad \sqrt{2} \approx \frac{99}{70} = 1,41\,428\dots,$$

Ez ugyancsak 5 értékes jegyben egyezik meg  $\sqrt{2}$ -vel.

A 945. feladat<sup>2</sup> az  $x_1 = 2$ ,  $y_1 = 3$ , és  $k = 1, 2, 3, \dots$  esetén  $x_{k+1} = 3x_k + 2y_k$ ,  $y_{k+1} = 4x_k + 3y_k$  képletekkel adott sorozatokból adódó  $y_k/x_k$  törteket adta meg mint  $\sqrt{2}$  közelítő értékeit. Ezekben a sorozatokban a harmadik tag  $x_3 = 70$ ,  $y_3 = 99$ .

*Simonyi Ernő* (Budapest, Rákóczi F. g. III. o. t.)

*Megjegyzés.* Vajon az említett sorozatpárból lehet-e kapni az 51-en felül további olyan  $a$  számokat, melyeknek négyzetgyökében az első valahány tizedes jegy megegyezik  $\sqrt{2}$  tizedestört alakjának egymás utáni jegyeivel, vagyis amelyre

$$(3) \quad \sqrt{a} \approx b + \frac{\sqrt{2}}{10}, \quad \text{és ebből} \quad \sqrt{2} \approx \frac{50(a - b^2) - 1}{10b}?$$

A  $\sqrt{2}$ -re adódó közelítő érték nevezője tehát 0-ra, számlálója pedig 49-re vagy 99-re végződik. Ilyen  $x_k, y_k$  párokat akarunk tehát keresni. Könnyítést jelentenek 0-ra végződő nevező keresésében az 1062. feladatban<sup>3</sup> nyert

$$x_k = 6x_{k-1} - x_{k-2} = 34x_{k-2} - x_{k-4} = 198x_{k-3} - x_{k-6}$$

kifejezések, amelyekkel az  $y$ -sorozat tagjainak kiszámítása nélkül juthatunk előre. Egyelőre elég a tagok utolsó jegyét vizsgálni.  $x_1 = 2$ ,  $x_2 = 12$  és  $x_3 = 70$ -ből  $x_4$  utolsó számjegye 8-as, ugyanígy  $x_5$ -é is, majd  $x_6$ -é ismét 0. A fenti 3-ik kifejezéssel – és az 1061. feladatban nyert  $x_0 = 0$ -val  $x_6 = 198 \cdot 70 - 0 = 13\,860$ . Egyszersmind látjuk, hogy az  $x$  sorozat minden harmadik tagja 0-ra végződik, köztük pedig váltakozva két-két 2-re, ill. 8-ra végződő tag áll. Az 1062. feladat további képleteivel  $y_6 = 19\,601$ , ez nem felel meg (3)-ban a számlálónak. Könnyű belátni azonban<sup>4</sup>  $y_k = 198y_{k-3} - y_{k-6}$ , és  $y_0 = 1$ ,  $y_3 = 99$ -ből, hogy az  $y_{3k}$  tagok váltakozva 1-re és 9-re végződnek, tehát  $y_9$  egyjegyű végződése megfelelő. Valóban,  $y_9 = 198 \cdot 19\,601 - 99 = 3\,880\,899 = 50 \cdot 77\,618 - 1$ , és mivel  $x_9 = 198 \cdot 13\,860 - 70 = 2\,744\,210 = 10b$ -ből  $b = 274\,421$ , azért  $50(a - b^2) - 1 = y_9$ -ből  $a = b^2 + 1(1 + y_9)/50 = 75\,306\,962\,859$  egy a kívánt tulajdonsággal bíró szám. Ezzel

$$\sqrt{a} = 274\,421, \underbrace{141\,421\,356\,2373}_{13 \text{ jegy}} 140\dots,$$

és itt a tizedes vessző után  $\sqrt{2}$ -nek 13 helyes jegye áll.

<sup>1</sup>Lásd K. M. L. 23 (1961/9) 62. o.

<sup>2</sup>K. M. L. 19 (1959/10) 56. o.

<sup>3</sup>K. M. L. 23 (1961/10) 64. o.

<sup>4</sup>K. M. L. 23 (1961/10) 64. o.