


**I. megoldás.**<sup>1</sup> 1. Az állítást tömegpontrendszerek súlypontjára vonatkozó megfontolásokkal bizonyítjuk. Az  $m_1$  tömegű  $P_1$  pont és  $m_2$  tömegű  $P_2$  pont súlypontján azt az  $m_1 + m_2$  tömegű  $S$  pontot értjük a  $P_1P_2$  szakaszon, amelyre  $P_1S/SP_2 = m_2/m_1$ . Több tömegpontból álló rendszer súlypontjához úgy juthatunk, hogy vesszük két tömegpont súlypontját, majd sorra már tekintetbe vett pontok súlypontjának és egy további tömegpontnak a súlypontját, míg minden pont sorra nem kerül. Az egyes pontokban elhelyezett tömegekre ható (párhuzamosnak feltételezett) nehézségi erők eredője a súlypontban ható és az ahhoz rendelt tömegnek megfelelő nehézségi erővel egyenlő. Világos, hogy egy síkban levő pontrendszer súlypontja ebben a síkban van.



Fel fogjuk használni, hogy egy tömegpontrendszer súlypontja független a pontok sorrendjétől, és hogy részekre osztva a pontrendszert, az egyes részrendszerek súlypontjainak súlypontja az egész rendszer súlypontja.

Ha egy szabályos  $n$ -szög minden csúcsába egységnyi tömeget helyezünk, akkor a rendszer súlypontja a *sokszög középpontja* (a körülírt kör középpontja)  $n$  egységnyi tömeggel. Valóban, ha a sokszöget a középpont körül a teljes körülfordulás  $n$ -ed részével forgatjuk el, akkor önmagába megy át, tehát súlypontja változatlan marad. Forgatásnál azonban egyedül a forgatás középpontja nem mozdul el, tehát itt van a súlypont.

Esetünkben az  $A_0, A_6, A_7, A_{12}, A_{18}, A_{21}, A_{24}, A_{30}, A_{35}, A_{36}$  egységnyi tömegű pontokból álló  $R$  rendszer súlypontja is a kör  $O$  középpontja, mert felbontva az  $A_7, A_{21}, A_{35}$  pontok szabályos háromszöget alkotnak (két-két pont közt a kör 14 negyvenkettő része van), a maradó pontok pedig szabályos hétszöget (két-két pont közt a kör 6 negyvenkettő része van). Így mindegyik részrendszer súlypontja  $O$ , tehát az  $R$  rendszeré is.

Ugyancsak  $O$  a súlypontja a körön átellenes  $A_0$  és  $A_{21}$  pontokba helyezett tömegek alkotta  $R_1$  rendszernek is. Így a többi 8 tömegpont  $R_2$  rendszerének súlypontja ugyancsak  $O$ , mert különben az  $R_1$  és  $R_2$  egyesítésével újra adódó  $R$  súlypontja nem lehetne  $O$ .

Bontsuk fel  $R_2$ -t két rendszerre, 4-4 tömegponttal, az egyik  $A_6, A_7, A_{35}, A_{36}$ , a másik  $A_{12}, A_{18}, A_{24}, A_{30}$ . E részrendszerek  $S'$ , ill.  $S''$  súlypontja az  $O$ -ra tükrös pontpár, mert az újraegyesítéssel visszanyert  $R_2$  súlypontja csak így lesz  $O$ .  $S'$  az  $A_0A_{21}$  átmérőn van, mert az  $A_6, A_{36}$  és  $A_7, A_{35}$  pontpárok a kiindulási pontrendszerben erre az átmérőre tükrösek, így az első pontpár súlypontja az egybeeső  $A'_6 \equiv A'_{36}$  pont, az utóbbié ugyanígy  $A'_7$ , egyaránt 2-2 egységnyi tömeggel, ennél fogva  $S'$  azonos az  $A'_3A'_7$  szakasz felezőpontjával. Hasonlóan  $S''$  az  $A'_{12}A'_{18}$  szakasz felezőpontja.

Ábránkat  $O$ -ra tükrözve  $A_{12}, A_{18}, A_{24}, A_{30}$  rendre az  $A_{33}, A_{39}, A_3, A_9$  pontba megy át,  $S''$  pedig ezek szerint az  $A'_3A'_9$  szakasz felezőpontjába, másrészt fenti megállapításunk szerint  $S'$ -be. Azt kaptuk tehát, hogy az  $A_0A_{21}$  egyenes  $A'_6A'_7$  és  $A'_2A'_9$  szakaszainak felezőpontja közös. Így pedig az  $A'_3A'_6$  és  $A'_7A'_9$  szakaszok egymás tükörképei a mondott felezőpontra nézve, tehát egyenlők.

**II. megoldás.** Legyen a kör sugara egységnyi. A rövidebb  $A_0A_3, A_0A_6, A_0A_7, A_0A_9$  ívhez tartozó középponti szög (ív mértékben mérve)  $\pi$ -nek rendre:  $3/21 = 1/7$ része, ill.  $2/7, 1/3, 3/7$  része. Ezért a szóban forgó vetületi pontoknak a kör  $O$  középpontjától mért távolságai rendre

$$OA'_3 = \cos \frac{\pi}{7}, \quad OA'_6 = \cos \frac{2\pi}{7}, \quad OA'_7 = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \quad OA'_9 = \cos \frac{3\pi}{7},$$

mindegyik pozitív és csökkenő sorozatot alkotnak. Ezekkel a vizsgálandó szakaszpár különbsége

$$(1) \quad d = A'_9A'_7 - A'_6A'_3 = \frac{1}{2} - \cos \frac{3\pi}{7} - \cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{2\pi}{7},$$

<sup>1</sup>Ezt a megoldást *Kárteszi Ferenc* bocsátotta rendelkezésünkre.

erről kell megmutatnunk, hogy 0-val egyenlő.

Jelöljük  $\pi/7$ -et  $\delta$ -val és fejezzük ki a  $d$ -t  $y = \cos \delta$ -val. Felhasználva a következő azonosságokat:

$$\begin{aligned}\cos 2\alpha &= 2 \cos^2 \alpha - 1, \\ \cos 3\alpha &= \cos(2\alpha + \alpha) = \cos 2\alpha \cos \alpha - \sin 2\alpha \sin \alpha = 2 \cos^3 \alpha - \cos \alpha - \\ &\quad - 2 \sin^2 \alpha \cos \alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha,\end{aligned}$$

adódik

$$(2) \quad d = -4y^3 + 2y^2 + 2y - \frac{1}{2}.$$

Másrészt  $3\delta$  kiegészítő szöge  $4\delta$ , tehát fennáll:

$$(3) \quad \cos 3\delta + \cos 4\delta = 0.$$

Innen a fentiek és a

$$\cos 4\alpha = 2 \cos^2 2\alpha - 1 = 8 \cos^4 \alpha - 8 \cos^2 \alpha + 1$$

azonosság alapján

$$(4) \quad 8y^4 + 4y^3 - 8y^2 - 3y + 1 = 0.$$

Ez az egyenlet négy  $y$  értékre teljesülhet, minden olyan  $\cos z = y$ -ra, amely mellett teljesül a (3)-nak megfelelő  $\cos 3z + \cos 4z = 0$ , vagyis  $3z + 4z = 7z = (2k + 1)\pi$ , ahol  $k$  egész szám. Mindjárt ilyen  $z = \pi$ , ekkor  $y = -1$ , ez tehát (4) egyik gyöke, a bal oldalból kiemelhető az  $y + 1$  gyöktényező. A hányados  $8y^3 - 4y^2 - 4y + 1$ , tehát a további gyökökre

$$(5) \quad 8y^3 - 4y^2 - 4y + 1 = 0.$$

Ez fennáll  $\cos \delta$ -ra is (mert  $\cos \delta$  nem azonos a leválasztott gyökkel, hiszen  $\delta < \pi/2$ , és ezért  $\cos \delta = y > 0$ ).

Vegyük észre, hogy (5) bal oldalán (2)-nek  $-2$ -szerese áll. Eszerint  $-2d = 0$ , és így  $d = 0$ . Ezt akartuk bizonyítani.

*Pelikán József* (Budapest, Fazekas M. gyak. g.)

*Megjegyzés.* A fenti megfontolást folytatva (5) teljesül minden

$$z = (2k + 1) \frac{\pi}{7} = (2k + 1)\delta$$

értékre, és ha  $2k + 1$  nem osztható 7-tel, mindezekkel  $d = 0$ . Ebből további, a feladatban kimondotthoz hasonló egyenlőségek fennállására következtethetünk, ezek azonban lényegesen új összefüggést nem adnak, a feladatban szereplő szakaszokból egyszerű transzformációkkal kaphatók.