

Legyen az  $a_n$  sorozat különbsége  $d$ , a  $g_n$  sorozat hányadosa  $q$ , így a követelmények:

$$1 + 2d = q^2 \neq 1, \quad (1 + 20d)^5 = q^{20}.$$

A második egyenletből 5-ik gyököt vonva, majd felhasználva az elsőt:

$$1 + 20d = q^4 = (q^2)^2 = (1 + 2d)^2 = 1 + 4d + 4d^2$$

(csak a valós gyököt vettük figyelembe), és innét

$$d = 4, \quad q = \pm 3.$$

(A  $d = 0$  gyök a kizárt  $g_3 = q^2 = 1$  értékre vezet.) Valóban, így  $a_3 = g_3 = 9$ ,  $a_{21} = 81 = (\pm 3)^4$ , és  $a_{21}^5 = (\pm 3)^{20} = g_{21}$ , mindkét mértani sorozatban.

Az  $a_n$  sorozat minden tagja pozitív, a  $g_n = 3^{n-1}$  és  $g'_n = (-3)^{n-1}$  sorozatok pozitív tagjai pedig közősek, ezért elég  $a_n$ -nel és  $g_n$ -nel foglalkoznunk.

Csak páratlan indexű tagokra állhat fenn a kívánt egyenlőség, ugyanis ha  $n = 2r$ , akkor

$$g_{2r} = 3^{2r-1} = 3 + 3 \cdot (3^{2(r-1)} - 1) = 3 + 3 \cdot (3^{r-1} - 1)(3^{r-1} + 1).$$

Itt a két zárójeles kifejezés páros, s így  $g_{2r}$  4-gyel osztva 3-at ad maradékul,  $a_{2r}$  viszont 1-et s így minden hatványa is.

Legyen a továbbiakban  $n = 2r + 1$  ( $r$  és minden további betű is pozitív egész számot jelöl). Olyan  $r$ -et és  $k$ -t kell keresnünk, amelyre

$$(1) \quad (1 + 8r)^k = 3^{2r} = 9^r.$$

Ehhez a bal oldali alapnak 3 hatványának kell lennie, és láttuk, hogy ekkor csak páros hatványa lehet

$$1 + 8r = 3^{2s} = 9^s,$$

továbbá ezt (1)-be beírva,  $ks = r$ -nek kell teljesülnie. Olyan  $s$  értéket keresünk tehát, amelyre

$$1 + 8ks = 9^s,$$

vagyis amelyre  $9^s - 1$  osztható  $8s$ -sel. Ha ez fennáll, akkor  $k = (9^s - 1)/8s$ ,  $n = 2r + 1 = 2ks + 1 = (9^s + 3)/4$  értékekre  $a_n^k = [1 + 4(n - 1)]^k = 9^{ks} = 3^{n-1} = g_n$ .

$s = 1$  és 2-re fennáll az oszthatóság és éppen a feladat szövegében említett  $n = 3$  és 21 eseteket kapjuk. Világos, hogy  $s = 3$  és semmilyen 3-mal osztható  $s$  érték nem felel meg, mert  $9^s - 1$  nem osztható 3-mal.

$s = 4$  ismét megfelel, mert

$$9^4 - 1 = (9 - 1)(9 + 1)(9^2 + 1)$$

osztható 32-vel. Ekkor  $k = (9^4 - 1)/32 = 5 \cdot 41 = 205$ ,  $n = 2 \cdot 205 \cdot 4 + 1 = 1641$ .

Ugyancsak megfelel  $s = 8$  is, mert

$$9^8 - 1 = (9^4 - 1)(9^4 + 1),$$

és itt az utolsó tényező páros, tehát a szorzat osztható  $32 \cdot 2 = 4 \cdot 16$ -tal. Így

$$k = \frac{9^8 - 1}{64} = \frac{9^4 - 1}{32} \cdot \frac{9^4 + 1}{32} = 205 \cdot 3281 = 672\,605,$$

$$n = 672\,605 \cdot 16 + 1 = 10\,761\,681$$

is kielégíti a feladat feltételeit.

*Sergyán Stefánia* (Zalaegerszeg, Csányi L. közg. t. IV. o. t.)

*Megjegyzések.* 1. A fentiek mintájára adódik, hogy minden megfelelő  $s$  értéknek a kétszerese is megfelelő, hiszen ha  $9^s - 1$  osztható  $8s$ -sel, akkor  $9^{2s} - 1 = (9^s - 1)(9^s + 1)$  osztható  $8 \cdot 2s$ -sel, mert  $9^s + 1$  páros. Így  $s$  lehet 2-nek bármelyik hatványa, tehát végtelen sok megoldás van.

*Bodor István* (Veszprém, Lovassy L. g. III. o. t.)

2. Tévesen állították többen, hogy ez az összes megoldás, hiszen pl.  $9^{10} - 1$  osztható  $9^2 - 1 = 8 \cdot 10$ -zel, tehát  $s = 10$  is megoldáshoz vezet ( $k = 43\,584\,805$ ,  $n = 871\,696\,101$ ).

*Barcza Gyöngyi* (Budapest, Apáczai Csere J. gyak. g. IV. o. t.)

3. Ezzel együtt minden megfelelő *páros*  $s$  érték 5-szöröse is megfelelő, mert

$$9^{5s} - 1 = (9^s - 1)(9^{4s} + 9^{3s} + 9^{2s} + 9^s + 1),$$

és a második zárójelben minden tag utolsó jegye 1, tehát az összegé 5 (mert  $s$  páros), az első tényező pedig feltétel szerint osztható  $8s$ -sel.

Megadható számos további megfelelő  $s$  értéksorozat is.