


I. megoldás. Legyen a gúla alaplappja az $ABCD$ négyszög, csúcspontja E . Így olyan sík létezését kell megmutatnunk, amely párhuzamos egyenesekben metszi egyrészt az ABE , CDE oldallappárt, másrészt az ADE , BCE lappárt. Egy S sík akkor és csak akkor metsz párhuzamos egyenesekben két (egymást E -ben metsző) síkot, ha párhuzamos azok metszésvonalával.




1. ábra

Legyen az ABE és CDE síkok metszésvonal e , a BCE és az ADE síkoké, f , az e és f által kifeszített sík legyen S_0 (1. ábra). Az e metszésvonal átmegy az alapsíknak azon az M pontján, ahol az AB , CD alapélek egyenesei metszik egymást. Mivel az alapnégyszög konvex, M kívül van rajta, és ugyanígy az AD , BC egyenesek metszéspontja is, az az N , ahol f metszi az alapsíkot. Eszerint az alapidom és vele az egész gúla is S_0 -nak egyik féltérében van. (Ha M , ill. N nem létezik, mert $AB \parallel CD$, ill. $AD \parallel BC$, akkor e , ill. f párhuzamos az alapsíkkal.) S_0 -nak csak egy közös pontja van a gúlával, E ; így S_0 -t párhuzamosan eltolva az alap felé, a keletkező S az AE , BE , CE , DE oldaléleket rendre olyan A' , B' , C' , D' pontokban metszi, hogy $A'B' \parallel e \parallel C'D'$ és $A'D' \parallel f \parallel B'C'$, tehát $A'B'C'D'$ paralelogramma. Addig tolhatjuk S -et, míg eléri az alapnégyszögnek S_0 -hoz legközelebbi csúcsát.

(R. Zs.)

Megjegyzések. 1. A fenti bizonyításban a paralelogrammának azt a (definiáló) tulajdonságát használtuk fel, hogy mindkét pár szemben fekvő oldala párhuzamos. Ha viszont erre az (ugyancsak definiáló) tulajdonságra kívánunk támaszkodni: valamelyik szemben levő oldalpár párhuzamos és egyenlő hosszú, akkor elegendő meghatározni a fenti e és f metszésvonalak egyikét, mondjuk e -t. Vegyünk ezután egy-egy, e -vel párhuzamos szakaszt az ABE és CDE háromszögben: A^*B^* -ot, ill. C^*D^* -ot. Ha $C^*D^* = A^*B^*$, akkor készen is vagyunk, az $A^*B^*C^*$ sík paralelogrammában metszi a gúlát. Az ellentétes esetben vehetjük a jelölést úgy, hogy $C^*D^* > A^*B^*$, és vegyük C^*D^* helyett azt a vele párhuzamos $C'D'$ szakaszt, amely egyenlő A^*B^* -gal. Ez szintén benne van a CDE lapban és az A^*B^*C' sík megfelel az állításnak (2. ábra).




2. ábra

Mindjárt itt célszerű kimondani összehasonlításként: a II. megoldás erre támaszkodik: a paralelogramma centrálisan szimmetrikus négyszög.

2. Ha a megoldásbeli M és N pontok egyike sem jön létre (e , ill. f könnyű kijelölése céljára), akkor az alapidom már eleve paralelogramma és minden olyan sík megfelel, amely vele párhuzamos és nála közelebb van E -hez ugyanebben a féltérben, (más sík pedig nem felel meg).

3. Megoldásaink kissé szerkesztés jellegűek, az eltérés csak az, hogy végtelen sok megoldásuk van.



3. ábra

II. megoldás. Az előbbi jelölések mellett tegyük fel, hogy találtunk egy S síkot, amely a gúla palástját az $A'B'C'D'$ paralelogrammában metszi (3. ábra). Legyen az $ABCD$ négyszög átlóinak metszéspontja O . Az $A'B'C'D'$ paralelogramma átlóinak O' metszéspontja rajta van az EAC és EBD síkok metszésvonalának a gúlába eső szakaszán, vagyis OE -n. A paralelogramma centrálisan szimmetrikus O' -re, így az AE élt O' -re tükrözve; a tükörkép C' -ben metszi CE -t, a BE élt O' -re tükrözve, a tükörkép D' -ben metszi DE -t, végül C' és D' -nek O' -ra vonatkozó tükörképe éppen A' , illetve B' . (Az ábrán E tükörképe O' -re E_1 .)

Mivel $ABCD$ konvexitása miatt OE a gúla belsejében halad, megválasztható OE -n egy O' pont úgy, hogy a fenti tükrözéseket elvégezve, A' , B' , C' , D' pontok a gúla oldalszakaszaira essenek. Könnyű belátni, hogy ez az eset következik be, ha $O'E \leq O'O$. A fenti megfontolás alapján nyilvánvaló, hogy $A'B'C'D'$ paralelogramma, vagyis $A'B'C'D'$ síkja a gúla palástját éppen az $A'B'C'D'$ paralelogrammában metszi.