


**I. megoldás.** Jelöljük a tetraéder körülírt gömbjét  $G$ -vel, sugarát  $R$ -rel, az  $ABC$  alapháromszög körülírt körét  $k$ -val, ennek középpontját  $K$ -val és sugarát  $r$ -rel, az  $AB$  alapélt  $a$ -val, az  $AOD$  szöget  $\varphi$ -vel. A  $k$  kör egyrészt  $G$ , másrészt az oldalélek egyenlősége folytán a  $D$  körüli  $DA$  sugarú gömb metszészvonala, ezért  $K$  rajta van a  $DO$  tengelyen és  $r = R \sin \varphi$ . Így a  $k$ -ba beírt szabályos háromszög oldalaként  $a = \sqrt{3}r = \sqrt{3}R \sin \varphi$  adódik.



Az  $OAB$  háromszögből a cosinustétel alapján

$$\cos AOB \leq \frac{2R^2 - AB^2}{2R^2} = 1 - \frac{3}{2} \sin^2 \varphi = \frac{3}{2} \varphi - \frac{1}{2},$$

tehát az állítás bal oldala így írható:

$$\frac{3}{2} \cos^2 \varphi + \cos \varphi - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \left( \cos \varphi + \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{2}{3},$$

innen pedig az állítás helyessége nyilvánvaló. Egyenlőség  $\cos \varphi = -1/3$  esetén teljesül, akkor  $O$  az  $1/4$  részében vágja ketté a  $DK$  súlyvonalat,  $O$  a súlypont, tehát a tetraéder szabályos.

*Megjegyzés.* A megoldások legtöbbje az  $OK$  paraméter függvényében vizsgálta a bal oldal változását. Ezáltal a vizsgálat bonyolultabb lett, mint a fentiekben, ahol a második tagon mit sem kellett változtatni. Számos dolgot hiányos is lett azáltal, hogy  $K$  helyzetét  $O$ -nak csak az egyik oldalán vizsgálta.

**II. megoldás.** Az állításban az  $O$ -ból a csúcsokba húzott sugarak közti szögekről van szó. Mind a 4 csúcsot és a nyilvánvaló szimmetriát figyelembe véve mindkétféle szög 3-szor fordul elő. Ezen az észrevételen alapul a következő bizonyítás:

$$(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD})^2 \geq 0.$$

Kifejtve

$$4R^2 + 6R^2 \cos AOB \leq + 6R^2 \cos AOD \leq 0.$$

Innen egyszerű átrendezéssel adódik az állítás.