


A 2473. feladat<sup>1</sup> megoldásából átvesszük mindazokat a jelöléseket és összefüggéseket, melyek jelenlegi feladatunk megoldásánál felhasználhatók.

Az  $ABC$  háromszög körülírt körének sugara legyen egységnyi, középpontját jelölje  $O$ , a  $BAC \sphericalangle = 2\varphi$ . A háromszög szárai által 3 egyenlő részre osztott húr végpontjai  $F, G$ , harmadolópontjai  $F_1, G_1$ . Jelöljük továbbá  $x$ -szel az  $AX$  távolságot.



**1. eset.** Az  $AO$  egyenesre merőleges  $FG$  húr esetén (lásd ábra)

$$XG = 3x \operatorname{tg} \varphi.$$

Az  $OXG$  derékszögű háromszög oldalaira – mivel  $OA = OG = 1$  – fennáll

$$|x - 1|^2 + 9x^2 \operatorname{tg}^2 \varphi = 1,$$

ahonnan

$$x = \frac{2}{1 + 9 \operatorname{tg}^2 \varphi}, \quad \text{mivel } x \neq 0.$$

Ha  $\cos 2\varphi$  értéke 1-től 3/4-ig folytonosan csökken, akkor  $\operatorname{tg}^2 \varphi = \frac{1 - \cos 2\varphi}{1 + \cos 2\varphi}$  alapján  $\operatorname{tg}^2 \varphi$  értéke 0-tól 1/7-ig folytonosan növekszik, hiszen  $1 - \cos 2\varphi$  növekszik,  $1 + \cos 2\varphi$  pedig csökken. Ennek következtében  $x$  értéke 2-től 7/8-ig folytonosan csökken.

E változások szigorúan monoton jellege folytán  $\varphi$  és  $x$  között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető a mondott intervallumokban. Ez biztosítja, hogy az  $A$  kezdőpontú  $AO$  félegyenes minden olyan  $P$  pontjához, amelyre  $7/8 < AP < 2$ , találunk a feltételeknek megfelelő  $ABC$  háromszöget és húr  $T$  úgy, hogy  $X$  azonos  $P$ -vel.

**2. eset.** Vizsgáljuk most azt az esetet, amikor az  $F^*G^*$  húr nem merőleges  $AO$ -ra. A 2473. feladat megoldása szerint  $\angle XF_1O = \angle F_1AO = \varphi^*$ . Az  $F_1OX$  háromszög hasonló az  $AOF_1^*$  háromszöghöz, a hasonlóság alapján

$$\frac{OX}{OF_1^*} = \frac{OF_1^*}{OA}.$$

Az idézett megoldásban az is szerepel, hogy  $OF_1^* = \frac{1}{\sqrt{1 + 8 \cos^2 \varphi}}$ , és mivel  $OA = 1$ , az előbbi aránypárból  $OX =$

$\frac{1}{1 + 8 \cos^2 \varphi}$ . Ezért

$$x = AX = 1 - OX = \frac{8 \cos^2 \varphi}{1 + 8 \cos^2 \varphi} = \frac{8}{9 + \operatorname{tg}^2 \varphi}.$$

(0 mindig az  $F^*G^*$  egyenes  $A$ -t nem tartalmazó partján van.) Ha  $\operatorname{tg}^2 \varphi$  0-tól 1/7-ig nő,  $x$  értéke 8/9-től 7/8-ig csökken.

Az  $X$  számára most kapott intervallum része a főtebbinek, ennél fogva azokon az  $X$  pontokon megy át 3 harmadolható húr – a két eset szerint külön-külön meghatározható értékek mellett –, amelyekre  $\frac{7}{8} < x < \frac{8}{9}$ . (Az intervallum hossza 1/72.)

A szimmetrikus, ill. a ferde húrhoz tartozó szögekre

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{2}{x} - 1}, \quad \text{ill.} \quad \operatorname{tg} \varphi^* = \sqrt{\frac{8}{x} - 9}.$$

<sup>1</sup>K. M. L. 34 (1984) 443. oldal – December havi szám