

Először belátjuk, hogy az $1/2$ nem helyettesíthető más számmal. Legyen ugyanis csak két pont adva, mégpedig a szakasz végpontjai, A és B . Ekkor az AB szakasz minden X pontjának $1/2$ az átlagtávolsága e két ponttól, más szám tehát valóban nem jöhet szóba. Ez a példa természetesen nemcsak két pontra jó, mivel a pontok nem szükségképpen különbözők (vehetem n -szer az A és n -szer a B pontot).

Az állítás első felének a bizonyításához helyezzük el az AB szakaszt a számegyenesen úgy, hogy az A a 0 , a B pedig az 1 pontba essék. Ekkor az AB szakasz tetszőleges x pontja pontosan x távolságra van az A -tól (azaz 0 -tól). Legyen az adott véges sok pont: x_1, x_2, \dots, x_n , és legyen x az AB szakasz egy tetszőleges pontja. Ekkor x távolsága az x_i ponttól $|x - x_i|$, tehát az adott n ponttól vett átlagtávolságot $d(x)$ -szel jelölve

$$d(x) = \frac{\sum_{i=1}^n |x - x_i|}{n}.$$

Ismeretes, hogy $|x - x_i|$ folytonos függvény, $d(x)$ tehát n db folytonos függvény összegének n -edrészeként maga is folytonos. Most vegyük észre, hogy minden x_i pontnak a 0 és az 1 ponttól vett távolságösszege $|x_i| + |1 - x_i| = 1$ ($0 \leq x_i \leq 1$), így $d(0) + d(1) = \frac{n}{n} = 1$. Ha most $d(0) = \frac{1}{2}$, akkor a 0 pont, tehát A (és ugyanígy az 1 pont, tehát B) megfelel a feladat követelményének. Ha $d(0) < \frac{1}{2}$, akkor $d(1) > \frac{1}{2}$, és így d folytonossága miatt van olyan x pont a 0 és az 1 között, amelyre $d(x) = \frac{1}{2}$. Ugyanez áll, ha $d(0) > \frac{1}{2}$ (és $d(1) < \frac{1}{2}$). A feladat állítását ezzel beláttuk.