

a) Ha a szám minden számjegye 7, akkor jegyeinek száma tetszés szerinti lehet. Tegyük most fel, hogy minden jegy egy 7-től különböző j érték. Ekkor a szám egy csupa 1-essel leírt szám j -szerese és mivel j nem többszöröse 7-nek, azért a csupa 1-essel leírt szám osztható 7-tel. E szám jegyeinek számát úgy állapíthatjuk meg, hogy az ismeretlen hosszúságú $111 \dots 1$ számot osztjuk 7-tel, addig véve le az 1-eseket, míg 0 maradékra jutunk. Ez először a 6-ik 1-es levétele után következik be, de nyilvánvaló, hogy 12, 18, 24, ... jegyű osztandó esetén hasonlóan fennáll az oszthatóság, pl. $444\,444\,444\,444 = 4 \cdot 7 \cdot 15\,873\,015\,873$. Eszerint a kérdéses szám számjegyeinek száma $J = 6k$, ahol k pozitív egész szám. (Minden további betűvel is egy-egy pozitív egész számot jelölünk.)

$$\begin{array}{r} 1\,1\,1 \dots 1 : 7 = 15873 \\ 4\,1 \\ 6\,1 \\ 6\,1 \\ 5\,1 \\ 2\,1 \\ 0 \end{array}$$

b), c) 43 és 41 esetén nem fordulhat elő, hogy a számjegy osztható velük, így mindegyik esetben az előzőhöz hasonló osztási eljárást alkalmazva azt kapjuk, hogy a 21-ik, ill. az 5-ik 1-es levétele után adódik először 0 maradék:

$$111\,111\,111\,111\,111\,111\,111 = 43 \cdot 2\,583\,979\,328\,165\,374\,677, \quad 11\,111 = 41 \cdot 271,$$

tehát a b) esetben $J = 21m$, a c)-ben $j = 5n$ a számjegyek száma.

d) A 301 osztó esetében felesleges a hasonló próba, ha észrevesszük, hogy $301 = 7 \cdot 43$. Ha a szám csupa 7-essel van írva, akkor $J = 21m$ esetén fennáll az oszthatóság. Ha a jegyek nem 7-esek, akkor számuknak a 7-tel való oszthatóság végett $6k$, a 43-mal való oszthatóság végett pedig $21m$ alakúnak kell lennie, vagyis 6 és 21 közös többszörösének. Mivel 6 és 21 legkisebb közös többszöröse 42, és így minden közös többszörösük $42r$ alakú, azért valamennyi $jjj \dots j$ alakú szám közül a $42r$ jegyűek oszthatók 301-gyel.

e) Hasonlóan kapjuk, hogy a 3-mal osztható, $jjj \dots j$ alakú számoknak vagy minden jegyük $j = 3, 6, 9$, vagy jegyeik száma $3s$, mert $111 = 3 \cdot 37$.

f) Mivel $21 = 3 \cdot 7$, azért a csupa egyenlő jeggyel írt, 21-gyel osztható számoknak az a) és e) alatti feltétel-pár legalább egyik-egyik tagját ki kell elégíteniük. A feltételek nem függetlenek egymástól, ti. ha $j = 7$, akkor $j = 3, 6$, vagy 9 ki van zárva, és megfordítva is. Másrészt, ha a)-ból $J = 6k$, evvel e)-hez $J = 3s$ is teljesül és j értékének közelebbi megjelölése feleslegessé válik. Így a feltételek kombinációi közül csak a következő kettő különbözik:

$$j = 7, J = 3s, \text{ vagy } j \neq 7, J = 6k.$$

Szabó László (Budapest, József A. g. II. o. t.)

Megjegyzés. A dolgozatok kerülő utakon állapították meg a J értékeket. Pl. az a) esetre a $J = 6$, ill. $6k$ értéket abból következtették ki, hogy az $1/7$ tört a végtelen tizedes tört alakból közönségessé visszaalakítva $142\,857/999\,999$ -nek adódik, tehát $999\,999 = 9 \cdot 111\,111 = 7 \cdot 142\,857$, $111\,111 = 7 \cdot 15\,873$, vagyis a 6 egyenlő jegyű számok megfelelnek. Ebből nem következik, hogy kevesebb jegyű számról nem lehet szó. Volt, aki érezte ezt és óvatosan így írt: „6 egyenlő jegyű szám *biztos* osztható 7-tel.” A feladat kérdésére: „hány jegye lehet a számnak...” ez elengedő is.

Mások „visszafelé való szorzással” építették ki a számokat. Pl. a csupa 1-essel írt, 7-tel osztható szám utolsó 1-ese miatta 7-edrészének, q -nak, egyes jegye 3, mert 7 többszörösei közül csak $3 \cdot 7 = 21$ végződik 1-esre. Az itteni 2 tizedeshez, „hogy 1 tizes legyen”, 9 tízest kell adni, 9-re $7 \cdot 7$ végződik, tehát $q = \dots 73$. Most $7 \cdot 73 = 511$, az 5 százashoz 6 százast kell adni, 6-ra $7 \cdot 8$ végződik, $q = \dots 873$, és így tovább. Ez a „fordított” eljárás a fent adott osztáshoz hasonlóan vezet célra, ha nehezebben is; lehet viszont olyan kérdés, ahol csak ez vezet célra.