


I. megoldás. a) Legyen az előírásoknak megfelelő ABC háromszög BC oldalszakaszának első és harmadik negyedelő pontja D , ill. E ($DC = 3BD$, $BE = 3EC$), és AB , AD , AE rendre egyenlő az adott c , d , ill. e szakasszal (1. ábra). Húzzunk párhuzamost D -n át AE -vel, és mossa ez AB -t F -ben. D harmadolja BE -t, így F is harmadolja BA -t, ezért egyrészt $AF = 2c/3$, másrészt $FD = AE/3 = e/3$, így az AFD háromszög oldalai megszerkeszthetők az adott szakaszból.



1. ábra

E háromszöget előállítva, az A -ból induló, FD -vel párhuzamosan húzott félegyenesre fölmérjük e -t, ekkor DE és AF metszéspontja megadja B -t, végül BD -t fölmérve BE -nek E -n túli meghosszabbítására, kapjuk C -t.

A szerkesztés szerint egyrészt $AE = 3FD$ miatt $AB = 3 \cdot FB = FB + 2c/3$, és így $FB = c/3$, $AB = c$, másrészt ugyanígy $BE = 3 \cdot BD$, ennél fogva $BC = 4BD$, végül $AD = d$, $AE = e$, tehát az ABC háromszög megfelel a követelményeknek.

Az AFD háromszög létrejön, ha

$$(1) \quad \left| \frac{2c}{3} - \frac{e}{3} \right| < d < \frac{2c}{3} + \frac{e}{3}, \quad \text{azaz ha} \quad |2c - e| < 3d < 2c + e.$$

E feltétel teljesülése esetén 1 háromszöget kapunk.

b) Legyen a három szakasz először 6, 4 és 1 egységnyi. Közülük c -t 3-féleképpen választhatjuk meg, d -t mindegyik esetben a maradék szakaszok közül 2-féleképpen, e pedig mindig a nem választott szakasz lesz, tehát a következő $3 \cdot 2 = 6$ szereposztást kell megvizsgálunk:

$$c, d, e = 6, 4, 1; \quad 6, 1, 4; \quad 4, 6, 1; \quad 4, 1, 6; \quad 1, 6, 4; \quad 1, 4, 6.$$

(1) csak az első és a negyedik esetben teljesül, ebből a szakaszhármasból 2 megoldást kapunk.

Hasonlóan a 9, 6, 5 szakaszhármasból 4 megoldást kapunk, csak a $c, d, e = 6, 9, 5$ és $5, 9, 6$ szereposztásokban nem teljesül (1), vagyis amikor d -t próbáljuk legnagyobbak. Valóban, az ADB és ADE háromszögek egyike D -nél tompaszögű, vagy mindkettő derékszögű, ezért AD az AB és AE szakaszok közül legalább az egyiknél kisebb. Eszerint 4-nél több megoldást sohasem kaphatunk.

Süttő Judit (Budapest, Ságvári E. gyak. g. I. o. t.)

Hárs László (Budapest, Kölcsey F. g. II. o. t.)

Pataki János (Budapest, Berzsenyi D. g. I. o. t.)

Megjegyzések. 1. A $2c, 3d, e$ oldalú háromszög megszerkesztésére jutunk pl. a következő gondolatmenettel: A tükörképét B -re A' -vel jelölve az $AA'E$ háromszögben EB súlyvonal, D súlypont, így AD és $A'E$ metszéspontját K -val, A tükörképét K -ra A'' -vel jelölve AK , mint súlyvonal $(3/2) AD$ hosszúságú, ezért $AA'' = 2AK = 3AD$, és az $AA'A''E$ paralelogrammából $A'A'' = AE = e$, tehát az $AA'A''$ háromszög szerkeszthető a $2c, 3d, e$ oldalakból.

2. A fenti megoldásra elvezet a következő elemzés is. Felvéve az $AB = c$ szakaszt, E az A körüli e sugarú k körön lesz. Mivel D a BE szakasz B -hez közelebbi harmadoló pontja, azért D -nek egy mértani helyét kapjuk, ha k -t B -ből mint középpontból harmadára zsugorítjuk, legyen ez k' . D másik mértani helye az A körüli d sugarú kör. – Az így kapott BD szakaszt B -ből 3-, ill. 4-szeresére nyújtva kapjuk E -t, ill. C -t.

Papp Zoltán (Debrecen, Fazekas M. g. II. o. t.)

II. megoldás az a) részre (vázlat). Tovább használjuk a fenti A, B, C, D, E jelöléseket. A keresetthez hasonló $A^*B^*C^*$ háromszöget szerkesztünk, felhasználva Apollóniosz tételét¹ – mely szerint a sík azon pontjainak mértani helye, amelyek két adott ponttól mért távolságainak aránya állandó (és 1-től különböző), kör –, azután ezt a kívánt nagyságúra transzformáljuk. Legyen a tetszés szerinti B^*C^* szakasz első és harmadik negyedelő pontja D^* , ill. E^* , ekkor a kívánt hasonlóság miatt

$$A^*B^* : A^*D^* = AB : AD = c : d, \quad A^*B^* : A^*E^* = c : e,$$


¹Lásd pl. Gallai T.–Hódi E.–Péter R.–Szabó P.–Tolnai J.: Matematika a gimn. III. o. számára, 12. kiadás, Tankönyvkiadó, Bpest 1962., 177. o.

tehát A^* annak a két Apollóniosz-körnek, k_1 -nek és k_2 -nek a metszéspontja, melyek alappontjai és aránymutatója (k_1): $B^*, D^*, c : d (\neq 1)$, ill. (k_2): $B^*, E^*, c : e (\neq 1)$, (ugyanis a feltevés szerint $d \neq c \neq e$).

Nyilvánvaló, hogy a két körnek a $B^*C^* = a^*$ egyenes szimmetriatengelye, ezért a^* -nak az az X, Y pontpárja, amelyre

$$XB^* : XD^* = YB^* : YD^* = c : d$$

(X a B^*D^* szakasz belsejében, Y pedig kívül rajta), k_1 -nek egy átmérőjét adja meg, és ezzel maga k_1 is meg van határozva. A szerkesztés (2. ábra):



2. ábra

Egy a^* egyenes egymás utáni B^*, D^*, E^*, C^* pontját úgy vesszük fel, hogy $B^*D^* = E^*C^*$ és $D^*E^* = 2B^*D^*$. Az első három ponton át egymással párhuzamos egyeneseket veszünk fel, majd rendre felmérjük rájuk a

$$B^*B' = c, \quad D^*D' = D^*D'' = d, \quad E^*E' = E^*E'' = e$$

szakaszokat (B', D', E' az a^* egyik partján, D'', E'' a másikon; mérhetünk természetesen tc, td, te szakaszt, ahol $t > 0$, tetszés szerinti szám). Ekkor a fenti X -et a $B'D''$, Y -t a $B'D'$ egyenes metszi ki a^* -ból, k_2 megfelelő átmérőjének Z, U végpontjait pedig hasonlóan $B'E'', B'E'$. k_1 és k_2 egyik metszéspontjából, A^* -ból kiindulva félegyeneseket húzunk B^* -on és C^* -on át, az előbbire felmérjük az $A^*B = c$ szakaszt, B -n át meghúzzuk az a^* -gal párhuzamos a egyenest. Ekkor a és A^*C^* metszéspontját C -vel jelölve az A^*BC háromszög megfelel a követelményeknek. – Ennek bizonyítását helyszűke miatt az olvasóra hagyjuk, valamint annak vizsgálatát is, mely feltételek esetén van k_1 -nek és k_2 -nek a^* -on kívül A^* közös pontja, vagyis a feladatnak megoldása.

Bense Magdolna (Kiskunfélegyháza, Móra F. g. II. o. t.)