


A sík azon pontjainak mértani helye, melyeket egy  $AB$  egyenesre merőlegesen vetítve, a vetület az  $AB$  szakasz belső pontja lesz, nyilvánvalóan a szakaszra az  $A$ -ban és  $B$ -ben állított merőleges egyenesek közti síksáv. A merőlegesek pontjai nem tartoznak hozzá a mértani helyhez (1. ábra).



1. ábra


Legyen  $k$  egy, az  $A$ -n és  $B$ -n átmenő kör, és mossa ezt a mondott síksáv  $A$ -n átmenő határa  $B^*$ -ban, a  $B$ -n átmenő határa  $A^*$ -ban. Ekkor a  $k$ -ból a félkörnél kisebb  $AB^*$ ,  $BA^*$  ívekre eső pontoknak – a végpontokat is hozzáértve – az  $AB$  egyenesen levő vetülete nem belső pontja az  $AB$  szakasznak. Thalész tétele alapján  $AA^*$  és  $BB^*$  a  $k$ -nak átmérői. A mondott ívek csak akkor zsugorodnak össze egy-egy pontra, ha  $AB$  a  $k$ -nak átmérője. (A továbbiakban – ha körívet mondunk – mindig a félkörnél nem hosszabb ívet értjük.)

Vegyük hozzá most  $A$ -hoz és  $B$ -hez  $k$ -nak  $C$  pontját, és legyen  $C^*$  a  $C$ -vel átellenes pont. Ekkor az előbbiekhöz hasonlóan nem belső pont a vetülete az  $ABC$  háromszög

- (1)  $AB$  oldalegyenesén az  $AB^*$  és  $BA^*$  ívek pontjainak,  
 $BC$  oldalegyenesén a  $BC^*$  és  $CB^*$  ívek pontjainak,  
 $CA$  oldalegyenesén a  $CA^*$  és  $AC^*$  ívek pontjainak;


(az egyes egyenesek mellett *nem említett* ívek belső pontjaira nézve viszont a vetület belső pont lesz a megfelelő oldalszakaszon mint pl.  $AB$ -n az  $AB$  és  $A^*B^*$  ívek pontjaié.) Így már csak azt kell belátnunk, hogy az (1) alatti 6 ív együttvéve lefedi  $k$ -nak minden pontját, kizárja rájuk a 3 elemű tulajdonságnak legalább egy elemét.

Valóban, ha az  $ABC$  háromszög hegyesszögű, azaz  $C$  a félkörnél kisebb  $A^*B^*$  íven van, akkor az íveket határoló pontok sorrendje  $A, C^*, B, A^*, C, B^*$ , így  $k$ -nak minden pontja éppen egy (1) alatti ívhez, a 6 pont pedig két-két ívhez tartozik hozzá (2a. ábra);




2a. ábra

ha van a háromszögben derékszög – választjuk  $C$ -t a csúcsául, – akkor  $B^*$  azonos  $A$ -val és  $A^*$  azonos  $B$ -vel, ekkor hasonlóan (1)-ből az utolsó négy ív fedile  $k$ -t (2b. ábra);



2b. ábra

ha pedig van tompaszög – legyen  $ACB < 90^\circ$ , vagyis ha  $C$  az  $AB$  íven van –, akkor pontjaink egymásutánja  $A, B^*, C^*, A^*, B, C$ , tehát az  $A$  pont belső pontja a  $CB^*$  ívnek, továbbá  $B^*, A^*, B$  belső pontja rendre az  $AC^*$ -nak, a  $BC^*$ -nak, a  $CA^*$ -nak és az (1) ívek ekkor is lefedik  $k$ -nak minden pontját, sőt az  $AB^*, BA^*$  ívek pontjait háromszor is (2c. ábra). – Más eset nincs, ezzel bizonyításunkat befejeztük.



2c. ábra

*Megjegyzések.* 1. A kitűzött állítás bizonyítása mellett tulajdonképpen megkaptuk a háromszög síkjának azokat a pontjait, melyeknek a vetülete mindhárom oldalszakaszon belső pont; mondjuk is ki az eredményeket. Ezek a pontok a következő idomok *belső* pontjai: a 2a. ábrán az  $AC^*BA^*CB^*$  konvex, centrálszimmetrikus hatszög, a 2b. ábrán az  $ACBC^*$  téglalap, a 2c. ábrán a  $CDC^*E$  paralelogramma.

2. Többen bizonyításul a Simson-féle, más néven Wallace-féle egyenesek tételére<sup>1</sup> hivatkoztak. Ez a tétel azt mondja ki a háromszög körülírt körének pontjairól, hogy a szóban forgó 3 vetületük egy egyenesen van. Mivel pedig egy egyenesnek a háromszög kerületével legfeljebb két közös pontja lehet, azért az állítás helyes. Ez az érvelés helyes, legfeljebb az a szépséghibája, hogy magánál az állításnál jóval erősebb tételre hivatkozik, „nagy ágyút” használ.

<sup>1</sup>Lapunkban legutóbb a P. 108. problémában szerepelt, K. M. L. 46 (1973) 71–73. old.